



RS Li, Shih-chên
180 Kokuyaku honzo komoku
C5L4519
1929
v.11

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET


UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

頭註

國譯本草綱目

第十一冊

春陽堂藏版



RS
180
C5L4519
1929
v. 11

原著

明 李 時 珍

監修・校註

理學博士 白井光太郎

顧問

木村 博 昭

考 定

理學博士 牧野富太郎

考 定

理學博士 脇水鐵五郎

考 定

岡田 信 利

考 定

矢野 宗 幹

考 定

木村 康 一

譯 文

鈴木 眞 海

頭註國譯本草綱目 第十一冊

目次

本草綱目介部第四十五卷

介部第四十五卷目錄.....一一二

龜鼈類

水龜.....一

秦龜.....一三

鱓龜.....一六

龜鼈

瑋瑋.....二〇

散八兒

綠毛龜.....二四

瘡龜.....二六

鸛龜.....二六

旋龜

攝龜.....二七

貢龜.....二九

龜.....二九

納龜.....四一

能龜.....四一

朱龜.....四三

珠龜.....四三

龜.....四四

蟹.....四六

蟹魚.....四六

本草綱目介部第四十六卷

介部第四十六卷目錄

蚌蛤類

牡蠣

蚌

馬刀

蛾螳

蜆

眞珠

石決明

海蛤

文蛤

蛤蜊（蛤粉）

鱉

擔羅

一

六一

六九

七三

七六

七七

七九

八五

八九

九五

九六

一一

一二

車螯	一〇三
魁蛤(瓦壘子)	一〇六
車渠	一〇九
貝子	一一一
紫貝	一二六
珂	一二七
石蚶(蜜脚)	一二九
淡菜	一三〇
海蠃(甲香)	一三一
甲煎	一三五
田蠃	一三六
蝸蠃	一三一
蓼蠃	一三四
寄居蟲	一三五

海月.....一三六

海鏡

海燕.....一三六

郎君子.....一三九

本草綱目禽部第四十七卷

禽部第四十七卷目錄.....一三三

水禽類

鶴.....一四一

鸛.....一四四

鶻.....一四七

鵲

陽鳥.....一四八

鷓鴣.....一四九

鶩.....一五一

鵲鵲(淘鵲)

..... 一五二

鵲

..... 一五二

鴈

..... 一六一

鵲(天鵲)

..... 一六六

鵲

..... 一六六

鵲鵲

..... 一六九

鳬(野鴨)

..... 一七七

鵲鵲

..... 一七九

鵲鵲

..... 一八〇

鵲鵲

..... 一八三

鵲鵲

..... 一八三

旋目 方目

鵲

..... 一八五

鵲

..... 一八七

鸚鵡.....一八八

鸛.....一九一

魚狗.....一九六

翡翠

蚊母鳥.....一九八

本草綱目禽部第四十八卷

禽部第四十八卷目錄.....一

原禽類

雞.....二〇一

雉.....二五一

鸛雉（山雞）.....二五七

鷺雉（錦雞）.....二五九

鶉雞.....二六二

白鷺.....二六四

鷓鴣	二六六
竹雞	二六九
杉雞	
英雞	二七一
秧雞	二七三
鶉	二七三
鷄	二七六
鵪鶉	二七八
鴿	二七九
突厥雀	二八三
雀	二八四
蒿雀	二九三
巧婦鳥(鵲)	二九三
燕	二九六

石燕.....三〇〇

伏翼（蝙蝠）.....三〇一

鼯鼠（飛生）.....三一〇

寒號蟲（五靈脂）.....三一三

本草綱目禽部第四十九卷

禽部第四十九卷目錄.....一一二

林禽類

斑鳩.....三二五

青鵪（黃褐侯）.....三二八

鴈鳩（布穀）.....三二九

桑扈（蠟質）.....三三一


伯勞.....三三二

鷓鴣

鷓鴣.....三三八

百舌	三四〇
練鵲	三四一
鸞	三四三
啄木鳥	三四四
慈鳥	三四八
烏鴉	三五〇
鵲	三五四
山鵲	三五七
鶻嘲	三五八
杜鵑	三六〇
鸚鵡	三六二
秦吉了 鳥鳳	
山禽類	
鳳凰	三六七

孔雀	三七一
駝鳥	三七三
鷹	三七五
鵬	三七九
鶚(魚鷹)	三八一
鵙	三八三
鵙鵒	三八六
鵙	三九〇
鳩	三九四
姑獲鳥	三九六
治鳥	三九七
木客鳥 獨足鳥	
鬼車鳥	四〇〇
諸鳥有毒	四〇三



本草綱目介部

第四十五卷

本草綱目介部目錄第四十五卷

(一) 互物ハ大戴禮註ニ、互物ハ甲アルモノ、萌胡龜鼈ノ屬是ナリ。

(二) 籍ハヤスチ云フ註ニ、以テ泥中チ杓刺シ之チ搏取スルナリ。

(三) 龜ハ大蛤。

(四) 龜ハ蟻始。

(五) 紙ハ蟻ノ子。

(六) 鼈人ハ官名、周禮天官ノ屬、四豆ノ實チ掌ル、豆ハ祭器。

李時珍曰く、介蟲は三百六十あつて龜をその長としてある。龜は蓋し介蟲の靈長

なるものだ。周官には『鼈人^{べつじん}は(一)互物を取り、時を以て(二)籍^{こく}す。春は鼈、蟹を獻じ、

秋は龜、魚を獻じ、祭祀には(三)蠃^{りゅう}——音は排^{ハイ}——(四)蟻^ぎ——音は螺^ラ——(五)蜺^ひ

——音は池^チ——を共し、以て(六)鼈人^{かいじん}に授く』とあるのだから、介物はやはり聖世

の供饌^{くせん}にも廢^すてられなかつたものである。況やまた藥品に充^あてらるるに於てをや。

唐、宋の本草にはいづれも蟲魚部中に混入されてあつたが、本書は介部としてこれ

を分離し、凡て四十六種を龜鼈^{きべつ}、蚌蛤^{はうかふ}の二類に分類した。

神農本草經八種 梁の陶弘景註。 名醫別錄五種 梁の陶弘景註。

唐本草 唐の蘇恭。 本草拾遺十種 唐の陳藏器。

海藥本草二種 唐の李珣。 蜀本草一種 蜀の韓保昇。

開寶本草二種 宋の馬志。 嘉祐本草八種 宋の掌禹錫。

圖經本草一種 宋の蘇頌。 本草綱目六種 明の李時珍。

本草蒙筌一種 明の陳嘉謨。

附註

魏吳普本草

李當之藥錄

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

宋雷斅炮炙論

唐孟詵張鼎食療

孫思邈千金

南唐陳士良食性

楊損之刪繁

蕭炳四聲

宋寇宗奭衍義

大明日華

金張元素珍珠囊

元李杲法象

朱震亨補遺

吳瑞日用

王好古湯液

明寧源食鑑

明汪詒食物

明汪機會編

介の一 龜鼈類十七種

水龜 木經

秦龜 別錄

黿龜 綱目

龜鼈を附す。

瑋玕 問寶

散八兒を附す。

綠毛龜 蒙筌

瘡龜 拾遺

鸚龜 拾遺

旋龜を附す。

攝龜 蜀本

黃龜 綱目

鼈 木經

納鼈 圖經

能鼈 綱目

朱鼈 拾遺

珠鼈 綱目

鼈 拾遺

蟹 木經

鼈 嘉祐

右附方 舊十九 新四十六

介の一 龜鼈類十七種

(一) 水 龜 (本經上品)

和名 しながめ
學名 *Caretta sinensis* (Gray.
科名 いしかめ(石龜)科

(一) 木村(重)曰ク、
背甲ハ扁平稍卵形頭
部吻端稍尖リ、甲及
ビ側面ニ黃色ノ線ア
リテ美ナリ。臺灣、
南支那ニ分布ス、一
般ニシユイクキ(水
龜)ト稱ス。

釋名

玄衣晉黿

時珍曰く、按ずるに、許慎の説文に「龜は頭が蛇と同じだ。故にその文字は上は它に従ひ、その下に甲、足、尾の形を象したものだ」とある。



〔 龜 〕

——りあ種ニの水・山——

它是古の蛇の字だ。又、爾雅には龜を十種舉げてあつて、郭璞は文に隨つて傳會してあるが、甚だ明確でない。蓋し山、澤、水、火の四種は、通常の龜をその生ずる場所に因つて區分したものである。その大いさ一尺以上に達したもので、水に棲むものをば寶龜といひ、蔡龜ともいふ。山に棲むものをば靈龜といふ。いづれも國の守寶であるが、まだ變化する能力のないものだ。その齡百千年に達すれば、五色を具へ、或は

(二) 炎地ハ火ノ燃エ
ル地。

大に、或は小に、さまざまに變化する。その龜の水に棲むをば神龜といひ、山に棲むをば籠龜ぜいぎといふ。いづれも龜の聖なるものだ。火龜といふは火鼠などのやうに(三)炎地に生ずるもの、攝龜といふは呬蛇龜かふじやき、文龜といふは鱗鱗しんりん、瑇瑁たいまゐのことである。後世では山、澤、水、火の差異を區別せずして、通じて小なるものを神龜とし、年久しきものを靈龜としてあるが、誤である。本經では、龜甲をただ水中のものと言つてある。而るに諸家の註に始めて神龜を用ゐるといひ出したが、しかし神龜は得難いもので、現に一般には、ただ水中の普通の龜を取つて藥に入れる。故に此には總稱して水龜なる標名めいごの下に諸種の龜を綜括そうくわつした。

集 解

時珍曰く、甲蟲は三百六十あつて、神龜がその長である。龜は、形は離かたぎに象り、その神は坎かんに在り、上の隆たふくして文もんあるは天に法り、下の平にして理あるは地に法つてあつて、陰に背そむき、陽に向ひ、頭は蛇の如く、頸は龍の如く、骨が外に在り、肉が内にあり、腸は首に接屬せつじくして能く任脈じんみくに(二)運り、肩廣く、腰大きく、卵生にして情思を以て子を抱養する。離れてゐながら守護するのだ。その呼吸は耳を以てし、雌と雄と交尾かうびするが、蛇とも交接する。或は、大腰にして雄なしともい

(三) 運、或ハ連カ。

(龜)導引ハ今日ノ體操ニ似タルコト、呼吸シ俯仰シ手足ヲ屈伸スルコト。

(蕨)蕨ハ蒼ニ同ジ。

(香油)香油、本草疊言ニ菜油ニ作ル。

ふが、それは謬だ。現に一般にその底甲を視て雌と雄との區別をつけてゐる。龜は春、夏に蟄ちつを出て甲を脱し、秋、冬は穴に藏かくれて導引するものだ。それ故に靈妙にして壽命が長いのである。南越志には『神龜は拳こぶしほどの大いさで色は金の如く、上甲の兩邊は鋸齒きんしの如く、爪は至いたつて利く、樹に攀のぼち上あつて蟬を食ふ』とあり、抱朴子には『千歳の靈龜は五色具はり、玉の如く、石の如く、變化測はかり難いもので、或は大に、或は小に、或は蓮葉の上に遊び、或は蕨すざう叢の上に伏す』とあり、張世南の質龜論には『龜は老いれば神あるもので、年八百に達したものは反つて錢ほどの大いさになり、夏は蓮の葉の上に遊び、冬は蓮根の節ふしの中に藏れる。その息には煤煙のやうな黒氣があるので、蓮の心に居てもそれがゐることが明瞭に判る。もしこの氣を見ても驚あわき慌あわてるに及ばぬものだ。潛かに油管を含んで嗅かげば龜はその姿を隠せぬものである』とある。或は、龜は鐵聲を聞けば伏し、蚊に嗜さされると死ぬ。(香油)香油を眼に抹すると水に入れても沈まなくなる。桑の老木で煮れば爛なれ易いともいふ。いづれも物には相互に相制伏する微妙な關係があるからだ。

龜甲

釋名

神屋(本經)

敗龜版(日華)

敗將(日華)

漏天機(圖經)

時珍

曰く、いづれも隱名だ。

集解

別錄に曰く、龜甲は南海の池澤、及び湖水中に生ずる。採取に一定の時期はない。濕に中らしめてはならぬ。濕すれば有毒である。

陶弘景曰く、これは水中の神龜の長さ一尺二寸のものをを用うるを善しとする。(七) 鱗はトに用うべく、殼は藥に入るべく、また仙方にも入れる。生きた龜を炙いて取るべきものである。

韓保昇曰く、(八) 湖州、江州、交州のものは、骨が白くして厚く、その色が鮮明だ。トに用ゐ、藥に入れて最も良し。

大明曰く、ト龜は、小さいもので腹の下に曾て十回もトの文象を鑽つたことのあるものを敗龜版と名ける。藥に入れて良好だ。

蘇頌曰く、今は(九) 江湖の地方いづれにもある。藥用には神龜を用うべきもので、心臓部に當つた一个處に四方透明にして琥珀のやうな色のある神龜版が最も佳し。

そのものの頭が方で脚が短く、殼が圓く版の白いものは陽龜、頭が尖つて脚が長く、殼が長く版の黄なるものは陰龜であつて、(一〇) 陰人には秋(陽の尅字)を用ゐ (一一) 秋人に

(七) 鱗ハ底甲ヲ指ス。

(八) 湖州ハ唐ニ置ク、今ノ浙江省吳興縣ノ舊治ナリ。江州ハ石部雲母ノ註、交州ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(九) 本草彙言ニ厚字上ニ肉字アリ。

(一〇) 江湖ハ江西、湖南、揚子江、洞庭湖ニ沿ヘル地方ヲ指ス。

(一一) 陰人ハ陰氣ノ人ナラン。

(一二) 陽人ハ陽氣ノ人ナラン。

二三攻ハ甲ヲ取ルヲ
云フ。

は隄(陰の俗字)を用ゐるのであるが、今の醫家はかやうな區別を知らない。

時珍曰く、古代には、龜を取るには秋を以てし、龜を(二)攻むるには春を以てしたものだ。現今の龜を取る者は、一時に數十百を採り聚めて、生ながら鋸で甲を取り、その肉を食ふ。彼等の仲間で龜王、龜相、龜將などいふ名目があるが、それは皆その腹、背、左、右の文に因つて區別するのであつて、龜の真中の文を千里といひ、その首の横文第一級の左右にある斜理がみなその千里に接續するものが龜王である。それ以外の龜にはかやうになつてゐない。事を占ふに、帝王はその王を用ゐ、文には相を用ゐ、武には將を用ゐ、それぞれその等級に隨つて用ゐたものだといふが、その説は逸禮の記載に『天子は一尺二寸、諸侯は八寸、大夫は六寸、士庶は四寸』とある説と符合するところがあつて、やはり甚だ筋道が立つてゐる。かの神龜、寶龜などいふものになつては、世間一般には得難いものであるから、藥に入れるにはやはりこの寸法に依つて用うべきもののやうである。日華が、卜龜に用ゐる小甲といつたのは、蓋し簡便な方法を採用したまでのことだ。又、按ずるに、經に「龜甲は濕に中らしめてはならぬ。一名神屋といふ」とあり、陶氏は「曆は卜に供すべ

し、穀は藥に入るべし』といつてあるのだから、古代には上、下の甲いづれも用ゐたものらしい。日華に至つて、始めて龜版を用ゐるといひ出してから、後世一般に主としてそれを用ゐるやうになつたのである。

正誤

吳球曰く、既往の諸大家が敗龜版を用ゐて陰を補したのは、その氣を借りたものである。今は一般に鑽つたことのあるもの、及び煮たものを用ゐるが、それでは性氣が無くなつて了ふものだ。ただ靈山諸谷にある風に因て墜ちた自敗せるものが最も佳い。田池中の自敗せるものはこれに次ぎ、人間が打ち壞つたものは又これに次ぐ。

時珍曰く、按ずるに、陶氏は生きた龜から炙つて取つたものを用ゐるといひ、日華は灼いたことの多いものを用ゐるといひ、いづれも生性、神靈のあるものを以てすることになつてゐるのであつて、敗とは鑽り灼くこと陳くして敗れたやうになつたものといふ意味である。吳氏はこの意味を理解せずして、反て自死し枯敗した版を用ゐるもの、また灼いては性を失ふものと考へたのであるが、それは謬だ。風で墜ちて自死せしものも無いことはないが、それはやはりただの山龜である。淺薄

な學者は異論を立てて世を誤り、一般鄙俗の輩はそれに據つて物識ものし顔がはをするものだから、此にその妄を正して置く。

修治

龜甲を鋸で四邊を切り去り、石上で磨淨して灰火で炮やき、酥すを塗つて黄に炙いて用ゐる。また酒で炙き、醋で炙き、猪脂で炙き、灰に焼いて用ゐる場合もある。

氣味

【甘し、平にして毒あり】甄權けん曰く、毒なし。時珍しん曰く、按ずるに、經には『濕に中れば有毒だ』とあるのだから、濕に中らぬものは無毒である。之才さい曰く、沙參さじん、蜚蠊ひれしを惡み、狗膽を畏れ、銀を瘦す。

主治

【甲は、漏下赤白を治し、癰瘰ようろうを破る。瘰癧れいぢ、五痔、陰蝕、濕痺、四肢の重弱、小兒の顛しんの合はぬもの、久しく服すれば身を輕くし、飢えず（未經）】【驚いかさ悲りの氣の心腹痛で久しく立ち得ぬもの、骨中の寒熱、傷寒勞復、或は肌體の寒熱で死せんとするには、これを湯にして用ゐるが良し。久しく服すれば氣を益し、智を資たすけ、健啖けんたんならしめる。燒灰は小兒の頭瘡の燥き難きもの、婦人の陰瘡を治す】
（別錄）【殼は久嗽きうそうに主效があり、瘰癧れいぢを斷つ（弘景）】【殼を炙つて末にし、酒で服すれ

ば風脚弱に主效がある』(蕭炳) (版は血麻痺を治す) (日華) 『焼灰は脱肛を治す』(寛欒)

『下甲は、陰を補し、陰血不足に主效があり、瘀血を去り、血痢を止め、筋骨を續ぎ、勞倦、四肢無力を治す』(震亨) 『腰脚の酸痛を治し、心、腎を補し、大腸を益し、久痢、久洩を止め、難産に主效があり、癰腫を消す。焼灰を鹽瘡に傅ける』(時珍)

發明

震亨曰く、敗龜版は金、水に屬し、大いに補陰の功のあるものだが、本草にその説明を缺いたのは遺憾であつた。蓋し龜なるものは陰中の至陰の物であつて、北方の氣を稟けて生ずるものだ。故に能く陰を補し、血を治し、勞を治するのである。

時珍曰く、龜と鹿とは、いづれも靈妙にして壽命の長いもので、龜は首を常に腹に向つて藏し、能く任脈を通ずるものだ。故にその甲を取つて以て心を補し、腎を補し、血を補するは、いづれも陰を養ふ結果である。鹿は鼻が常に反つて尾に向ひ、能く督脈に通ずるものだ。故にその角を取つて以て命を補し、精を補し、氣を補するは、いづれも陽を養ふ結果である。かやうに物理の玄微、神工の能事は、龜甲の主たる諸病が皆陰虛、血弱の系統に屬する事實に就いて見ても自ら心解される

(二)は命ハ本經逢原ニ
命門トアリ。

次第である。又、鼈甲の條を見よ。

附方

舊二、新十二。

【補陰丸】

丹溪の方である。龜の下甲を酒で炙き、熟地

黃を九蒸九晒して各六兩、黃柏を鹽水に浸して炒り、知母を酒で炒つて各四兩を石器で末にし、猪脊髓うちせきやゐで和して梧子大の丸にし、百丸づつを空心に溫酒で服す。一方では地黃を去り、五味子を炒つて一兩を加へる。【瘧疾の止まぬもの】龜版を焼いて

性を存して研末し、方寸匕を酒で服す。（海上名方）【抑結して散ぜぬもの】龜の下甲

を炙いて五兩、側柏葉を炒つて一兩半、香附かうぶを童尿に浸して炒つて一兩を末にし、

米糊で梧子大の丸にし、一百丸づつを空心に溫酒で服す。【胎產下痢】龜甲一枚を

醋で炙いて末にし、一日一回、一錢を水で飲服する。（經驗方）【難産に分娩を催す】

祕錄では、龜甲を焼いて末にし、方寸匕を酒で服す。○摘玄では、臨産三五日にし

て分娩せず、死に垂たんなたるもの、及び母の體格が矮小わいせうで交骨の開かぬものを治す。乾

龜殼一個を酥そで炙き、婦人の頭髮一握を灰に焼き、川芎、當歸各一兩を用ゐ、七錢

づつを秤はかつて水で煎じて服し、人間が五支里歩行するほどの時間を隔てて再び一服

する。生胞、死胎いづれも下る。【腫毒の初期】敗龜甲一枚を焼いて研り、四錢を

酒で服す。(小品) 【婦人の乳毒】上記の方に同じ。 【小兒の頭瘡】龜甲を灰に焼いて

敷く。(聖惠方) 【月蝕耳瘡】同上。 【口吻に生じた瘡】同上。 【腫瘡の朽臭せるもの】

生龜一箇の殻を取つて醋で黄に炙き、更に煨いて性を存して火毒を出し、輕粉、麝

香を入れ、葱湯で瘡を洗淨して搽敷する。(急救方) 【人に咬まれた傷瘡】龜版骨、鰐

肚骨各一片を焼いて研り、油で調へて搽る。(葉氏摘玄) 【猪咬の瘡】龜版を焼いて研

り、香油で調へて搽る。(葉氏摘玄)

肉 氣 味

【甘く酸し、溫にして毒なし】弘景曰く、羹、臠にして用ゐれば

大いに補するものだ。しかし神靈多きものだから輕しく殺してはならない。記載さ

れた書籍は甚だ多いから、此に一一具説するわけに行かぬ。思邈曰く、(五) 六甲の日

には十二月のいづれの月にも食つてはならぬ。人の神を損ずるものだ。猪肉、菰米、

瓜、苺と食ひ合はせてはならぬ。人を害するものだ。

主 治

【酒に醸したものは、大風の緩急、四肢拘攣、或は久しき癱緩の收まら

ぬものを治して皆瘥える】(蘇恭) 【煮て食へば、濕痺、風痺の身腫、痿折を除く】(孟詵)

【筋骨疼痛、及び一二十年の寒嗽を治し、瀉血、血痢を止める】(時珍)

(五) 六甲、甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅。

發明

時珍曰く、按ずるに、周處の風土記に『江南では、五月五日に肥龜を煮て鹽豉、蒜、蓼を入れて食ひ、菰龜と呼んでゐる』とある。陰内陽外の意味を取つたものだ。

附方

舊一、新六。【熱氣濕痺】腹内の激熱するには、龜肉を五味と共に煮て

食ふ。微泄して奏效する。(普濟方) 【筋骨疼痛】烏龜一個を四脚に分け、その一脚づ

つを用ゐて天花粉、枸杞子各一錢二分、雄黃五分、麝香五分、槐花三錢を入れ、水

一碗で煎じて服す。(纂要奇方) 【十年の欬嗽】或は二十年に及び、醫療の奏效せぬに

は、生龜三箇を普通の方法の如く調理して腸を去り、水五升で三升に煮取つて麴を

浸し、秫米四升を普通の方法の如くにして釀し、全部を飲み盡す。永く再發せぬ。

○又、ある方では、生龜一箇を炊甑中に入れて殺して取り出し、人に尿を放酒させて

浸し、三日目に焼いて研り、醇酒一升でその末を和し、乾飯のやうにして頓服する。

須臾にして大に吐し、嗽囊を吐出すれば癒える。小兒には量を半減する。【痢、及

び瀉血】烏龜肉に沙糖水で椒を拌和して炙き、煮て食ふ。回数多く用ゐれば癒える。

(普濟方)

【勞瘵の失血】田龜を煮て肉を取り、葱、椒、醬油を和して煮て食ふ。陰

を補し、火を降し、虚勞、失血、咯血、欬嗽、寒熱を治す。屢、實驗がある。(吳球
便民食療) 『年久しき痔漏』田龜二三箇を煮て肉を取り、茴香、葱、醬を入れて常に

食ふ。屢、效驗を得た。この疾は大いに糟、醋等のもの、熱物を忌む。(便民食療)

血 氣 味 『鹹し、寒にして毒なし』 主 治 『脱肛に塗る』(甄權) 『打撲傷

損を治するに、酒に和して飲む。同時に生龜肉を搗いて塗る』(時珍)

膽汁 氣 味 『苦し、寒にして毒なし』 主 治 『痘後の自腫で月を経て開

かぬには、これを取つて點けるが良し』(時珍)

溺 采 取 頤曰く、按ずるに、孫光憲の北夢瑣言に『龜は性の嫉妬深いもの

で、蛇と交尾する。それを取つて瓦盆中に入れて置き、鏡に映して他の龜に見せる

と淫情を發して尿を洩すものだ。それを器に取收める。又、ある方法では、紙撚に

火を點けてその尻に點けても失尿するが、これではやや緩なるものだ』とある。

時珍曰く、今は一般に、ただ猪鬃、或は松葉でその鼻を刺して尿を出させる。こ

の方が更に簡便なやうだ。

主 治 『耳に滴せば聾を治す』(甄權) 『舌下に點ければ、大人の中風舌瘡、小

(一) 本草洞詮ニ髮ヲ
鬚ニ作ル。

(二) 木村(重)曰ク、
背甲ハ卵形ナルモ後
部ヤヤ廣ク吻短シ、
腹甲ノ前周縁黃色ナ
リ。南支那、スマト
ラ、琉球等ニ分布ス、
一般ニサンクキ(山
龜)ト稱ス。

兒の驚風不語を治す。胸、背に摩すれば、龜胸、龜背を治す。(時珍)

發明

時珍曰く、龜尿は瘕に走り、骨に透るものだ。故に能く瘡、腫、及び
龜背を治し、鬚髮を染めるのである。按ずるに、龔曉神書に『龜尿で瓷器を磨れ
ば能く軟かになり、墨を磨つて石に書けば能く數分の深さに入る』とあるを見ても
推知される。

附方

舊一、新二。【小兒の龜背】龜尿を胸、背に摩り、久しく繼續すれば瘥
える(孫眞人)【中風不語】烏龜尿少量を舌下に點けるが神妙である(壽域)【若じら
が】龜尿で水蛭すゐしつの細末を調へ、日毎に搥れば自ら黒くなる。その末は粗いものを用
ゐることを忌む。(談野翁方)

秦龜 (別錄上品)

和名 やまがめ
學名 *Geomyda spangleri* (Günther)
科名 いしがめ(石龜)科

釋名

山龜 宗奭曰く、龜は四方にいづれもあるが、ただ秦地方の山中に
は、老龜の極めて大きくして壽命の多いものがある。故にこれを取つて用ゐたもの

(二) 秦トハ今ノ陝西省地方ヲ指ス。

で、その産地を以て區別した名稱だ。

【集解】 別錄に曰く、秦龜は山の陰の土中に生ずる。二月八日に採る。

保昇曰く、今は江南、嶺南の處處にあつて、冬期には土中に藏れ、春、夏、秋は出て溪谷に遊ぶ。古代にはただ秦地のもののみを取つたのだ。

弘景曰く、これは山中の龜で、水に入らぬものことだ。その形は大小一定せぬ。方藥に用ゐることは稀なものだ。

恭曰く、秦龜とは鱗鱓のことで、更に別物ではない。

士良曰く、秦地方では鱓を山龜と呼ぶ。この物だ。

藏器曰く、鱓は海水中に生ずるもの、秦龜は山の陰に生ずるものだ。これは深山中の大龜である。石碑の臺石の龜形が是である。草根、竹萌を食物とし、冬は蟄し、春に出る。卜占家はやはりこれを取つて山澤に關する占をする。掲げ取つた甲は器物の飾にもなるものだ。

頌曰く、鱓は嶺南に生ずる別の一種の山龜であつて、秦龜ではない。龜は種類の甚だ多いもので、その總ての種類を識るは六ヶ敷いことである。蓋し近世では貨

幣にもこれを用ゐず、トの方法を知るものも稀なところから、あまり貴重視されなくなつた。

時珍曰く、山中の通常の龜をば鹿が喜んで食ふ。その大きくしてトに使用し得るものを靈龜といふ。年百歳に達して能く變化するものは筮龜といひ、或は莖草の下に伏し、或は卷耳、苓葉の上に遊ぶもので、抱朴子に所謂『山中で巳の日に時君と稱するは龜のことだ』とあるはこの物だ。鱗鱗に就ては、或は山龜であらうといひ、或は海水中に生ずるといひ、その説が一定せぬが、按ずるに、山海經に『鼃龜は深澤中に生ず』とあり、應劭の漢書の註に『靈鼃は大龜である。雌を鼃、雄を玃なまこといふ』とあるに觀れば、秦龜とは山龜のこと、鼃鼃とは澤龜なまこのことで、爾雅の山龜、澤龜、水龜と合致する。蓋し一種中の二類なのだ。故にその占トに用ゐ、藥に入れ、器を飾る等の效用が全く同一なのだ。

甲 修治

李珣曰く、トに用ゐたことのあるものほど妙である。酥、或は酒を用ゐて黃に炙やいて用ゐる。

氣味

【苦し、溫にして毒なし】

主治

【濕痺氣で身重く、四肢關節の動

搖し得ぬを除く】(別錄) 【頑風冷痺、關節氣壅、婦人の赤白帶下、積癥を破る】(孟詵)

【心を補す】(宗奭) 【鼠麴を治す】(時珍)

發明

宗奭曰く、大龜は物に對して靈なるものだ。故に方家ではこれを補心に用ゐるので、それが甚だ效驗がある。時珍曰く、龜甲の條を見よ。

附方

新二。

【鼠麴】劉涓子の方。山龜殼を炙き、狸骨を炙き、甘草を炙き、雄黃、桂心、乾薑と等分を末にして方寸匕を飲服し、同時に艾で瘡上に灸し、蜜で少量を和して瘡中に入れるが良し。

頭 主 治

【陰乾し、炙き研つて服すれば、長途深遠なる地點まで山に入つても迷はなくなる】(孟詵) 弘景曰く、前臚骨を佩びてもその通りだ。

蟪

龜 (綱目)

和名 あかうみがめ
學名 *Caretta olivacea* (Eschscholtz.)
科名 うみがめ(蟪)科

(一) 木村(重)曰く、海産ノ大ナルモノ地中海、印度洋、太平洋、大西洋ニ分布ス。
イークホ(蟪龜)ト稱スルモノニアナウミガメモアレドモ、市販ニテハあかうみが

釋 名

蟪

音は茲夷(シイ)である。靈蟪(漢書) 靈龜(郭璞註) 龜 音

は拘壁(コウヘキ)である。一には駒蟪と書いてある。負龜 音は備戲(ビキ)であ

め多キニヨリ之ヲ取
ル。

(二) 碑^ひ 跌^ふ ハ 石^{いし} 碑^ひ ノ 臺^{たい}。



【龜 鱉】

る。雜俎に係^{けい}臂^ひと書いたのは正しくない。皮を龜筒と名ける。時珍曰く、鱉^し 龜^い とはその鳴聲^{なきこゑ}が玆夷^しといふやうに聞えるから名けたものだ。龜^き 鱉^{べつ}とは南方人が龜皮を呼ぶときの發音だ。負^ひ 負^ひとは力のある状態であつて、現に^ひ 碑^ひ 跌^ふの形はこれに象^みつて作^つつてある。或は、大なるが鱉^{べつ}、負

集 解

弘景曰く、鱉^{べつ}は廣州に生ずる。

恭曰く、即ち秦龜のことだ。

藏器曰く、鱉^{べつ}は海邊に生ずる。甲に文^{もん}があつて物の飾になるものだ。山龜^{さんき}のことではない。

保昇曰く、蘇恭の説は通論でない。按ずるに、郭璞の爾雅註に『鱉^{べつ}は涪陵郡に出る火龜であつて、その縁甲の文は瑇瑁^{たいまゐ}に似たもので、能く鳴く。甲はやはりトに用ゐられる。俗に靈龜と呼ぶものだ』とあるがこのものだ。

頌曰く、鱉^{べつ}は別の一種であつて、山龜の大なるものだ。秦龜ではない。嶺表錄

〔三〕潮循、潮州ハ陪
ニ置ク、今ノ廣東省
潮安縣ソノ舊治ナ
リ。循州ハ今ノ廣東
省歸善縣ソノ舊治ナ
リ。今ハコノ地方チ
潮循道トス。

に『潮循間に甚だ多い。人間がその背上に立つとそのまま負ふて行く。その郷人は穀を生ながら取つた完全なものを賣ぶので、それを取るときには木を用ゐてその肉を換出するのだが、その際、龜が苦痛に堪へずして吼える聲が物凄く、牛のやうな聲で山谷を振はすばかりだ。古人の所謂生龜脱筒とはこれを指したものである。工人はその甲の通明な黄色のものを煮て、瑋瑁を拍陷して器に作る。これを龜筒といふ』とある。薬に入るにもやはり生脱のものを主とする。

日華曰く、鱉鱉、即ち龜龜であつて、皮は珍玩物とし、物の裝飾に用ゐる。

時珍曰く、鱉鱉に關する諸説は一定せぬが、按ずるに、山海經には『龜鼈は深澤中に生ず』とあつて、その註に『大龜である。甲には文彩があり、瑋瑁に似て薄い』とある。應劭の漢書の註には『靈龜は大龜であつて、雄を瑋瑁といひ、雌を鱉鱉といふ』とある。いづれも出處が古典であり、衆くの人人の考覈檢討を経たものだ、この二説に據るならば、鱉鱉、即ち龜龜の大なるものといふことになる。藏器、日華の説を以て正しきものとなすべきであらう。これは海邊に生じて山に棲息し、水中に入つて食物を攝るところの瑋瑁の屬である。山龜ならば水中には入らないものだ。

(目) 縵胡ハ肉柑ナリ
ト周禮註ニ見ユ。
(二) 貼飾トハ象箒ノ
如キカ。

(三) 木村(重)曰ク、龜
譜、和名あなうみが
め、學名Chelonia ja
ponica (Thunb.)
うみがめ科
あなうみがめチ言フ
カ、熱帯、亜熱帯附
近ニモ産ス。後放テ
俟ツ。

故に功用が専ら解毒にあることも瑤瑁と相同じいのであつて、その點でも了解され
るわけである。劉欣期の交州記には『蚶蜘は瑤瑁に似て大いさ笠ほどあり、四足は
縵胡にして指爪がなく、その甲には黒珠の文采がある。その斑は錦文のやうだが、
薄くして色淺く、器に作れるほどのものでない。ただ貼飾に使ふ位のものだ。今
は一般にこれを鼈皮と呼ぶ』とある。臨海水土記には『その形は龜鼈のやうだ。そ
の甲には黃點があつて光があり、廣さ七八寸、長さ二三尺のものである。彼の地で
はこれを瑤瑁の偽物にする。肉は鼈のやうな味で食へる。卵は鴨卵ほどの大いさの
正圓のものだ、生で食へば鳥卵よりも美味だ』とある。西陽雜俎には『係臂は龜の
やうな形狀だ。南海に生ずる。捕取する者は必ず先づ祭つて後に取る』とある。

附 錄

(六) 龜 音は迷麻(メイマ)である。鼈 音は朝(テウ)である。時珍曰く、

按ずるに、臨海水土記に『龜鼈は形狀は龜鼈に似て甲が薄く、その形は龜に似た大
きいもので、味は極めて美味だ。一箇に付て三斛の膏がある。又、鼈といふがある。
これも龜鼈のやうなもので、腹は羊胃のやうなもので、やはり啖へる。いづれも海
邊の沙中に生ずる』とある。

肉

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【風熱を去り、腸、胃を利す】

(時珍)

血

氣味

【鹹し、平にして微毒あり】

主治

【俚俗の者の毒箭傷を療ず】

(弘景)

【刀箭に中つて悶絶したるには、刺して血を飲めば平安になる】(日華)

藏器

曰く、南方の地で用ゐる、毒箭の焦銅、及び蛇汁毒にもやはり多くこれを養つて用ゐる。

龜筒

釋名

鼈皮

氣味

【甘く鹹し、平にして毒なし】

主治

【血

疾、及び刀箭の毒に中りたるには、煎汁を飲む】(大明) 【藥毒、蠱毒を解す】(時珍)

玳瑁 (宋開寶)

和名 たいまい
學名 Eretmochelys squamosa (Günth.)
科名 うみがめ(鱗龜)科

(一) 本村(重)曰ク、
鼈甲細工ニ用ウル海
産ノ龜、熱帶ニ多ク
南日本ニモ産ス。

(二) 媚嫉ハネタムナ
リ。

釋名

玳瑁

代味(タイマイ)と發音し、又、毒冒(トクモク)と發音する。時珍曰

く、その功力は毒を解するもので、毒物から媚嫉されるものの意味で名けたものだ。

集解

藏器曰く、瑤瑁は嶺南の海岸、山水の間に生ずる。大いさ扇ほどのものだ。龜甲に似て中に文がある。

士良曰く、その身は龜に似て、首、嘴は鸚鵡のやうなものだ。

頤曰く、現に廣南にはいづれにもある。龜の類だ。大なるものは盤ほどあり、

(三) 廣南ハ廣東、廣西以南。



瑤 瑁

その腹、背の甲には皆紅點斑文がある。薬に入れるには生のものをを用うべきものだ。生なれば靈妙なるもので、凡そ有毒の飲食物に遇ふと、必ず自ら動搖するが、死んだものではその靈妙な作用がない。今一般には雜龜筒で作つた器皿を多く用ゐてゐるが、あれは皆殺して取つたものか、又は一旦煮拍したものである。故に生のものはまことに得難い。

時珍曰く、按ずるに、范成大の處衡志に『玳瑁は海洋の深い處に生じ、状態は龜、

龜のやうで殻がやや長く、背に十二片の甲があり、黒、白の斑文が相錯り、その邊

は鋸齒のやうに缺けてゐる。足は無くして四蟹があり、前は長く、後が短く、背に

は甲のやうな斑文の鱗がある。海人は鹽水に入れ小魚を與へて飼養する』とある。

(四) 大觀本草ニハ玳瑁邊ノ下ニ有花ノ二字アリ。

又、顧玠の海槎録には『大なるものは得難く、小なるものは時時ある。但し老いたものは甲が厚くして色が明かだが、少いものは甲が薄くして色が暗い。世間では鞭たれてその血が斑に成るのだといふが、それは謬だ。これを捕取したときは、必ずその身を倒に懸けて沸き返る醋を潑けるのであるが、それで甲は片片毎に手に随つて落ちるものだ』とある。南方異物志には『大なるは蓮條ほどあつて、背上に大いさ扇ほどの鱗がある。それを取下すと文が現はれるのだ。煮て柔かにして器に作るのだが、その修治に鯨魚皮を用ゐ、瑩くに枯木葉を用ゐれば光澤が出る』とある。陸佃は『瑤瑁は再交せず、卵を望んで影抱する。これを護卵といふ』といつてある。

附 録

〔金〕 撒八兒

時珍曰く、按ずるに、劉郁の西域記に『〔金〕 西海中に出る、玳瑁の遺精であつて、鯨魚がそれを呑んで一旦食つてから吐出し、それが年久しくして結晶するものである。その価格は金と匹敵する。偽物は犀牛の糞で作る』とある。

〔金〕 木村(重)曰ク、撒八兒未詳。
〔金〕 西海トハ今ノ地中海ヲ指スモノノ如シ。

切に謂ふに、この物はかやうに貴重視される以上、必ず何かの功用がなければならぬ筈と思ふが、果して玳瑁の遺精なりや否やも判らず、探究すべき考證の手掛りもない。姑く此に附録して後の博識に俟つ。

甲 氣味

【甘し、寒にして毒なし】宗奭曰く、藥用には、生のものを用ゐ

れば性味が完全だ。一旦湯、火を経たものでは用をなさぬ。生、熟の犀の場合と同様だ。

主治

【嶺南の百藥の毒を解す】（藏器）【癥結を破り、癰毒を消し、驚癇を止

める】（日華）【心風を療じ、煩熱を解し、氣血を行^やり、大、小腸を利す。功は肉と同

じ】（士良）【磨汁を服すれば蠱毒を解し、生で佩びれば蠱毒を辟ける】（蘇頌）【痘毒を

解し、心神の急驚、客忤、傷寒の熱結、狂言を鎮める】（時珍）

發明

時珍曰く、玳瑁の解毒、清熱の功は犀角に同じ。古方には用ゐてなか

つたが、宋時代に入つて至寶丹に用ゐたのが始めである。又、鼈甲の條を見よ。

附方

舊一、新三。【蠱毒を解す】生玳瑁を磨つて濃汁^{のうじゅ}を作り、一盞を水で服す

れば消する。（楊氏產乳）【痘毒の豫防】流行時にこれを服すれば、未發のものは内消

し、已に發したのもも稀少で免れる。生玳瑁、生犀角を各汁に磨つて一合を和勻^{わきん}し、

一日三回、半合づつを溫服するが最も良し（靈苑方）【痘瘡の黒陷】乃ち心熱で血が

凝るのである。生玳瑁、生犀角を共に汁に磨つて一合に、猪心血少量、紫草湯五匙

を入れて和勻し、溫服する。(開人規瘰癧論) 【風に當つて目に涙の出るもの】乃ち心、腎の虛熱である。生瑤琨、羚羊角各一兩、石燕子一雙を末にし、一日一回、一錢づつを薄荷湯で服す。(鴻飛集)

肉

【氣味】甘し、平にして毒なし

主治

【諸風毒。邪熱を逐ひ、胸膈

の風熱を去り、氣血を行り、心神を鎮め、大、小腸を利し、婦人の經脈を通ずる】
(土貢)

血

主治

【諸藥毒を解す。刺してその血を飲む】(問寶)

綠毛龜 (蒙筌)

和名 くさがめ
學名 *Geodemyx karevicii* (Gray)
科名 いしがめ(石龜)科

釋名

綠衣使者(綱目)

集解

時珍曰く、綠毛龜は南海の(三)内郷、及び(四)唐縣に出るとあるが、今はただ蘄州でこれを方物に充てるだけである。飼養販賣を營業とする者は、溪澗からこれを取つて水缸中に入れ、魚鰕を餌として飼ふのであるが、冬になつてその水を

(一)木村(重)曰ク、背甲稍長圓形ニシテ腹甲ノ接合面ノミ黃色ナリ、吻端稍尖ル。朝鮮、東南支那、日本南部ニ産ス。背甲ニ綠藻類ノ附著セルチミのがめト稱ス。一般ニルーモークキ(綠毛龜)ト呼ブ。
(二)内郷、今ノ河南省汝陽道ニ内郷縣ア

レドモ、此ニハ南海
トアレバソノ地トハ
異ルガ如シ。或ハ南
海ハ南陽ノ寫誤カ。
（一）唐縣ハ今ハ河北
省保定道ニ屬ス。漢
ニ置ク。



〔龜 毛 線〕

除くと久しい間に長さ四五寸の毛が生えてゐて、その毛の中に金線があり、脊骨に三稜さんりょうがあつて、その底中に象牙ぞうげのやうな色の部分が生ずる。

大いさ五銖錢ほどのものが眞物だ、他の龜では、久しく養へばやはり毛は生えるが、ただ大きいことと、金線が生ぜぬことと、底中の色が黄黒であるだけの相異がある。南齊書の記載に『永明年間に、青毛の神龜を獻じたものがあつた』とある

はこの物だ。又、錄異記に『唐の玄宗の時、方士が徑一寸の小龜を獻じた。金色愛すべきもので、椀中に置けば能く蛇虺じへきの毒を避けるさうだ』とある。これもやはり龜類中の特異なものだ。

修 治

時珍曰く、この龜は古方には用ゐてない。近世の滋補じほの方に往往用ゐてあるが、大體に於て龜甲と同功だ。劉氏の先天丸にこれを用ゐてあるが、その方は、龜九箇を用ゐ、活きた鯉二尾を釜かま中に入れて水を入れ、米篩で覆ふてその上に龜を載せ、蒸熟して肉を取つて晒乾し、その甲をば酥で黃に炙き、それを藥に入れて用ゐる。又、甲、肉、頭、頸を俱に用ゐることもある。

氣味

【甘く酸し、平にして毒なし】

主治

【任脈を通じ、陽道を助け、陰血を補し、精氣を益し、痿弱を治す】（時珍）
【額の端に縛り付けて置けば能く邪瘡を禁じ、書笥に收藏して置けば蠹蟲を辟ける】（嘉謨）

瘡 龜（拾遺）

和名 缺

學名 *Platygeron megacephalum*, Gray.
科名 いしがめ（石龜）科

集解

藏器曰く、高山の石下に生ずる。頭が偏で嘴が太い。

氣味

【毒なし】

主治

【老瘡の不定時に發作するものを瘡瘡と名ける。俚俗には妖瘡と呼ぶ。この龜を灰に焼いて二錢を頓服する。微し利するものだ。頭を用ゐるが一層佳良だ。或は發作時にそれを煮た湯の中に坐浴する。或は病人の寢臺の附近に懸ける】（藏器）

鵜 龜（拾遺）

和名 まるがめ

學名 *Cyclenys limonuginata*, Gray.
科名 いしがめ（石龜）科

（一）木村（重）曰ク、體ハ扁平ニ尾長ク、吻ハ可成長ク嘴狀チ旱ス。福建省及南方ノ河水ニ産ス。

（二）木村（重）曰ク、背中稍卵形ナルモ後方ヤヤ廣シ、爪ヨク

發達ス、腹中ハ黑色。
支那、臺灣等ニ分布
ス。コレニ不詳ノ所
多シ、今假ニ定メテ
後攻ナ俟ツ。
(二)本書ニ相ナ紐(音
ハ紐チウ)ニ作ル。
相陽之山、怪水、未
考。

集解

藏器曰く、南海に生ずる。形狀は龜のやうで長さ二三尺あり、兩眼が側部にあつて鶚がくのやうなものだ。また水龜とも呼ぶが前に掲げた水龜とは異ふ。

附錄

旋龜 時珍曰く、按ずるに、山海經に『三相陽の山、怪水焉に出づ、中に旋龜多し。首は鳥、尾は虺き、聲は木を破るが如し。これを佩ふれば聲うを已む』とあるが、やはりこの物の類である。

氣味

【毒なし】

主治

【婦人の難産。臨月にこれを佩び、臨産時に、焼いて末にして酒で服す】

【藏器】

攝龜 (蜀本草)

和名不明
學名不明
科名不明

釋名

呬蛇龜(日華) 夾蛇と書いてある。陵龜(郭璞) 鸞龜(陶弘景) 鰐龜

(抱朴子) 恭曰く、鸞龜は腹が折けるもので、蛇を見ると呬すつて食ふ。故に楚地方では呬蛇龜と呼ぶ。江東で陵龜と呼ぶは丘陵にゐるからだ。時珍曰く、呬蛇あふじやなる名

(一)楚ハ石部石炭ノ註ヲ見ヨ。

(二) 蛇ハ呷ノ誤、一呷ハ音サウ。



〔龜 蛇 呷〕
— 龜 蛇 呷 —

稱が既にあつたところから見ると、攝せふといふはやはり(三)蛇の音の轉訛したものであらう。鰐あうもやはり鵞あうの音の轉訛らしい。

集 解

弘景曰く、鵞あうは小龜であつて、處處にゐる。狭小にして尾が長い。吉凶を卜うふに用ゐると、龜とは正反對に表れる。

保昇曰く、攝龜は腹が小さくして中心が横に折ひけ、能く自ら開閉し、好んで蛇を食ふ。

肉 氣 味

【甘し、寒にして毒あり】 詵曰く、この物は蛇を噉くふものだ。肉は食はれない。殻も用ゐるに堪へぬものだ。

主 治

【生で研つて撲損の筋脈傷に塗る】(土良) 【生で搗ついて蛇傷を罨おふ。蛇を食ふものだからだ】(弘景)

尾 主 治

【これを佩さびれば蛇を辟さける。蛇咬には、刮つて末にして傳ければ愈える】(抱朴子)

甲 主 治

【人咬瘡の潰爛には、灰に焼いて傳ける】(時珍) 摘玄に記載がある。

貢龜

音は奔(ホン)である。

(綱目)

和名不明
學名不明
科名不明

釋名

三足龜(爾雅)

集解

時珍曰く、按ずるに、山海經に『(一)狂水、西に(二)伊水に注ぐ。中に三足龜多し。これを食へば大疾なし。以て腫を已む可し』とあり、唐書に『(三)江州から六眼龜を獻じた』とあり、大明會典に『(四)遼羅國から六足の龜を獻じた』とあり、宋史に『趙霆が兩頭の龜を獻じた』とある。これまた前代には一般に知られなかつたものだ。

肉氣味

主治

【これを食へば時疾を辟け、腫を消す】(山海經)

(一)鼈

(本經中品)

和名 しなすつはん
學名 Amyia sinensis, (Wiegmann.)
科名 すつはん(鼈)科

(一) 狂水、中次七經、大苦之山ノ條下ニアリ。伊水ノ支流ニシテ、河南省登封縣南方陽城山脈中ノ大苦山ヨリ出ヅ。狂水今ナホソノ名ヲ呼ブ。
(二) 伊水ハ河南省豫耳山ニ源ヲ發シ同省懷慶縣ニテ洛水ト合シ黄河ニ入ル。
(三) 江南ハ石都雲母ノ註ヲ見ヨ。
(四) 遼羅國、即チ今ノシヤム國。

(一) 木村(重)曰ク、背甲ハ黝影、腹甲ハ淡青色、腹甲ハ乳白色ヲ常トスレドモ體

一帯ニ灰色ノモノナ
リ、(龍ノ項參照) 南
支ニ多キモ廣東省ヨ
リ北支ニ分布サル、
一般ニキヤユー(甲
魚)ドリユー(團魚)
ト稱スル。
(一) 神守ノ二字、本
草彙言、本草洞詮共
ニ守神ニ作ル。

釋名

團魚(俗名)

(一) 神守

時珍曰く、鼈は歩行する態が蹙蹙たるものだから

鼈といつたのだ。淮南子に「鼈は耳無くして神を守る」とある。神守なる名稱はそれから出たものだ。陸佃は「魚が満三千六百個に達すれば蛟龍がそれを引いて飛ぶのであるが、納鼈が守るのでそれを免れる。故に鼈を神守と名ける」といつた。

河伯從事 古今注

集解

時珍曰く、鼈は甲蟲であつて、水に居り陸に生じ、脊は背くして脇に

連る。龜と同類だ。四面の縁に肉裙があるところから、龜は甲が肉を裹み、鼈は肉が甲を裹むといふのである。耳が無く、目を以て聴く。雌のみのもので雄がなく、蛇、及び鼈と雌雄の配匹をなす。故に萬畢術に「鼈脂を焼けば鼈を誘ひ寄せる」といつたのだ。夏期に子を孵化して成育する、抱くこと影を以てするといふ、即ち遠方より保護してゐるもので、埤雅に「卵生し、思抱す」とあるもこれを謂つたのだ。その位置は日影に随つて轉ずる。水中にこの物がゐると必ずその上に浮沫がある。それを鼈津といふ。一般にその沫を目當に取るもので、現に呼鼈者といふがあつて、一種微妙な聲を作し掌を撫して呼び寄せ、その津を目當にして捕取するが、百十に

(三) 白井云ク、涸ハ水名ナリト云フガ何處ナルヤ未詳。

(四) 丹陽ハ草部勞草類積雪草ノ註ヲ見ヨ

(五) 岳州ハ草部隰草類連翹ノ註ヲ見ヨ

(六) 沅江ハ鱗部蛇類鱗蛇ノ註ヲ見ヨ

(七) 連鰐ハ下甲上甲ニ連續スルモノ

(八) 乾巖ハ乾燥セル肉塊ノコトヲラン



〔 龜 〕

大なる能ふ。なまの龜を。ふいと。なまの龜を。ふいと。なまの龜を。ふいと。

一回も失たない。管子に『涸水の精なるを名けて鰐といふ。名を以てこれと呼んで取るべし』とある。魚鼈は正にこの類だ。類従には『鼈一たび鳴けば鼈伏す』とある。その性が相制するのだ。又、蚊を畏れるもので、生きた鼈が蚊に叮されると死ぬ。鼈を料理する場合に蚊を入れて煮れば爛れるものだ。しかし蚊を熏ずるにもまた鼈甲を用ゐる。物の性にかやうな報復の關係あるは不思議なものだ。淮南子に『膏が鼈を殺す』とあるが、これは他の生物に類推は出来ぬことだ。

鼈甲

修 治

別錄に曰く、鼈甲は丹陽の池澤に生ずる。採るに一定の時期はない。

頤曰く、今は處處にあるが、岳州、沅江に産する甲に九肋のあるものが勝れたものだ。薬に入れるには、醋で黄に炙いて用ゐる。

弘景曰く、これを採取したならば、生で甲を取つて肉を剥去したものが好し。凡そ連鰐、及び乾巖あるものならば眞物であるが、肋骨の出たものは煮熟したもの

のだから用ゐられない。

數^〇日く、凡そこれを使用するには、必ず綠色で九筋の肋があり、裙多く、重量七兩あるものを用ゐるを上とする。瓶の底を六一泥で固め、乾くを待つて甲をその中に置き、物を以てその瓶を拵^{とこ}へ上げ、瘰癧^{ちようらんい}を治し心を定むる藥の場合には、その瓶中に頭醋を入れて大火で煎じ、醋三升を煎じ盡したとき、裙、肋骨を去つて炙^やき乾して藥に入れる。勞を治し熱を去る藥の場合には、醋を用ゐずして童尿を用ゐ、一斗二升を煎じ盡したとき、裙を去り骨を留め、石臼で粉に搗いて雞胓^{けいひ}皮で裹み、東流水三升を入れた盆の上に置き、一夜經て取つて用ゐる。かくすれば萬倍の藥力がある。時珍曰く、按ずるに、衛生寶鑑には『凡そ鼈甲は、煨^い竈灰一斗、酒五升に一夜浸し、膠^{かう}、漆のやうに煮爛して用ゐるが更に佳く。桑柴灰を用ゐるが就中妙だ』とある。

氣味

【鹹し、平にして毒なし】之^〇才曰く、礬石^{はんせき}、理石を惡む。

主治

【心腹癥瘕、堅積寒熱、痞疾^{ひしつ}、息肉、陰蝕、痔核、惡肉を去る】〔本經〕

【溫瘧、血瘕の腰痛、小兒の脇下堅を療ず】〔別錄〕【宿食、瘕塊^{ちようくわい}、瘰癧、冷瘕、勞瘦。

骨熱、骨節間の勞熱、結實壅塞、下氣、婦人の漏下五色を除き、瘀血を下す】（費權）

【血氣を去り、癥結、惡血を破り、胎を墮し、瘡腫、腸癰、并に撲損瘀血を消す】

（日華）【陰を補し、氣を補す】（震亨）【老瘡、瘡母、陰毒、腹痛、勞復、食復、斑痘、

煩喘、小兒の驚癇、婦人の經脈不通、難產、産後の陰脱、男子の陰瘡、石淋を除き、

潰癰を斂める】（時珍）

發明

宗奭曰く、經の本文中には勞を治することを言つてないが、ただ藥性論に、勞瘦、骨熱を治すと言つてあるところから、虚勞にこれを多く用ゐる。しかしそれには甚だ基準があるのであつて、用劑を過量にしてはならないものだ。

時珍曰く、鼈甲なるものは厥陰、肝の經の血分の藥であつて、肝は血を主るものである。嘗て注意して視るに、龜、鼈の屬はそれぞれ功力に特長を有するのであつて、鼈は色青くして肝に入る。故にその主たるものは瘧、勞の寒熱、瘰癧、驚癇、經水、癰腫、陰瘡であつて、いづれも厥陰の血分の病である。瑤琨は色赤くして心に入る。故にその主たるものは心風、驚熱、傷寒、狂亂、痘毒、腫毒であつて、いづれも少陰の血分の病である。秦龜は色黄にして脾に入る。故にその主たるものは

頑風、濕痺、身重、蠱毒こどくであつて、いづれも太陰の血分の病である。水瘧は色黒くして腎に入る。故にその主たるものは陰虛、精弱、腰脚の痠痿しゅんち、陰瘧、洩痢せりであつて、いづれも少陰の血分の病である。介蟲は陰類だからいづれも陰の經の血分の病を主とするのであつて、その類に従ふのである。

附方

舊十三、新六。

【老瘧、勞瘧】鼈甲を醋で炙つて研末し、酒で方寸匕を服

す。隔夜に一服し、早朝に一服し、發作時はつさじに一服する。斷たざるものなし。雄黃少量を入れるが更に佳し。（肘後）【奔豚氣痛】上に心腹に冲さるには、鼈甲を醋で炙つて三兩、京三稜を煨いて二兩を用ゐ、桃仁たうにんを皮尖を去つて四兩を湯に浸して汁に研り、三升を二升に煎じて末を入れ、煎じて良久しくして醋一升を投じ、錫たうのやうに煎じて餅（餅）に收め、半匙づつを空心に酒で服す。（聖濟錄）【血癖癥癖】甄權曰く、鼈甲（こはく）、琥珀、

大黃等分を散にし、二錢を酒で服す。少時して惡血が下る。婦人患者の場合、小腸中

の血が下り盡したならば服用を休める。【疝癖癥積】甄權曰く、鼈甲を醋で黄に炙

いて研末し、牛乳一合で一匙づつを調へて毎朝服す。【婦人の漏下】甄權曰く、鼈

甲を醋で炙つて研末し、一日二回、方寸匕を清酒で服す。○又、乾薑かんきやう、鼈甲、訶黎かれい

勒皮等分を末にし、糊で丸にし、一日二回、空心に三十丸づつを服す。【婦人難産】
鼈甲を焼いて性を存して研末し、酒で方寸匕を服すれば立ろに分娩する。(梅師) 【勞
復、食復】危篤の大病の回復期に勞を受け、胃を傷め、ために復して死せんとする
には、鼈甲を焼いて研り、方寸匕を水で服す。(肘後方) 【小兒の痢疾】鼈甲を炙いて
研り、一日二回、一錢づつを乳で服す。蜜で丸にして服するもよし。(子母錄) 【突然
の腰痛】俯仰し得ぬには、鼈甲を炙いて研末し、一日二回、方寸匕を酒で服す。(肘
後方) 【沙石淋痛】九肋の鼈甲を醋で炙いて研末し、一日三回、方寸匕を酒で服す。
石が出て瘥える。(肘後方) 【陰虛の夢泄】九肋の鼈甲を焼いて研り、一字づつを、酒
半盞、童尿半盞、葱白七寸を共に煎じて葱を去つたもので日晡時に服す。臭汗の出
るを度とする。(醫學元要) 【吐血の止まぬもの】鼈甲、蛤粉各一兩を共に黄色に炒り、
熟地黄一兩半を晒乾し、末にして二錢づつを食後に茶で服す。(聖濟錄) 【癰疽煩喘】
小便の利せぬには、鼈甲二兩、燈心一把、水一升半を六合に煎じ、二回に分服する。
凡そ患者の大小便に血あるは中壞である。黑脈となつて膿なきは十人が十人まで死
亡する不治のものだ。(龍安時傷寒論) 【癰疽の斂らぬもの】發背と一切の瘡とに拘ら

ず、鼈甲を焼いて性を存し、研つて掺る。甚だ妙である。(李機怪症奇方) 【腸癰肉痛】
鼈甲を焼いて性を存して研り、一日三回、一錢づつを水で服す。(傳信方) 【陰頭に瘡
を生じたるもの】治し難いものだ。鼈甲一枚を焼いて研り、雞子白で和して傳ける。
(千金翼) 【藩唇緊裂】鼈の甲、及び頭を焼き、研つて傳ける。(類要) 【指を人に咬まれ
て爛れたもの】久しくして脱せんとするには、鼈甲を灰に焼いて傳ける。(葉氏摘玄方)
肉 氣味 【甘し、平にして毒なし】 頤曰く、久しく食すれば、性冷にして
人を損する。

藏器曰く、禮記に『鼈を食ふには醢を去る』とあるは、頤下にある龜の形のやう
な軟骨をいふのであつて、これを食へば水病を患ふものだ。凡そ鼈は、三足あるも
の、赤足のもの、獨目のもの、頭、足の縮まぬもの、その目の四方の陷んだもの、
腹下に王の字、トの字文のあるもの、腹に蛇文のあるもの——これは蛇の變化した
ものだ——山上にゐるもの——早鼈と名ける——は、いづれも人を殺す毒がある、
食つてはならない。

弘景曰く、雞子。莧菜と食ひ合はせてはならない。昔、ある人が鼈を倒み、赤莧

で包んで濕地に置いたところ、十日ばかり経つとみな生鼈になつてゐたといふ。又、ある人が鼈甲屑を裹んで置いたところ、五日ばかり経つとみな鼈になつてゐたといふ。

思選曰く、猪、兔、鴨の肉と食合すれば人を損するものだから食つてはならぬ。芥子と食合すれば惡瘡を生ずるものだから食つてはならぬ。妊婦が食へば項の短い子が生れるものだ。

時珍曰く、按ずるに、三元參贊書に『鼈は性冷にして水病を發す。冷勞氣、癥瘕のある者は食ふべきものでない』とあるが、生生編に『鼈は性熱なり』とあり、戴原禮は『鼈の陽は上甲に聚るものだ。久しく食すれば人をして發背を生ぜしめる』といつてあつて、性冷なりといふ説に反對してゐるやうに見えるが、蓋し鼈の性は本來熱なるものではないのであつて、これを食ふ場合に椒や薑などの熱物を甚だ多く和するために、その本來の性を失ふに過ぎない。鼈の性は葱、及び桑灰を畏れるものだ。凡そ鼈を食ふには、必ず沙河の小鼈を取るべきもので、頭を斬つて血を去り、桑灰湯で煮熟して骨、甲を去り、水を換へ再び煮て葱、醬を入れ、羹に調理して食

ふが良いのである。その膽の味は辣いものだが、破つて湯中に入れ、椒を代へて用ゐれば腥氣を辟ける。李九華は『鼈肉は聚を主り、鼈甲は散を主る。鼈を食ふには、甲少量を剉み込めばやや平衡を得るものだ』といひ、又、『薄荷で鼈を煮れば能く人を害す』といった。これはみな一般人の氣付かぬことだ。

主治

【傷中に氣を益し、不足を補す】（別錄）【熱氣、濕痺、腹中の激熱には、

五味で煮て食ふ。微泄するものだ】（藏器）

【婦人の漏下五色で羸瘦するものは、常に

これを食ふが宜し】（孟詵）

【婦人の帶下、血瘕腰痛】（日華）【血熱を去り、虛を補す。

久しく食すれば性冷である】（蘇頌）【陰を補す】（震亨）【臞にして食へば、久痢を治し、

髭鬚を長くし、丸にして服すれば、虚勞、痲痺、脚氣を治す】（時珍）

附方

新三。

【痲痺氣塊】大鼈一箇を、蠶沙一斗、桑柴灰一斗で五回淋した淋汁

と共に泥のやうに煮て骨を去り、再び煮て膏にし、搗いて梧子大の丸にし、一日三回、十丸づつを服す。（聖惠方）

【寒濕脚氣】忍び難く疼くには、團魚二箇、水二斗を

一斗に煮て魚を去つて汁を取り、蒼耳、蒼朮、尋風藤各半斤を加へ、七升までに煎

じて渣を去り、盆に盛つて重蒸し、溫むを待つて浸し洗ふ。神效がある。（乾坤生意）

（九）除日ハ十二月晦
日ノコトカ。

【骨蒸欬嗽】潮熱するには、團魚丸——團魚一箇を柴胡、前胡、貝母、知母、杏仁各五錢と共に煮て、熟するを待つて骨、甲、裙を去り、再び煮て肉を食ひ汁を飲み、右の諸藥を焙じ研つて末にし、骨、甲、裙の煮汁で和して梧子大の丸にし、一日二回、三十丸づつを空心に黃芪湯で服し、服し盡したならば參、芪の藥で調和する。
（奇效方）

脂 主 治

【（九）除日に白髮を抜き、この脂を毛孔中に塗れば生えなくなる。

再び生えしめんとするときは白犬の乳汁を塗る】（藏器）

頭 陰乾する。

主 治

【燒灰は小兒の諸疾、婦人産後の陰脫下墜、尸疰、心

腹痛を療す】（恭）

【歷年の脫肛で癒えぬものに傳ける】（日華）

附 方

舊一、新二。

【小兒の尸疰】勞瘦し、或は時に寒熱するには、鼈頭一箇

を灰に燒き、一日一回、新汲水で半錢を服す。（聖惠方）【産後の陰脫】千金では、鼈

頭五箇を燒いて研り、一日三回、井華水で方寸匕を服す。錄驗では、葛根二兩を加

へて酒で服す。【大腸脫肛】久積虛冷には、鼈頭を炙いて研り、一日二回、飲で方

寸匕を服す。同時に末を腸の端に塗る。（千金）

頭血 主治

【脱肛に塗る】（養權の説にある）

【風が血脈に中つて口、眼の喎僻

するもの、小兒の疳勞潮熱】（時珍）

發明

時珍曰く、按ずるに、千金方に『目瞤し、唇動き、口喎するは、みな

風が血脈に入つたものだ。急に小續命湯を服し、外用には鼈血、或は雞冠血で伏龍肝散を調へて塗り、乾けば再び塗る。甚だ妙である』とある。蓋し鼈血の性は急縮して血に走るものだ。故に口喎、脱肛の病を治するのである。

附方

新二。

【中風口喎】鼈血で烏頭末を調へて塗り、止んだならば掲げ去

る。（肘后方）

【小兒の疳勞】潮熱往來し、五心煩燥し、盜汗し、咳嗽するを治するに

主たる鼈血丸——黃連、胡黃連を各、秤つて二兩を、鼈血一盞に吳茱萸一兩と共に一夜浸して炒り乾し、茱萸と鼈血とを去つて研末し、柴胡、川芎、蕪荑各一兩、人參半兩、使君子仁二十個を末にして入れ、粟米粉で煮た糊で和して黍米大ほどの丸にし、一日三回、兒の大小を量つて熱水で服す。（全効心鑑）

卵 主治

【鹽で貯藏して煨いて食へば小兒の下痢を止める】（時珍）

爪 主治

【五月五日に取つて衣領中に藏せば人をして忘れざらしめる】（肘後）

(一) 木村(重)曰ク、しなすつぽんニ似ルモ背甲ノ前方ヤヤ隆起セル瘤節アリ、詳悉ハ不明ナルモ假ニ定メテ後攷ヲ俟ツ、南方支那ニ産ス。

(二) 納 鼈 (宋 圖 經)

和名 缺
學名 Trionyx steindachneri
科名 すつぽん(鼈)科

集 解

頤お曰く、鼈くの裙くなくして頭、足の縮まぬものを名けて納なふといふ。また

肉 氣 味

【毒あり】頤お曰く、これを食へば人をして昏塞せしめるが、黃芪わうぎ、

吳藍ごらんの煎湯を服すれば立ちに解す。

甲 氣 味

【小毒あり】

主 治

【傳尸勞、及び婦人の經閉】(蘇頌)

能 鼈

奴來の切 (綱目)

和名 不明
學名 不明
科名 不明

釋 名

三足鼈

集 解

時珍お曰く、爾雅に『鼈の三足のものを能たふといふ』とあり、郭璞は『今

(一) 吳興ハ三國吳ノ郡名、今ノ浙江省吳興縣ニ治ス。

(二) 陽羨ハ漢ノ縣名、故城ハ今ノ江蘇省宜興縣ノ南五支里ニ在リ。

(三) 太倉ハ明ノ州名、今ノ江蘇省太倉縣ノ治ナリ。

は『吳興ニ陽羨縣の君山池中出现』といつてある。或は『鰥黃熊に化す』といふをこの物だといふが、それは誤だ。

肉 氣味

【大寒にして毒あり】頤曰く、これを食へば死ぬ。

時珍曰く、按ずるに、姚福の庚巳編に『太倉の民家である時三足鼈を取り、妻に烹らせてそれを食ひ、食ひ畢つて寢室に入つたが、少頃すると形體が溶けて血水となり、残つたものは、ただ髪だけになつて了つた。ところが隣家の者がそれを疑ひ、妻が殺害したものらしいと官に訟へたので、縣知事黃廷宣が取調べたが、根據不明のために判決の下しやうがない。そこで別に三足鼈を取つてその妻に調理させ、一人の死刑囚にそれを食はせて獄舎に入れて置いて見ると、やはり前の人と同様に溶けて了つた。それで始めてその疑獄が解決した』とある。竊かに謂ふに、能は有毒にしても此にいふ程であらうとは思はれぬが、けれども理外の事もあるのだから、やはり臆斷は容さない。しかし山海經に『從水、三足鼈多し。これを食へば蠱なし』とあり、近頃またある者が誤つて食つたが無事だつたといふ事實もあるから問題だ。蓋し有毒にして人を害するとはいひ、やはり骨、肉を頓に溶化するほどでは

(四) 從水、山海經ニ從山ヨリ出ヅトアレドモ所在未詳。

ないであらう。

主治

【折傷に痛を止め血を化するに、生で搗いて塗る。道家で諸種の厭穢死えんたいじ氣を辟けるに、或はこの像を畫いて止める】（蘇恭）

朱 鼈 （拾遺）

和名 缺
學名 *Amyda* sp.
科名 すつぽん（鼈）科

集解

藏器曰く、南海に生ずる。大いさ錢ほどのもので、腹は血のやうに赤い。永中に在つて水馬の脚に著けばみな倒れるといふことだ。

時珍曰く、按ずるに、淮南子に「朱鼈波に浮べば必ず大雨あり」とある。

主治

【男子が佩あびると刀劒もその人を傷け得ない。婦人が佩あびると媚色がある】（藏器）

珠 鼈 （綱目）

和名 缺
學名 *Amyda* sp.
科名 すつぽん（鼈）科

（一）木村（重）曰ク、
體形しなすつぽんニ
同シ、體色赤褐色ナ
帶ビタリ。浙江省、
江蘇省ニ分布セル、
食用ニ供セズ、一般
ニチユビ（赤鼈）ト稱
ス。

（二）木村（重）曰ク、
小型ノしなすつぽん
又ハ幼キしなすつぽ
んヲ呼ブ、支那本土
ニ分布ス。チユビ（珠

鼈ト解ス。

(一) 葛山、未詳。

(二) 澧水ハ河南省桐

柏縣ノ西北胎驛山ノ

北麓ニ源ヲ發シ、唐

河ニ入ル。

(三) 高州ハ唐ニ置

ク、今ノ廣東省茂名

縣東北四十支里ニ舊

治アリ。

(一) 木村(重)曰ク、

大型ニシテ吻ハ尖ラ

ズ鈍シ、廣東省海南

島ニ産ス、しなすつ

ぽんの巨大ナルチ云

フ事アリ、蘇州西園

ニ側ハルモノハ此

例ナリ、ユウ(龜)ト

稱ス。

集解

時珍曰く、按ずるに、山海經に『(二)葛山(三)澧水(三)に珠鼈あり。狀肺の如くにして目あり、六足、珠あり』とあり。一統志には『(四)高州の海中に生ずる。状態は肺のやうだ。四目、六足あつて珠を吐く』とあり。呂氏春秋には『澧水の魚の美なるものを名けて珠鼈(五)といふ。六足にして珠あり』とあり。淮南子には『蛤蟹、珠鼈は月と與(六)に盛衰する』とあり。埤雅には『鼈珠は足にあり、蚌珠は腹に在り』とある。いづれもこの物を指したのだ。

氣味

【甘く酸し、毒なし】

主治

【これを食へば疫癘(七)を辟ける】(時珍)

鼈

(拾遺)

和名 缺

學名 *Placodus cantorii*.

科名 すっぽん(鼈)科

釋名

時珍曰く、按ずるに、説文には『鼈(一)は大鼈なり』とある。甲蟲では鼈

が最も大なるものだ。故にその文字は元に従ふのであつて、元とは大の意味である。

集解

頤曰く、鼈は南方に生ずる、江湖(二)中に産する大なるものは周圍一二丈

ある。南方人はこれを捕つて食ふ。肉には五色あるが、白いものが多い。その卵は

圓くして大いさ雞、鴨の卵ほどあり、一回に一二百箇を産む。人間がやはりそれを掘り取つて鹽淹けにして食ふ。煮てもその白が凝らぬものだ。

藏器曰く、性容易に死なぬものだ。その肉を盡く剔り取つてもなほ物を咬まうとする。烏、鳶を張り得る。——即ち口を開いて烏鳶を取る勢がある。

弘景曰く、この物の老いたるを能といふ。變じて魅を爲すものだ。急の場合以外には食はぬ。

時珍曰く、鼈は鼈のやうで大きく、背に臙肭があり、青黄色で頭が大きく頸が黄である。腸は首に接屬してゐる。鼈を以て雌となし、卵生し思抱する。故に「鼈鳴けば鼈應ず」といひ、淮南子に「鼈脂を焼けば以て鼈を致す」といつたのであつて、いづれも氣類の相感である。張鼎は『その脂で鐵を摩すれば明になる』といつた。或は、この物は水に在つて魚を食ふ。人と體を共にし、十二種の動物に肖た肉を具へるもので、裂いて懸けて置くと一夜にして垂長するやうに思はれるものだといふ。

甲 氣味 【甘し、平にして毒なし】

主治

【黃に炙いて酒に浸して用ゐれば、癰癰を治し、蟲を殺し、風を逐ふ。

惡瘡、痔瘻、風頑、疥癩を治する功力は鼈甲と同じ。〔藏器〕

百藥の毒を殺し、筋骨を續く」〔百華〕
「婦人の血熱」〔蘇頌〕

肉 氣味 【甘し、平にして微毒あり】

主治 濕氣、邪氣、諸蟲〔藏〕
【これを食へば補益する】〔陶弘景〕

脂
主
治
「風、及び惡瘡に摩る」(孟詵)

氣味 【苦し、寒にして毒あり】

主治 【喉痺には、生薑、薄荷汁に

少量を溶化して服し、吐を取る』（時珍）

(二) 蟹 (本經中品)

和名	缺
學名	<i>Eriochloa japonica</i> , der Haan.
科名	カラス科

(二) 木村(重)曰ク、
 蛸脚大ニシテ總纈ト
 シタル長毛ヲ特徴ト
 ス。中後ノ候特ニ珍
 味トセラレ高價トナ
 ル、淡水産。
 テインハイ(田蟹)モ
 ウハイ(毛蟹)ノ名ニ
 テ知ラル。

釋名
〔傍解蟹譜〕 郭索 揚雄方言
〔橫行介士蟹譜〕 無腸公子 抱朴子

雄を蜚蠊といひ、雌を蠊帯といふ、(廣雅) 宗頤曰く、この物の來るは秋初で

あつて、蟬のやうに殻を蛻する。蟹なる名稱は必ずその意味を取つたものだらう。

時珍曰く、按ずるに、傳肱の解語に「蟹は水蟲である。故にその文字は蟲に従ふ

のだ。また魚の属でもある。故に古文は魚に従つた。その横行するものなるところから螃蟹はうかくといひ、その行く時の聲から郭索くわくさくといひ、外部が骨なるところから介士けいしといひ、内部が空なるところから無腸むちやうといふ」とある。

集解

別錄に曰く、蟹は伊洛の地澤、諸水中に生ずる。採取に一定の時期はない。



〔蟹〕

弘景曰く、蟹は種類が甚だ多いが、蟾蜍しやうじゆ、擁劍、蟾蜍はうじゆはいづれも皆薬に入れない。海邊にはまた蟾蜍はうじゆといふがある。蟾蜍に似て大きく、蟹に似て小さく、食つてはならぬものだ。蔡謨さいもが初めて江南へ來たとき、蟾蜍を識しらずして啖くつたために、危ふく死なんとしたことがある。

その時、謨は『爾雅を十分に讀んで置かなかつたために、學者の意見に誤られた』と嘆じたといふ。

頌曰く、今は淮海、汴京べんきやう、河北の陂澤中はたけちゆうに多くゐるが、伊洛では反つて得難い。現に一蟹に食品としての佳味とされてゐる。俗間の傳説に、蟹は八月一日に長さ一

二寸ばかりの稻の芒穂を二本取つて束に向つて進み、その首長に年貢として輸送するものだといふ。現に南方で蟹を捕るに、やや早期なれば芒を衝むものがある。

降霜後に人が芒を輸送する時分に始めて食へるものだ。然らざれば尤も猛烈な毒がある。その種類は甚だ多く、六足のものをば蛭——音は蛭(き)——と名け、四足のものをば比と名ける。いづれも大毒があるから食つてはならぬ。その殻が闊くして黄色の味噌といふものの多いものをば蟻と名け、南海中に生ずる。その蟹は最も鋭くして刈り切るやうに物を斷るものだ。これを食へば風氣を行る。扁にして最も大きく、後足の闊いものをば蟾蚌と名け、南方の地では撥掉子と呼ぶ。その後脚が掉のやうだからであつて、一名蚌といふ。潮に随つて殻が退け、一回退けるごとに一回長大になる。その大なるものは升ほどあり、小なるものは盞様ほどだ。兩蟹が手のやうになつてゐるところが他の多くの蟹と異なる點である。力の至つて強いもので、八月頃よく虎と闘ひ、虎がその爲めに負かされる。一方の蟹が大きく、一方の蟹が小さいものをば擁劍、一名架歩と名け、常に大蟹を闘争に用ゐ、小蟹を物を食ふに用ゐる。また執火と名けるは、その蟹の色が赤いからである。その最も小さく

して毛なきものをば蜆蛸と名ける。蜆の音は越(エツ)であつて、吳地方では彭越と訛なまつて呼ぶ。爾雅には『蜆は蜉たぐなり、小なるものは蜆らうなり』とあり、郭璞の註に『卽ち蜆蛸なり』とある。

時珍曰く、蜆は横行する甲蟲である。外剛に、内柔であつて、卦に於ては離に象り、眼が骨で成り、腹は蜎きようの如く、腦は蜆きようの如く、足は蟹この如く、二本の螯わがあり、八本の脆すねがあり、鉗くわ利く、爪尖り、殻は脆もろくして堅く、十二の星點せいてんがあり、雄は臍長せいちやうく、雌は臍圓せいげんく、腹中の黄は月の盈虚えいきよに應ずる。その性甚だ躁さうしいもので、聲を引き沫ふを噴ふいて死に至つて已む。流水に生ずるものは色黄にして腥なまく、止水に生ずるものは色紺こんにして馨かほしい。佛書に、その子を散じて後には直ちに自ら枯死するとある。降霜前には物を食ふので有毒だが、降霜後には將に蟄ひそせんとするときだから美味である。海に入つて芒あきを輸おるなどいふことはやはり謬談みうたんだ。蜆蛸といふは蜆蛸より大きいもので、陂池はうちや田港中に生ずるものだから有毒で、人を吐下せしめる。蜆蛸に似て沙穴中に生じ、人を見ると走るものは沙狗さくといふもので、食はれない。蜆蛸に似て海中に生じ、潮が來ると穴から出てそれを眺めてゐるものは望潮といふも

(三) 善化國、未詳。

ので、食へる。兩螯が極めて小さくして石のやうなものは蚌江はうかうといふもので、食はれない。溪澗の石穴中に生じ、小さくして殻が堅く赤いものは石蟹といふもので、野人はこれを食べふ。又、海中には、紅蟹といふ大きくして紅色なるもの、飛蟹といふ能く飛ぶものがある。(三) 善化國にある百足の蟹といふは海中の蟹であつて、大いさ錢ほどのものだ。腹下にまた榆莢ゆけふのやうな小蟹がある。それは蟹奴といふものだ。蚌の腹にゐるものは蟹奴わいぞといふもので、また寄居蟹と呼ぶ。いづれも食はれない。蟹の腹中に小木鼈子のやうで白い蟲のゐるものは食はれない。甚しく風を發するものだ。

宗禰そうみ曰く、蟹を採取する時期は八九月で、蟹浪の頃にその水を出るところを伺つて拾ふのである。夜になつて火光で照して捕ると、時に黄と白とが殻中に満ちてゐるものがある。

修治

時珍ししん曰く、凡そ蟹は、生で煮ても、鹽で貯藏し、糟で貯藏し、酒で浸し、醬汁で浸してもみな佳味な食品となる。ただ久しく置いたものは沙し易く、燈火に當ても沙し、椒を加へると臙しんくし易いものだが、皂莢、或は蒜、及び韶粉せうふんを用

ぬれば沙し臍すいすることを免れる。白芷を用ぬれば黄が散ぜぬ。葱、及び五味子と共に煮れば變色しない。貯藏した蟹をば蛸蟹しやうがいといふ。蛸の音は湯（セキ）である。

蟹 氣味

【鹹し、寒にして小毒あり】弘景（こうけい）曰く、まだ霜に遭はぬうちは甚

だ有毒だ。水蓂（すいこん）を食ふからかやうに有毒となるのであつて、人がそれに中毒した場合に、治療を加へねば多くは死亡するといふことだ。獨螯（どくぢやう）のもの、獨目のもの、兩目の向ひ合ふもの、六足、四足のもの、腹に毛のあるもの、腹中に骨のあるもの、頭背に星點のあるもの、足が斑で目の赤いもの、いづれも食つてはならぬ。有毒で人を害するものだ。冬瓜汁、紫蘇汁、蒜汁（さんじゆ）、豉汁（しじゆ）、蘆根汁（ろこんじゆ）はいづれもその毒を解す。

鼎（てい）曰く、娠婦がこれを食へば横に歩む子が生れる。

宗奭（そうせき）曰く、この物は極めて風を動ずるものだ。風疾の人は食つてはならぬ。屢（る）その事實に遭遇して居る。

時珍（しちん）曰く、柿、及び荊芥（けいがい）と食合せてはならぬ。霍亂を發し、風を動ずるものだ。木香汁で解し得る。詳細は柿の條を見よ。

主治

【胸中の邪氣、熱結痛、喝僻（くわへき）、面腫。能く漆を敗る。これを焼けば鼠を

招く【本經】 弘景曰く、仙方では、これを用ゐて漆を化して水にし、長生の術とし

てこれを服する。黒犬血を三日間灌いでこれを焼けば諸鼠が畢く集つて来る。頤曰

く、その黄は能く漆を化して水にする。故に漆瘡にこれを塗る。その螫を爛に焼け

ば鼠が庭に集つて来る。【結を解し、血を散じ、漆瘡を癒し、筋を養ひ、氣を益す】

【別錄】 諸熱を散じ、胃氣を治し、經脈を理し、食物を消化する。醋で食へば肌節

を利し、五臓中の煩悶の氣を去り、人に益あり【孟詵】 産後に肚痛して血の下らぬ

には、酒でこれを食ふ。筋骨折傷には、生で搗いて炒つて罯ふ【日華】 能く斷絶し

た筋骨を續ぐ。殼を去つて黄と共に搗き爛し、微し炒つて瘡中に納入すれば筋が連

る【藏器】 小兒の解顛の合はぬには、螫と白及末とを搗いて塗る。合するを度とす

る【宗奭】 菴藟の毒を殺し、鯉魚の毒、漆の毒を解し、瘡、及び黃疸を治す。搗い

て膏にして疥瘡、癬瘡に塗る。搗いて汁を耳聾に滴す【時珍】

蟾蜍

氣味

【鹹し、寒にして毒なし】

主治

【熱氣を解し、小兒の瘡氣を治す。煮て食ふ】【日華】

蟌蟊

氣味

【鹹し、冷にして毒あり】

【母】木村(重)曰く、蟾蜍ハ學名 Echinochelys、科名グラブスス科。蟌蟊ト同種ヲ云フコトアリ、詳悉

ハ後放チ俟ツ。

〔木村(重)曰ク、

蟬蟻ハ學名 *Formica*
sericea (Fr.) Gr.

ブスス科。田蟹ト類
似ナルモヤヤ體高

ク、南支ノ湖、沼ニ多
シ、一般ニバンキ

(蟻蟻)ト稱サル。
(木村(重)曰ク、

石蟹ハ學名 *Platanus*
lanceolata (L.) Gr.

ブスス科。本邦本土
ニ分布サル陸蟹ナ

リ、一般ニチイハイ
(石蟹)ト稱サル。

前ノ學名ハ揚子江邊
ノモノナレドモ、廣

東省ニハ別ニ一屬ア
リ。

主治

【膏を取つて濕癬、疽瘡に塗る】(藏器)

石蟹

主治

【搗いて久しき疽瘡に傅ければ瘡えぬものなし】(藏器)

發明

慎微曰く、蟹は蛇、蟬の穴以外には寄らないものだ。故に蟬を食つて

中毒した場合には蟹を食へば直ちに解す。性の相畏の關係だ。沈括の筆談に「關中
には蟹がゐない。土地のものがその形狀を怪んで、乾いたものを取つて門の上に懸

けて置いたところ、それで瘡を辟けたといふ。識らな

いのは人間ばかりでなく、鬼まで識らなかつたものと

見える」とある。

蛭

時珍曰く、諸種の蟹は性みな冷であつて、やはり甚

しい毒はなく、蛭にしたものが最も良い。新鮮な蟹を

薑醋で和して、醇酒を酌み交す時の肴にし、黄を咀み

整を持つて食ふは風味なかなか面白いものだ。何處に



蚌

毒があらう。無暗に貪り嗜む者は、一時に十幾箇も食ひ、その上に葷鹽の物を雜食
し、知らず識らず平常に倍加する飲食物を攝るといふことを敢てする。それでは

腸、胃が傷み、腹痛し、吐利することも當然といはねばならぬ。それを蟹が悪かつたといふのであるが、蟹に何の咎とががあらうか。洪邁の夷堅志に『襄陽で、ある盜賊が生漆を被かぶり、兩の眼に塗まぶしたために漆瘡が蔓延し、全然物を見ることが出来なくなつた。ところがその村のある老人が石蟹を搜さがし採らせ、それを搗き碎いて濾した汁を點けさすと、その汁に随つて漆が外へ流れ出し、瘡は癒え、それを用ゐただけで果して舊の通りに明になつた。漆が蟹を畏れるは何の關係に因るものか判らない』とある。

附方

新三。

【濕熱黃疸】蟹を焼いて性を存して研末し、酒糊で梧桐子大ほどの

の丸にし、一日二回、五十丸づつを白湯で服す。（集簡方）

【骨節離脫】生蟹を搗き爛

らし、熱酒を傾け入れて數椀を連飲し、その渣さを塗る。半日以内に骨の内部に谷と聲があつて好結果を得る。乾蟹の焼灰を酒で服するも好し。（唐璣經驗方）【鱖魚の中毒】蟹を食へば解す。（董炳驗方）

蟹爪

主治

【胞を破り、胎を墮す】（別錄）

【宿血を破り、産後の血閉を止め

る。酒、及び醋湯で煎じて服するが良し】（日華）【能く胎を安んず】（壘）

頤曰く、胡

治の方に、孕婦が僵仆れたために胎が上に心を搶くを治するに蟹爪湯といふがある。

【生胎を墮し、死胎を下し、邪魅を辟ける】(時珍)

附方

新三

【千金神造湯】胎兒の死亡したもの、并に雙胎の一兒が死し一兒

の生けるを治す。これを服すれば死せるものを出し、生けるものを安全にする神驗の方である。蟹爪一升、甘草二尺、東流水一斗を葦薪で二升までに煮て滓を濾し去り、眞阿膠三兩を入れ、炸かして頓服する。或は二回に分服する。もし衰弱甚しくして服し得ぬ場合には、灌ぎ込めば活きる。【下胎蟹爪散】妊婦にある病を治せんがために胎を去らんとするに用ゐる。蟹爪二合、桂心、瞿麥各一兩、牛膝二兩を末にし、空心に一錢を溫酒で服す。(千金)

穀

主治

【焼いて性を存して蜜で調へ、凍瘡、及び蜂蠅傷に塗る。酒で服す

れば、婦人の兒枕痛、及び血崩腹痛を治し、積を消す】(時珍)

附方

新三

【崩中腹痛】毛蟹殻を焼いて性を存し、一錢を米飲で服す。(證

治要訣)

【蜂蠅の整傷】蟹殻を焼いて性を存して研末し、蜜で調へて塗る。(同上)【熏

じて壁虱を辟ける】蟹殻を烟に焼いて熏する。(綱玄)

鹽蜃汁 主治

【喉風腫痛には、口一パイに含んで少しづつ嘸めば消く】(時珍)

(一) 木村(重)曰ク、胸甲ハ半圓形ニシテ脚ハ甲ノ下面ニアリ、棘尾短ク、コレニ小針アリ、大ナルモノハ甲徑一尺ニ達ス。湖南省方面ノ潮ニ多シ、日本ニハコレニ類スルモノ一種アリ、小兒ノ玩弄物ニ過ギズ。ゴニユ一(蜃思)ト稱ス。

(二) 武文冠トハ戰國遺ノ素文王所制ノ武冠ナイフ。黄金璫ヲ加ヘ、蟬ヲ附シテ飾トナシ、挿ムニ貂尾ヲ以テストイフ。故ニ貂蟬、貂蟬トモ稱ス。

(三) 蜃ハ蜃盤、今ノ餅ヲ烙ク者ノ如キモノ、俗名フライパン。(四) 尺ハ寸ノ誤。

蜃 魚

音は后(コ) (宋嘉祐)

和名 しなかつがに
學名 *Limus longipinnis*, v. d. H. ewn.
科名 劍尾類

釋名

時珍曰く、按ずるに、羅願の爾雅翼に『蜃は候である。蜃は善く風を候ふものだから蜃といつたのだ』とある。

集解

藏器曰く、蜃は南海に生ずる。大なるものも小なるものも皆牝牡相隨つてゐるもので、牝には目が無いので牡に隨つてゐて始めて行動するものだ。牡があなくなれば牝が死ぬ。

時珍曰く、蜃の形狀は(一)惠文冠のやうでもあり、また(二)鬚斗の形のやうでもあり、廣さ一尺餘、その甲は蜃かに滑かで青黒色だ。背は(三)蜃のやう、眼は骨で、眼は背上に在り、口は腹下に在り、頭は蜃蟬の如く、十二本の足が蜃のやうに腹の兩旁に在り、長さは五六(四)尺、尾の長さ一二尺で、三稜があつて機莖のやうだ。背上に角のやうな高さ七八寸の骨があつて、石珊瑚の状態のやうだ。海を渡る場合にはいつも

相手を負ひ、背を現はし、風に乗じて游いでゐる。それを俗に蜚蜋こつはんと呼び、また蜚こつ蟬はんともいふ。その血は碧色で、腹に黍粟米のやうな子がある。その子は醃醬けいじやうになるものだ。尾に栗ほどの珠がある。その行動には雌が常に雄を負ふてゐるもので、



〔蜚〕

く行てふ負を雌が雄てしに足二十

その雌を失ふと雄が行動し得なくなる。漁夫は必ずその蜚對さうたいになつたものを捕るもので、雄は小さく雌は大きい。これを水中に置くと雄は浮び雌は沈む。故に閩地方では婚禮に用ゐる。この物は沙上に藏かくれ伏すものだが、やはり自ら飛躍ひやくする。皮殻ひかくは甚だ堅く、冠にもなり、また

屈すれば杓にもなる。香中に入れると能く香氣を發する。尾は小さい如意にょいにもなる。脂を焼けば鼠が集つて来る。その性蚊を畏れるもので、螫さされると即死する。また隙漏すうもる光を畏れ、漏る光で射られるとやはり死ぬものだが、しかし日中に暴はらされたのでは往往にして無事である。南方人はその肉で鮓醬さくしやうを作る。小なるをば蜚蜋きこうと名ける。食へば人體に害あるものだ。

肉 氣味

【辛く鹹し、平にして微毒あり】

藏器曰く、毒なし。詵曰く、多

食すれば、嗽、及び瘡癰を發する。

主治

【痔を治し、蟲を殺す】（詵詵）

尾 主治

【燒き焦して用ゐれば、腸風瀉血、崩中帶下、及び産後の痢を治

す】（日華）

發明

藏器曰く、骨、及び尾を灰に燒いて米飲で服すれば、大いに産後の痢

に主效がある。但し必ず先づ生地黃の蜜煎等を服し訖つて然る後にこれを服するのである。これで斷たぬものはない。

膽 主治

【大風癩疾に蟲を殺す】（時珍）

附方

新二。【鼈膽散】大風癩疾を治す。鼈魚膽、生白礬、生綠礬、膩粉、

水銀、麝香各半兩を星の見えぬまで研り、一錢づつを井華水で服す。五色の涎を取下して妙である。（地濟總錄）

穀 主治

【積年の咳嗽】（時珍）

附方

新一。【積年の咳嗽】呀呷して聲を作すには、鼈魚殼半兩、貝母を煨い

て一兩、桔梗ききやう一分、牙皂一分を皮を去つて酥そで炙き、末にして煉蜜で彈子大の丸にし、一丸づつを含んで汁を嚥む。三丸まで服すれば惡涎を吐出して瘡える。(聖惠)

本草綱目介部第四十五卷 終

本草綱目介部

第四十六卷

本草綱目介部目錄第四十六卷

介の二 蚌蛤類二十九種

牡蠣 本經

蚌 嘉祐

馬刀 本經

蜆 嘉祐

蜆 嘉祐

眞珠 開寶

石決明 別錄

海蛤 本經

文蛤 本經

蛤蜊 嘉祐 卽ち蛤粉。

蜾 嘉祐

擔羅 拾遺

車螯 嘉祐

魁蛤 別錄 卽ち瓦蟹子。

車渠 海藥

貝子 本經

紫貝 唐本

珂 唐本

石蠃 綱目 卽ち鼈脚。

淡菜 嘉祐

海蠃 拾遺 卽ち甲香。

甲煎 拾遺

田蠃 別錄

蝸蠃 別錄

蓼蠃 拾遺

寄居蟲 拾遺

海月 拾遺 海鏡を附す。

海燕 綱目

郎君子 海藥

右附方 舊二十二 新九十六

介の二

蛤蚌類二十九種

(一) 牡蠣 (本經上品)

和名 かき
學名 *Ostrea edulis*, Thunb.
科名 かき(牡蠣)科

(一) 本村(重)曰ク、南滿洲及北支那ニ産シ可成大トナル、日本ト同種ノモノ及びけがきモアリ。一般ニトウリ(針鰯)ト稱ス。

釋名

牡蛤(別錄) 蠣蛤(本經) 古贛(異物志) 蠔


弘景曰く、道家の方で

は、左顧のものを雄とするので、牡蠣ひんれいと名け、右顧のものをば牝蠣ひんれいとする。或は、

尖頭いづのものが左顧だともいふが、孰いづれが是なりや詳でない。

藏器曰く、天の生ずる萬物にはみな牝、牡がある。

ただ蠣ひんれいは鹹水かんすいが結成したもので、塊然として動かないものだ。陰陽の性を如何なる方法に依つて現してゐるか疑問だが、經に牡といつたのは雄を意味したものだ



[蠣 牡]

と思ふ。

宗奭[○]曰く、本經には左顧とは言つてない。ただ陶氏の説から出たのである。しかし段成式はまた『牡蠣の牡は雄の意味ではない。牡丹はあるが牡丹はないではないか、それと同様だ。この物は目のないものだ。また顧盼^{ニベン}するわけもあるまい』といつてある。

時珍[○]曰く、蛤蚌^{かふやう}の属はいづれも胎生、卵生であるが、獨りこの物だけが化生であつて、純^{もつ}ら雄のみで雌がない。故に牡なる名稱が生じたのだ。蠣といひ、蠔^{がう}といふは、その物の粗大なることを言ひ表したものである。

集解

別錄に曰く、牡蠣は東海の池澤に生ずる。採取に一定の時期はない。

(二) 東海トハ山東江蘇附近ノ沿海チイフ。永嘉ハ草部芳草類馬蘭ノ註、晉安ハ全部金ノ註チ見ヨ。

弘景[○]曰く、今は三東海、永嘉、晉安に産する。これは百歲の鵬^{てう}が變化したものだといふことだ。十一月に採取し、大なるものを好しとする。その生じてゐる状態は、石に附著していづれも口を上方に舉げ、腹を南に向けてゐるものだ。それを注意して見ると口が斜に東に向つてゐるものを左顧^{さこ}といふのである。廣州、南海に産するものも同じだが、ただ多くは右顧だから用ゐるに堪へない。丹方、及び鹽を煮るにはいづれもこれで釜^かを泥^ぬる。水火に耐へて破れ漏らぬものだといふ。いづれもその

（三）通州、泰州ハ石
部、石類、食鹽ノ註ヲ
見ヨ。南海ハ福建、
廣東、南ノ海洋チイ
フ。閩中ハ金部鐵ノ
註參照。

甲口を除き、ただ臄臄^{ほうほう}として粉のやうなもののみを取つて用ゐる。

頤曰く、現に海岸にはいづれにもゐるが、（三）通州、泰州、及び南海、閩中^{びんちゅう}に就中多い。いづれも石に附著して生じ、硃礪^{しゅら}として相連る。その房のやうになつてゐるものを蠣房と呼び、晉安地方では蠔^{かう}葐^{ぽう}と呼ぶ。初生にはただ拳石ほどのものだが、漸次に四面に擴大して一二丈にも達し、嶺巖^{りやうがん}として山のやうに見える。俗にそれを蠔山と呼ぶ。一房毎に内部に一塊の肉があり、大房は馬蹄^{ばてい}ほど、小房は人の指の腹ほどのもので、潮の來る毎に諸房がみな開き、小蟲がその中に入ると合せ取つて腹に充てる。海人^{あま}がこれを取るには、いづれもその房を鑿^ほり取り、烈火^{せき}で逼^{せま}つてその肉を挑^かげ取り、それを食品に當てるのだが、味は好美であつて更に益^{えき}するところがある。海に産する諸族中での最も貴重なものだ。

時珍曰く、南海地方では、その蠣房を土塼に塗り込み、又、殻を灰に焼いて壁に粉^{こな}り、その肉を蠣黄と呼んで食ふ。

保昇曰く、又、蜆^{うんれい}蠣^{かい}といふ形の短いものもあるが、薬用には入れない。
穀曰く、石牡蠣^{いそかき}といふ頭邊にみな大小ともに沙石^{はさ}を夾^{はさ}むものがあつて、眞に牡蠣

に似たものだが、ただそれは龜殻のやうに圓いものだ。海牡蠣といふは用ゐるものだが、ただ男子がこれを服すると髭がなくなる。眞の牡蠣は火で煨いて用ゐる。それを試験するに、璧へいを用ゐてかざして見ると、手に隨つて走起するものが眞物だ。璧とは千年の琥珀をいふ。

修治

宗奭そうしやく曰く、凡そこれを用ゐるには、泥で固濟こせいして焼き、粉にして用ゐることになつてゐるが、また生で用ゐることもある。

敷ふ曰く、凡て眞の牡蠣を用ゐる。先づ二十箇を用ゐ、東流水に鹽一兩を入れたもので一伏時煮て、再び火中に入れて赤く煨き、粉に研つて用ゐる。

時珍ときちん曰く、按ずるに、陶隱居は『牡蠣は、童尿を五日に一回づつ換へて四十九日間浸して取出し、硫黄末いわうまうを米醋で和したもので上を塗り、黄泥で固濟して煨いてから用ゐる』といつてある。

氣味

【鹹し、平なり、微寒にして毒なし】之才し曰く、貝母はいもが使となる。甘草、牛膝ごうしつ、遠志えんじ、蛇牀子じやじやうしと配合するが良し。麻黄、辛夷、吳茱萸ごしゆゆを惡む。礞砂もんさを伏す。

主治

【傷寒寒熱、溫瘧をんまで洒洒ささたるもの、驚悲怒氣きやうひどく。拘緩、鼠瘻、婦人の帶下赤白を除く。久しく服すれば、骨節を強くし、邪鬼を殺し、天年を延べる】〔本經〕

【留熱の關節、營衛に在るもの、虛熱の去來不定なるもの、煩滿、心痛、氣結を除き、汗を止め、渴を止め、老血を除き、洩精を療じ、大、小腸を澀し、大、小便を止め、喉痺、欬嗽、心、脇下の痞熱を治す】〔別錄〕【身に粉こなれば大人、小兒の盜汗を止める。麻黃根、蛇牀子、乾薑と共に粉にして用ゐれば陰汗を去る】〔藏器〕【婦人の崩中を治し、痛を止め、風熱、風瘧ふうま、鬼交精出を除く】〔孟詵〕【男子の虛勞に腎を補し、神を安じ、煩熱、小兒の驚癇きやうかんを去る】〔李珣〕【脇下の堅滿、癰癰ようよう、一切の瘡を去る】〔好古〕【痰を化し、堅を変かへにし、熱を清し、濕を除き、心、脾の氣痛、痢下、赤白濁を止め、疝瘕積塊、癭疾結核あうしつけつかくを消す】〔時珍〕

發明

權曰く、病の虛して熱多きには、地黃、小草と共にこれを用ゐるがよし。

好古曰く、牡蠣は足の少陰に入り、堅を変にするの劑である。柴胡さいこを以て引けば能く脇下の硬を去り、茶を以て引けば能く項上の結核を消し、大黃を以て引けば能

く股間こかんの腫を消し、地黄を以て使とすれば能く精を益して收澀し、小便を止める。腎の經の血分の藥である。

成無己せいち曰く、牡蠣の鹹は以て胸膈の滿を消し、以て水氣を泄し、痞ひするをば消し、硬きをば契やはらかならしめる。

（附）陽光ハ陽氣ヲ云フ。

元素そん曰く、水を壯にするの主藥であつて、（附）陽光を制するから渴して水を飲まんとする慾求を起さなくなる。故に蛤蠣かきの類は能く渴を止めるのだ。

附方

舊七、新十四。

【心、脾の氣痛】氣が實して痰あるには、牡蠣ざいを煨ちやういて粉にし、二錢を酒で服す。（丹溪心法）

【瘧疾寒熱】牡蠣粉、杜仲とちゆう等分を末にし、蜜で梧

子大の丸にし、五十丸づつを溫水で服す。（普濟方）

【氣虛の盜汗】上記の方を末にし、

方寸匕づつを酒で服す。（千金方）

【虛勞の盜汗】牡蠣粉、麻黃根、黃芪わうぎ等分を末にし、

一日一回、二錢づつを水二盞で七分に煎じて溫服する（本事方）

【産後の盜汗】牡蠣

粉、麥麩あひらを黃に炒つて等分を、一錢づつ猪肉汁ちにくじで調へて服す。（經驗）

【消渴飲水】臘

日、或は端午の日に、牡蠣を黃泥で固濟して赤く煨き、研末して一錢づつを、活き

た鯽魚しやうぎよの煎湯で調へて服す。ただ二三服で癒える。（經驗方）

【百合病が渴に變じたも

の】傷寒から傳變して百合病となり、寒のやうで寒でもなく、熱のやうで熱でもなく、臥したいやうで臥すでもなく、歩行したいやうで歩行する心もなく、食慾があるやうであるでもなく、口が苦く、小便が赤色となり、藥を服めば吐き下し、かくて渴疾に變化して久しく瘥えぬには、牡蠣を熬つて二兩、栝樓根二兩を細末にし、一日三回、方寸匕づつを米飲で調へて服して效を取る。(張仲景金匱玉函方) 【病後常に鼻衄を出すもの】少しく勞すれば作るものである。牡蠣十分、石膏五分を末にし、方寸匕を酒で服す。また蜜で丸にして一日三回服するもよし。(肘後方) 【小便淋瀝】血藥を服しても奏效せぬには、牡蠣粉、黃蘗を炒つて等分を末にし、一錢づつを小茴香湯で服して效を取る。(醫學集成) 【小便の數多きもの】牡蠣五兩を灰に燒き、小便三升を二升到煎じたもので三回に分服する。神效がある。(乾坤生意) 【夢遺、便澀】牡蠣粉を醋糊で梧子大の丸にし、一日二回、三十丸づつを米飲で服す。(丹溪方) 【水病囊腫】牡蠣を煨いて粉にして二兩、乾薑を炮いて一兩を研末して冷水で調へ、糊にして上に掃き、須臾にして囊が火の如くに熱するるとき再び掃く。小便が利して癒える。一方では、葱汁、白麴を用ゐて共に調へる。小兒には乾薑を用ゐない。(初廣世

（五）古貴ハ牡蠣ノ一名。

古今錄驗方】「月水不止」牡蠣を煨いて研り、米醋で搜して團にし、再び煨いて研末し、

米醋で艾葉末を調へて熬つて膏の如くしたもので梧子大の丸にし、四五十九づつを

醋湯で服す。（普濟方）【金瘡出血】牡蠣粉を傅ける（肘後）【破傷濕氣】口禁し、強直

するには、牡蠣粉二錢を酒で服し、同時に外部に傅けて效を取る。（三因方）【發背の

初期】（五）古貴粉灰を雞子白で和して四圍に塗る。頻りに試みて效を取る。（千金方）【癰

腫の未だ成らぬもの】これを用ゐて毒を抜く。水で牡蠣粉末を調へて塗り、乾けば

更に塗る。（姚僧坦集驗方論）【男女の瘰癧】經驗では、牡蠣を煨いて研末して四兩、玄

參末三兩を麪糊で梧子大の丸にし、一日三回、三十丸づつを酒で服す。服し盡せば

根を除く。○初虞世は『瘰癧は、已に破れたると、まだ破れぬとに拘らず、牡蠣四兩、

甘草一兩を末にし、毎食後に臘茶湯で一錢を調へて服す。その效神の如し』といつ

てある。【甲疽潰痛】弩肉が趾甲を裏んで膿血が出て瘡えぬには、牡蠣頭の厚い部分

を生で研つて末にし、一日三回、二錢づつを紅花煎酒で調へて服し、同時にそれを

敷いて效を取る。（勝金方）【顔色の黧黒なるもの】牡蠣粉を研末して蜜で梧子大の丸

にし、一日一回、三十丸づつを白湯で服し、并にその肉を炙いて食ふ。（普濟方）

肉 氣 味 【甘し、溫にして毒なし】

主 治 【煮て食へば、虚損を治し、中を調へ、丹毒、婦人の血氣を解す。薑、

醋で生で食へば、丹毒、酒後の煩熱を治し、渴を止める】〔穢器〕 【炙いて食へば甚だ美味で、肌膚を細にし、顔色を美しくする】〔蘇頌〕

（二）蚌 （宋嘉祐） 和名 どぶかひ

學名 Anodonla woodiana, (Leach)
科名 からすかひ（鳥貝）科

釋 名

時珍曰く、蚌きとは蛤かとは同類だが形を異にするもので、長きをば通じて

蚌といひ、圓きをば通じて蛤といふ。故に蚌の文字は丰ほうに従ひ、蛤の文字は合に従ふのであつて、いづれも形容である。後世それを混じて蛤蚌と稱するは正しくない。

集 解

弘景曰く、雀が大水に入つて蜃と

（一）木村（重）曰ク、蚌ハ支那ノ河、江、湖ニ多キ淡水産ノ二枚貝ナリ。種類多ク復變種モ多シ。殆ンド血狀ノモノ又ハ小刀狀ニナレルモノモアリ。バン（蚌）ト呼ブ。又或地方ニテハ海濱産ノ一種ヲ呼ブコトアリ。



〔蚌〕

なるといふ、蜃とは蚌のことだ。

〔一〕江ハ長江、漢ハ漢水チイフ。

〔二〕洞庭ハ今ノ湖南省ノ洞庭湖、漢河ハ湖北省ノ南部、揚子江、漢水ノ合流點附近一帯チイフ。

藏器曰く、江、漢沿流の大小の河水、池沼中に生ずる。老蚌は珠を含む。殻は粉にする材料にはならぬものだ。大蛤のことはない。

時珍曰く、蚌は種類が甚だ繁多なものだ。現に處處の江、湖中にゐるが、洞庭、漢河に特に多い。大なるは長さ七寸あまりあつて牡蠣などのやうな状態だ。小なるは長さ三四寸で石決明などのやうな状態だ。その肉は食物になり、その殻は粉になる。湖河地方ではいづれも型に入れて錠にしたものを蚌粉と稱し、また蛤粉といつて賣つてゐる。古代にはこれを蜃灰といひ、牆壁の塗飾や堦墻を闔ぐに用ゐたものだ。當今石灰を用ゐるやうなものである。

肉 氣味

【甘く鹹し、冷にして毒なし】宗奭曰く、性微冷なり、多食すれ

ば風を發し、冷氣を動ずる。震亨曰く、馬刀、蚌、蛤、鱗、蜆は大同小異なものだ。寇氏はただ冷といふに止まつて濕をいつてないが、濕は熱を生じ、熱久しければ氣が上升して痰を生じ、風を生ずる。何處が冷であらうぞ。

主 治

【渴を止め、熱を除き、酒毒を解し、眼赤を去る】〔孟詵〕【目を明にし、濕を除き、婦人の勞損下血に主效がある】〔藏器〕【煩を除き、熱毒を解す。血崩、帶

下、痔瘻、丹石の藥毒を壓す。黃連末を入れて汁を取り、赤眼、眼瞼に點ける。(日華)
蚌粉 氣味 【鹹し、寒にして毒なし】 日華曰く、能く石亭脂を制す。鏡源
に曰く、能く硫黃を制す。

主治

【諸疳】 痢、并に嘔逆を止める。醋で調へて癰腫に塗る【日華】 【爛穀
粉は、反胃、心胸の痰飲を治す。米飲を用ゐて服す】 【噎膈】 【熱を解し、濕を燥し、
痰を化し、積を消し、白濁、帶下、痢疾を止め、濕腫、水嗽を除き、目を明にする。
陰瘡、濕瘡、癰痒に擦る】(時珍)

發明

時珍曰く、蚌蛤と海蛤粉とは同功である。いづれも水に産するもので
あつて、病を治する要點はただ熱を清し、濕を行ふに在るのみのものだ。日華はこ
の物の疳を治することを言つたが、近頃、一小兒で疳を病み、ただこの粉のみを食
つて他のものは一向に食はぬものがあつた、やはり特異なものの一例だ。

附方

新六。

【反胃吐食】

眞正の蛤粉を用ゐ、毎服二錢を秤つて生薑の搗汁

一盞で和し、再び米醋を入れて共に調へて送下する。(急救良方) 【痰飲咳嗽】 眞蚌粉
を新瓦で紅く炒つて青黛少量を入れ、淡薑水に麻油數點を滴したもので二錢を調へ

て服す。○類編に「宋の徽宗の時、李防禦が入内醫官であつたが、たまたま帝の寵愛深きある妃が痰嗽を病ひ、徹宵眠れず、顔面が盤のやうに浮腫したので、徽宗は李を召して「誠心誠意事に當り、もし三日以内に治效を奏さねば死罪に行はれて異存なし」との誓をさせて治療を命じた。しかし李の技量では到底治癒の自信がないのだから、その當惑は悲愴なものでつた。涙とともに妻と別れを告げてゐると、不圖、戶外を「欬嗽の藥、一文に一貼、これさへ服めば直ぐ睡れる」といふ流し賣りの聲が通る。李は早速呼び留めてその一貼を開いて見ると、その藥は色が淺碧のものでつた。猛烈な危険性のものではないかともし危懼され、先づ二服を併せて自ら試みに飲んで見たが、しかしその結果は何等の異狀も認めなかつたので、そこで三貼を一服に併せて參入し、それを妃に與へて服ませたところ、嗽はその晩のうちに止まり、曉方には顔面の浮腫も消いて了つた。内侍からその由を早速帝に奏上すると、天顏大いに喜ばれて、値萬緡の金帛を賜つた。ところで李にはその處方の提出を命ぜられることがまだ一の不安だつたので、ひそかに曩に買つた賣藥屋の住居を搜し出し、酒を馳走し、多價の金を提供して傳授を受けた。それが右の方であつ

(2) 建昌軍ハ宋ニ置
キ、元ニ路トシ、明
ニ府トス。今ノ江西
省南城縣ソノ舊治ナ
リ。

(1) 木村(重)曰ク、
馬刀ハ日本産ノまで
がひニ同シ。Solma
breviaナル種アリ。
食用ニ供サル。海産

た。その時賣藥屋は「私は若い頃軍隊にゐたが、隊長がこの方を用ゐるのを見てゐて、それを實は盗んだのだ。今は餘生をこれで送つてゐる」といつた」とある。

【癰疽赤腫】米醋で蚌蛤粉を和して塗り、乾くを待つて易へる。(千金方) 【雀目夜盲】夜になると視力がなくなるには、(2) 建昌軍の螺兒蚌粉三錢を末にして水飛し、雄猪肝一葉を披開してその粉を納れて括りつけ、第二米泔で煮て七分に熟し、別の蚌粉を蘸けて食ひ、その汁で送下する。一日一回試みる。夜明砂と同功である。(直指方) 【脚指の濕爛】蚌蛤粉を乾して搽る。(壽域) 【積聚痰涎】胸膈の間に結して心腹疼痛が晝夜止まず、或は乾嘔し、嚙食するには、炒粉丸が主效がある。蚌粉一兩を巴豆七粒と共に赤く炒り、豆は去つて用ゐず、醋でその粉を和して梧子大の丸にし、二十丸づつを薑酒で服す。男子の臍腹痛には茴香湯で服す。婦人の血氣痛には童尿を和して服す。(孫氏仁存方)

(1) 馬刀 (本經下品)

和名 マタ
學名 Solan Foulhi, Curral.
科名 マタがひ(竹蠟)科

ノ二枚貝、アアタオ
(馬刀)ト稱サル。

校正 拾遺の齊蛤を併せ入る。

釋名

馬蛤(別錄) 齊蛤(吳普) 蛙(爾雅) 音は陞(ヘイ)である。麤 品(ヒン)

脾(ヒ)排(ハイ)の三種の發音がある。記載は周禮にある。螭蟪 音は亭麤(テイヒ)であ

る。單母 音は善母(センボ)である。煇岸 煇の音は掣(セイ)である。時珍曰く、大

なるものを俗に馬の字をつけて呼ぶ。その形が刀のやうだからかく形容して名けた

のだ。蛤といひ、麤といふはいづれも蚌の字の音の轉訛したもので、時代の古今に

因つて方言が異つて來たのだ。説文に『圓なるを螭といひ、長さを麤といふ』とある。

(三)江、漢地方では單姥と呼び、(三)汴地方では煇岸と呼ぶ。吳普の本草に『馬刀、即

ち齊蛤』とあるが、唐、宋の本草にはそれを遺漏し、陳藏器は齊蛤として重出した。

此にはこの一條に併記する。

集解

別錄に曰く、馬刀は江、湖の池澤、及び東海に生ずる。採取に一定

の時期はない。

弘景曰く、李當之は『江、漢に生ずる。長さ六七寸、その肉を食へば蚌に似たも

のだ』といった。今は一般に多くは識らないが、大抵今の螭蟪に似たものだ。しか

(二)江漢ハ揚子江、
漢水。

(三)汴ハ草部芳草類
香薷ノ汴洛ノ註參照。

(四)江湖ハ龜鼈類水
龜ノ註ヲ見ヨ。

し方には用ゐられてない。

韓保昇曰く、江、湖中に生ずる。細く長い小蚌のことで、長さ三四寸、濶さ五六

分のものだ。

馬

頤曰く、今は處處にある。多くは沙泥中に在るもの

で、頭が少し鋭い。一般にはやはり蚌と呼んでゐる。

刀

藏器曰く、齊蛤は海中に生ずる。形状は蛤のやうで

兩頭が小さく尖つたものだ。海人はこれを食べ。別に

功用はない。

時珍曰く、馬刀は蚌に似て小さく、形體は狭くして長い。その類は甚だ多いもので、長短、大小、厚薄、斜正一定せぬが、性、味、功用は概して同一だ。

殼

煉粉を用ゐる。

氣味

【辛し、微寒にして毒あり。水を得れば人の腸を爛

らす。又曰く、水を得れば良し】恭曰く、火を得れば良し。時珍曰く、按ずるに、

吳普は『神農、岐伯、桐君は鹹し、毒ありといひ、扁鵲は小寒にして大毒ありといふ』といった。藏器曰く、遠志、蠟はいづれも齊蛤を畏れる。



〔註〕白井曰ク、肌、
恐クハ誤字。

〔一〕木村(重)曰ク、
蠃蟪ハ日本ニテ(イ)き
のあきト稱スルモノ
ニ似タル二枚貝ニシ
テ、まてニ類シ、殻面
ニ絹糸狀ノ輪紋アリ。
屬ナホシテ後攷
ヲ俟ツ。

〔二〕順安軍ハ蟲部化
生類ノ蠃蟪ノ註ヲ見
ヨ。

主治

〔婦人の漏下赤白、寒熱。石淋せきりんを破り、禽獸を殺し、鼠を賊そごなふ〕〔木經〕
〔能く五臟の間の熱、（五）肌中の鼠鼯そけいを除き、煩滿を止め、中を補し、厭痺けつひを去り、
機關を利す〕〔別錄〕〔水癭すゐたう、氣癭、痰飲を消す〕〔時珍〕

肉 蚌に同じ。

〔一〕蠃

蟪

音ハ咸進(カン
シン)ニある。

〔宋 嘉祐〕

和名 缺
學名 Cutellus sp.
科名 まてがひ(竹蠃)科

釋名

生蠃(嘉祐)

蠃蛤(水土記)

集解

藏器曰く、蠃蟪かんしんハ東海に生ずる。蛤に似て扁く、毛がある。

頤曰く、蛤に似て長く、身が扁い。

宗奭曰く、〔順安軍界じゅんあんぐんかいの河中にやはりこれがある。

馬刀と似寄つたもので、肉は頗る冷だ。その地ではこ
れを鮮さくにして食ふが、遠隔地へ輸送するわけには行か
ぬものだ。



〔蠃 蟪〕

殻 主 治 【焼いて末にして服すれば痔病を治す】〔藏器〕
 肉 宗 蛎 曰く、多く食へば風を發する。

（二） 蜆 （宋嘉祐）

和 名 蜆
 學 名 Corbicula fluminalis.
 科 名 しじみ（蜆）科

（一） 未 村（重）曰く、
 蜆ハ日本産ノしじみ
 ニ似テ而モ殻圓味ナ
 帶ア、他種アレドモ
 一般的ノモノナトレ
 リ。支那ニテハ好ミ
 テ食フ。
 （二） 蜆ハ日氣ナリ、
 太陽ノ光氣チイフ。

釋 名 扁 螺 時 珍 曰く、蜆とは（三）蜆の意味だ。殻の内部に太陽の初めて出た
 ときの光彩のやうな光が輝いてゐるものだ。隋書に「劉臻の父顯は蜆を嗜み、蜆を
 呼んで扁螺へんろといつた」とある。

集 解

藏器曰く、處處にある。小さい蚌のやうで色は黒い。能く天候の風雨
 を見て殻で飛ぶものだ。



〔 蜆 〕

時 珍 曰く、溪、湖中に多くゐる。やはりその類の多い
 もので、大小、厚薄一定しない。漁家では多くこれを食
 ふ。

肉 氣 味

【甘く鹹し、冷にして毒なし】 藏器曰く、微毒あり。多く食へば

嗽、及び冷氣を發し、腎を消す。

主治

【時氣を治し、胃を開き、丹石藥の毒、及び疔瘡を壓し、濕氣を下し、乳を通ず。糟で煮て食ふが良し。生で浸して取つた汁で疔瘡を洗ふ】〔蘇恭〕【暴熱を去り、目を明にし、小便を利し、熱氣、脚氣、濕毒を下し、酒毒日黃を解す。浸した汁を服すれば消渴を治す】〔日華〕【生蜆を浸した水で痘、癰を洗へば癰痕がなくなる】〔時珍〕

爛殼

氣味

【鹹し、溫にして毒なし】

主治

【痢を止める】〔弘景〕【陰瘡を治す】〔蘇恭〕【失精、反胃を療ず】〔日華〕【灰に焼き飲で服すれば、反胃吐食を治し、心胸の痰水を除く】〔藏器〕【痰を化し、嘔を止め、吞酸、心痛、及び暴嗽を治す。灰に焼いて一切の濕瘡に塗る。蚌粉と同功である】〔時珍〕

附方

舊一、新二。【卒嗽の止まぬもの】白蜆殼を搗いて細末にし、一日三回、一錢づつを熟米飲で調へて服す。甚だ效がある。（記載は急救其方にある）【痰喘咳嗽】白蜆殼の多年の陳さものを焼いて性を存し、極細末にし、一日三回、一錢づつを米飲

で調へて服す。(急救方) 【反胃吐食】黄蛎殻わうけんこく、竝に田螺殻を、いづれも久しく泥中にあつたものを取つて等分を炒つて白灰にし、二兩づつに白梅肉四個を入れて搗き和して丸にし、再び砂合子中に入れ、蓋をして泥で固濟し、鞞くわいて性を存して細に研末し、二錢づつを人參縮砂湯にんじんしゆくやとうで調へて服す。然らざれば陳米飲で調へて服するもよし。凡そ心腹脹痛を覺えて將に反胃を發せんとするときは、この藥を以て治す。(百一方)

(一) 眞珠 (宋開寶) 和名 しんじゆ

學名 Pearls

釋名 珍珠(開寶) 蚌珠(南方志) 蠃珠(禹貢)

集解

李珣りしゆん曰く、眞珠は南海に出るは石決明から産する。蜀中、(二)西路、

(一)女瓜にょくわに出るものは蚌蛤はうかくから産するもので、光は白くして甚だ好いが、舶來はくらいのものの采光さいかうの耀やうくには及ばない。穴あなを穿けるには金剛で鑽くわりあけるものだ。

頤い曰く、現に(三)廉州れんしゅうに産し、(五)北海にもある。珠牡しゆめ、または珠母しゆぼといふ蚌はうの類に

(一) 木村(重日)タ、川産ニテハかはしんじゆがひ(南安那ニ産ス) Margarita margaritiformis, L. ヨリ採ルモ光彩可ナラズ、海産ノしんじゆかひヨリ採ルチ多トス、河産海産共ニアリ。
(二) 西路ハ今ノ新疆省ノ地、及ビソノ以門、以南チイフ。
(三) 女瓜、未詳。
(四) 廉州ハ唐ニ置ク今ノ廣東省合浦縣ソ

ノ舊治ナリ。

(七) 北海ハ渤海、黃海ヲ指ス。

(八) 譯者曰ク、綱目原文ニハ「池水乃淡。此不可測也」トアレドモ、嶺表錄異ノ本文ニハ「又。池水至深。莫測也」トアツテ「深さが測らぬ」ノ意ナリ。

(七) 河北ノ滹澤ハ今ノ河北省地方ノ沼池、水流タイフ。

生ずる。按ずるに、嶺表錄異に「廉州のある洲島には島上に大池があつて、その池を珠池といふ。毎年刺史親ら珠を扱ふ營業者を監督し、その池に入れて老蚌を採り、それから珠を剖取^{はうとく}して貢納物とする。その池は海上の島にあるのだから、土地の者は底が海と通じてゐるらしいと考へてゐるが、しかしその池水は淡水であるところを見ると甚だ合點^{がてん}が行かぬ。その地の者はその蚌の小なるものの肉を採つて脯^ほにして食ふが、やはり往往にして米粒ほどの細珠が出ることもある。これはこの池の蚌には大、小さいれも珠があると見える」とある。しかし現に珠牡採取者は、海濱で取るのであつて、必ずしもその池中から取るに限つたことはいふ、北海に産する珠蚌といふは種類が少し別だ。その地の者がその肉を取る場合に或は珠が出ることもあるが、甚だしい光瑩^{くわうえい}でない。やはり何時何れの蚌からも出るといふわけでもなく、薬用にも堪へぬものだ。又、蚌中の一種に江珧^{かうてう}に似たものがあつて、その腹からも珠が出る。しかしいづれも南海のやうに珍奇にして且つ多く出るに及ばない。


宗奭曰く、(七) 河北の滹澤中にも一寸圍りほどのものが出るが、色が多くは微紅^{びこう}で、

(元)合浦縣、今ノ廣東省合浦縣ノ地。


珠母も廉州のものとは類似せぬ。但し清水、急流の場所にあるものはその色が白く光り、濁水、及び流れぬ場所にあるものはその色が暗いのだ。

時珍曰く、按ずるに、廉州志には「合浦縣がっほくけんの海中に梅、青、嬰の三池がある。

蛭あま人が蚌を取るには、長い縄を腰に繋ぎ、籠かごを携へて水中に入り、蚌を拾ひ取ると、籠に入れ腰の縄を振つて舟に合圖をする。すると上から舟人が急にそれを引き揚げるのだ。若し水中から一筋でも血が浮んで來たならば、それは魚腹に葬むられたものとなつてゐる』とある。又、熊太古の冀越集には『禹貢に「淮夷の蜃珠ひんじゆ」とあるが、



〔吐 珠 眞〕



 〔牡 珠 眞〕

後世では嶺南から出る。現に南珠は色
 が紅く、西洋珠は色が白く、北海珠は
 色が微し青く、その地方それぞれの色
 がある。予が嘗て見たところでは、蟹
 人が海中に入つて珠子樹といふものを

り、その樹から蚌を取るのである。甚だ異様なものだ』とある。又、南越志には「珠には九種の品級がある。五分から一寸八九分までのものを大品とし、光彩があつてその一邊が金を鍍したやうなものを瑠珠と名ける。それに次ぐものが走珠、滑珠等の品級だ」とあり、格古論には「南番珠は色白く圓く耀くものを上とし、廣西のものこれに次ぐ。北海珠は色微青なるものを上とし、粉白、油黄なるものは下である。西番では馬價珠を上とし、色は翠の如く青い。老色にして石粉、青油烟を夾むものは下である」とある。蚌は凡て雷を聞けば癡まり瘦せるもので、その珠を孕む状態は妊娠のやうなものだ。故に珠胎といふのである。中秋に月の無かつたときは蚌に胎がない。左思の賦に『蚌蛤の珠胎は月と盈虧す』といつたのはそのことだ。陸佃は『蚌蛤には陰陽、牝牡がなく、雀から蛤に化成する。故に生ずる珠が専ら陰の精なるのだ』といつてある。龍の珠は頷に在り、蛇の珠は口に在り、魚の珠は眼に在り、鮫の珠は皮に在り、鼈の珠は足に在り、蜘蛛の珠は腹にあるが、いづれも蚌の珠に及ばない。

修治

李珣曰く、凡そこれを使用するには、新しく完全にしてまた鑽り綴つ

(五) 本草彙言ニハ口
ヲ目ニ作ル。

たことのないものを粉のやうに研つて始めて服食するに堪へる。細かでないといふ人の臟腑を傷めるものだ。

穀曰く、凡そこれを使用するには、新しいものを絹袋に盛り、平底の鐺たがに牡蠣四兩を入れて四面を物で支へてよく落付やうにした中へ入れ、それに地榆ちよ、五花皮、五方草を各、剉うんで四兩を詰め、漿水を入れて火を住めずやに三晝夜煮て取出し、甘草湯で淘淨し、臼で細に搗いて二重に篩ひ、更に二萬回研つて始めて服食すべきものだ。

慎微曰く、抱朴子に『眞珠は、徑一寸以上のものを服食すれば人をして長生せしめる。酪漿で漬ければみな化して水銀のやうになり、浮石、蜂巢はうちう、蛇黃じやわう等の物をそれに合せると長さ三四尺まで引き延びる。丸にして服す』とある。

時珍曰く、凡そ藥に入れるには、首飾に用ゐたもの、及び尸氣に觸れたものを用ゐてはならぬ。人乳で三日間浸し、煮て前記のやうに搗き研る。ある法では、絹袋に盛り、豆腐の中へ入れて一炷香の間煮る。かくすれば珠を傷めぬものだといふ。

氣味

【鹹く甘し、寒にして毒なし】

主治

【心を鎮める。目に點すれば膚腎障膜を去る。顔に塗れば潤澤ならし

(一〇)逆臚トハ胸腹手足ノ皮皆腫ルルヲ云フ。

(一一)蕁豆若ハ麻疹。

め、顔色を好くする。手、足に塗れば皮膚の(一〇)逆臚を去る。綿で裏んで耳を塞げば聾を治す【開寶】【聾を磨し、痰を墜す】【蠶蠟】【面黥を除き、洩を止める。知母と合せれば煩熱、消渴を療ず。左纏根と合せれば小兒の(一二)蕁豆瘡の眼に入りたるを治す】【李珣】【小兒の驚熱を除く】【宗奭】【魂魄を安じ、遺精、白濁を止め、痘、疔の毒を解し、難産に主效があり、死胎、胞衣を下す】【時珍】

發明 時珍曰く、眞珠は厥陰、肝の經に入る。故に能く魂を安じ、魄を定め、目を明にし、聾を治す。

附方

舊三、新九。

【魂を安じ、魄を定める】眞珠末豆一粒ほどを、蜜を蜆殻に一箇ほどと和し、一日三回服す。就中小兒に宜し【肘後】【卒忤の言語不能】眞珠末を雞冠血で和して小豆大の丸にし、三四粒を口中に納れる【肘後】【灰塵の眯目】大なる珠で拭へば明になる【格古論】【婦人難産】眞珠末一兩を酒で服すれば立るに娩出する【千金】【胞衣不下】眞珠一兩を研末して苦酒で服す【千金】【腹中で胎兒の死亡せるもの】眞珠末二兩を酒で服すれば立るに出る【外臺】【癰疽の發せぬもの】珠子七箇を末にし、新汲水で調へて服す【儒門事親】【痘瘡、疔毒】方は穀部豌豆の條を

見よ。【肝虚目暗】ぼんやりとして見えぬには、眞珠末一兩、白蜜二合、鯉魚膽二箇を和合し、銅器で一半までに煎じ、新しい綿で漉して瓶に盛り、頻に點けて瘰を取る。(聖惠方) 【青盲で見えぬもの】方は上に同じ。【小兒の中風】手足拘急するには、眞珠末を水飛して一兩、石羔末一錢を用ゐ、一錢づつを水七分で四分に煎じ、一日三回に溫服する。(聖惠方) 【目に生じた頑翳】眞珠一兩、地榆二兩、水二大盥を煮乾し、眞珠を取つて醋に五日間浸し、熱水で醋氣を洩り去り、細末に研つて少量づつを點ける。瘰えるを度とする。

石 決 明 (別錄上品)

和名 あはび
學名 *Haliotis gigantea*, Gmelin.
科名 あはび(石決明)科

(一) 木村(重)曰ク、石決明ハ日本ニ産スルモノト同シ、又小型ナル一種ヲ産ス、北支那ノ海ニ多シ。

釋 名

九孔螺(日華) 殻を千里光と名ける。時珍曰く、決明といひ、千里

光といふはその功力に因る名稱だ。九孔螺といふは形を形容した名稱だ。

集 解

弘景曰く、俗にこれを紫貝のことだといふ。世人はみな水に漬けて眼を熨するが、頗る明になる。又、これは鰻魚の甲で、石に附著して生じ、大なるは手

ほどあり、明かに五色に耀く。内部にはやはり珠を含むものだといふ。

恭曰く、これは鰓魚の甲で、石に附著して生ずる。状態は蛤のやうだが、ただ一片のみのもので對をなさない。七箇の孔のあるものが良し。今俗に紫貝を用ゐてゐるが、全然誤りだ。

頤曰く、今は嶺南の州郡、及び萊州らいしゅうの海邊にいづれもある。採取に一定の時期はない。舊註には、或はこれを紫貝とし、或は鰓魚の甲としてあるが、按ずるに、紫貝とは即ち今の礞螺がらのことで、全然この類のものではない。鰓魚とは王莽わうまうが嗜すきだつたといふそのもので、一邊が石に附著して美しく明に光るものだ。自ら一種をなすもので、決明と相近い。決明の殻は、大なるは手ほどあり、小なるは指二三本の大きいさほどのもので、水に浸して眼を洗ふに用ゐられる。七孔、九孔のものが良く、十孔のものは佳くない。海人はやはりその肉を噉くふ。

宗奭曰く、三登萊の海濱に甚だ多く、その地では肉を採つて料理に使ひ、また乾して贈答品にもする。肉と殻と兩ながら用ゐ得るものだ。

時珍曰く、石決明は形が長く、小蚌せうぱうのやうで扁へんく、外皮は甚だ粗あらく、孔が細かくし

(三)登萊、今ノ山東省登州、萊州地方ナ
イフ。

(三) 酒ハ辭書ニ浮行水上トアリ。

(四) 吳越ハ金部粉錫ノ註ヲ見ヨ。



〔明 洪 石〕

ていらいひらするが、内面は光があり、背側には殊更に穿けたやうな孔が一行に通つてゐる。石崖の上に生ずるものだ。海人は水を酒いでその不意に乗じて取る。かくすれば取り易いが、さうせねば緊く粘著して了つて容易に取れない。陶氏は紫貝をこの物とし、雷氏は眞珠牡をこの物とし、楊僚の荀子の註には龜甲をこの物としたが、いづれも誤りだ。かだ鰻魚とは一種中の二類である。故は功用が同じものだ。

修治

吳越地方では、糟決明、酒蛤蚧を美味な食品としてゐるが、即ちこのものだ。珣曰く、凡そこれを使用するには、麪で裹んで煨熟し、粗皮を磨り去つて搗爛し、再び乳細して麪のやうになつたところで薬に入れ得るものだ。

穀曰く、五兩に對し鹽半兩の割合とし、瓷器に入れて東流水で一伏時煮てから、末に搗いて粉に研り、再び五花皮、地榆、阿膠各十兩を入れて東流水で三回淘り、日光で乾して再び一萬回研つて薬に入れる。十兩まで服したならば永く山龜を食つてはならぬ。犯せば目の視力を喪ふ。

時珍曰く、今の方家は、かだ鹽と東流水とで一伏時煮て研末し、水飛して用ゐる。

殼 氣 味

【鹹し、平にして毒なし】保昇曰く、寒なり。宗奭曰く、肉と殼と同功だ。

主 治

【目障醫痛、青盲。久しく服すれば精を益し、身を軽くする】（別錄）【目を明にし、障を磨す】（日華）【肝、肺風熱の青盲、内障、骨蒸勞極】（李珣）【水飛して外障醫に點ける】（寇宗奭）【五淋を通ずる】（時珍）

附 方

舊一、新四。

【羞明して日光を怕れるもの】千里光、黃菊花、甘草各一

錢を水で煎じて冷服する。（明目集驗方）【痘後の目醫】石決明を火で煨いて研り、谷精

草と各等分を共に細末にし、猪肝に蒸けて食ふ。（鴻飛集）【小便五淋】石決明を粗皮

を去り、末に研つて水飛し、一日二回、二錢づつを熱水で服す。淋中に軟、硬物の

あるときは朽木末五分を加へる。（勝金方）【肝虛の目翳】凡そ氣虛、血虛、肝虛で眼

白が俱に赤く、夜は雞喙のやうに浮翳を生ずるには、海蚌殼を焼いて灰にし、木賊

を焙じて各等分を末にし、三錢づつを薑、棗を水で煎じて渣共に一口に服す。毎日

二回服す。（經驗方）【青盲、雀目】石決明一兩を焼いて性を存し、外に蒼朮三兩を皮

を去つて末にし、その藥末三錢づつを猪肝を披開した中に入れて括りつけ、砂灌で

煮熟し、その蒸氣で目を薰し、冷えるを待つてその肝を食ひ、汁を飲む。(鮑目録)「白酒の酸を解す」石決明を多少に拘らず、その數箇を火で煨いて細末に研り、酒を盪熱して置いて、中にその末を入れて攪きまぜ、一時蓋をして置いて取つて飲む。味が酸くなくなる。

(二) 海 蛤 (本經上品)

和名 かひがら
學名 Shells of Li-vulves.

(一) 木村(重)曰ク、はまぐりノ如キ海産二枚貝ノ殻ノ總稱ト見ルチ至當トス。

釋名

時珍曰く、海蛤とは、海中の諸蛤の爛殻の總稱である。單に一種の蛤のものに限るのではない。舊本に「一名魁蛤」とあるので魁蛤のみを指すかのやうに見えるが、それは書誤りに過ぎないのだ。ここに削除する。

集解

別錄に曰く、海蛤は東海に生ずる。

保昇曰く、現に登萊、三滄州の海沙の波が打ち

寄する處にはいづれもある。四五月に沙を淘つて取る。南海にもある。



〔蛤 海〕

(三) 滄州ハ草部毒草類甘遂ノ註、登萊ハ石決明ノ註ヲ見ヨ。

恭○曰く、海蛤は、巨勝子のやうに細かで、淨く滑に瑩かに光るものが好し、粗くして杏仁の半分ほどの大いさのものをば狔耳蛤といふ。薬用にならぬものだ。

時○珍曰く、按ずるに、沈存中の筆談に『海蛤とは海邊の沙泥中から取る。大なるは基子ほど、小なるは油麻粒ほどのもので、黄白色、或は黄赤色のものが相雜る。蓋し一類のみではないのであつて、諸蛤の殻が海水のために磨りへらされ、久しい間に瑩かに光るやうになり、全然舊質がなくなつたものだ。蛤は類の至つて多いものだから一一いづれの蛤とは區別しかねる。故に通じて海蛤といつたのだ』とある。その他の説明は下條を見よ。

正誤

吳善○曰く、海蛤は頭に文がある。その文は鋸齒のやうだ。

時○珍曰く、これは魁蛤をいふのであつて海蛤ではない。蓋し誤である。此に正して置く。

○弘景曰く、海蛤は至つて滑澤なもので、雁の屎の中から取る。二三十回したものが良いといふことだ。今一般にあるものは、多くは相類するものを取つて磨蕩したものだ。

日華曰く、これは雁の食つた鮮の蛤が糞になつて出るものだ。文彩のあるものは文蛤、文彩のないものが海蛤である。郷人はまた、海邊の爛蛤殻が風濤で磨りへらされて瑩淨になつてものを拾ひ取つて偽物にする。

藏器曰く、二説いづれも非である。海蛤とは、海中の爛殻が久しく沙泥中にあつて風波に洶り洗はれ、自然に圓く淨らになつたものだ。大なるものも小なるものもあるが小なるものを佳しとする。一一雁の腹中から出るものではない。文蛤とはまだ爛れない時の文のある殻のことだ。この海蛤と文蛤との二物はもと同一類であつて、あだかも爛蜆と蚌殻との相異のやうなものだが、主なる功力はやはり生のもつと同じでない。假令雁が蛤殻を食ふにしても、文と文ならぬものを選び別けて食ひさうなことはあるまい。

宗奭曰く、海蛤と文蛤とに就ては陳氏の説が極めて正しい。現に海中に雁はゐない。そこに糞のあるわけがあらうか。蛤に肉のある時ならばまだ食ふといふこともあるが、既に肉のなくなつたものではないか。食ひ得るわけが何處にあらうぞ。更にまた二三十回糞するなどいふことがあらうか。陶氏の説は謬だ。

時珍曰く、海蛤といふは諸蛤の爛殻のことだ。文蛤は獨立した一種類である。陳氏のいふ文蛤はまだ爛れぬ時の殻を指してゐるが、それでは一般諸蛤のまだ爛れぬものを指すやに見えて、その説は穩でない。但し海中の蛤蚌は形色と名稱とに差異はあるが、性味は相類し、功用も同じもので、甚しい區別はない。

修治

穀曰く、凡そ海蛤を使ふ場合に游波蟲の骨を用ゐてはならぬ。眞に似てゐるが、ただこれは表面に光のないものだ。誤つてこれを餌へば狂走して水に投身したが、鬼物の祟のやうになる。ただ醋だけがこれを解し、立ろに癒えるものだ。海蛤は、漿水で一伏時煮て、一兩毎に地骨皮、柏葉各二兩を入れて共に一伏時煮、東流水で三回洵つて粉に搗いて用ゐる。

保昇曰く、これを採取したならば、半天河で五十刻煮て枸杞汁を拌ぜ、葦竹筒中に入れて一伏時蒸し、搗いて用ゐる。

氣味

【苦く鹹し、平にして毒なし】吳普曰く、神農は苦しいひ、岐伯は甘しいひ、扁鵲は鹹しいひ。權曰く、小毒あり。之才曰く、蜀漆が使となる。狗膽、甘遂、芫花を畏る。

主治

【欬逆上氣、喘息煩滿、胸痛寒熱】（本經）【陰痿を療ず】（別錄）【十二種

の水滿急痛に主效があり、膀胱、大、小腸を利す】（唐註）【水氣浮腫を治し、小便を下し、欬逆上氣、項下の癰癭を治す】（甄權）【嘔逆、胸脇脹急、腰痛、五痔、婦人の崩中帶下を療ず】（日華）【消渴を止め、五臟を潤ほし、丹石を服した人の瘡を生じたるを治す】（蕭炳）【熱を清し、濕を利し、痰飲を化し、積聚を消し、血痢、婦人の血の結胸、傷寒で反て汗し、搐搦するもの、中風癱瘓を除く】（時珍）

附方

舊二、新七。

【水瘕腫滿】藏器曰く、海蛤、杏仁、漢防己、棗肉各二兩、

葶藶六兩を末にし、研つて梧子大の丸にし、一回に十丸づつ水を利下するまで服す

るが妙である。【水腫發熱】小便の通ぜぬには、海蛤湯が主效がある。海蛤、木通、

猪苓、澤瀉、滑石、黃葵子、桑白皮各一錢、燈心三分を水で煎じ、一日二回服す。（聖

惠方）【石水肢瘦】腹だけが大きなるには、海蛤丸が主效がある。海蛤を煨いた粉、防

己各七錢半、葶藶、赤茯苓、桑白皮各一兩、陳橘皮、郁李仁各半兩を末にし、蜜で

梧子大ほどの丸にし、一日二回、五十丸づつを米飲で服す。（聖濟總錄）【氣腫、濕腫】

海蛤、海帶、海藻、海螵蛸、海昆布、梔莢、荔枝殼等分を流水で煎じて服す。一日

アリ。

骨ノ下限トノ中間ニ
アリ。

(六) 鹽中ハ經穴名、ミヅオチ、鳩尾ノ稍上ニアリ。

二回（何氏）『血痢内熱』海蛤、石蜜を水で調へ、一日二回、二錢づつを服す。（傳信）

【傷寒血結】胸脹痛近くべからざるものは、仲景には方が無い。海蛤散を主とし、并に至期門穴を刺すがよし。海蛤、滑石、甘草各一兩、芒硝半兩を末にし、二錢づつを雞子清で調へて服し、更に桂枝紅花湯を服す。その汗を發すれば癒える。蓋し（六）膈中に血聚すれば小腸が壅し、小腸が壅すれば血が行らなくなるのである。これを服すれば小腸が通ずるから血が流行して胸膈が利するのだ（朱肱活人書）

【傷寒痞滿】寇宗奭曰く、傷寒で汗を出すことが徹底せずして手脚の搐するものである。海蛤、川烏頭各一兩、川山甲二兩を末にし、酒で彈子大の丸にし、扁たく捏つて患む方の足の心下に置き、別に葱白を擘いてその藥を蓋ふて帛で縛定し、暖室中で脚を膝上まで熱水に浸し、水が冷えれば又熱水を添へ、全身に汗の出るを度とする。凡そ三日に一回試みて反應のあるを度とする。【中風癱瘓】方は上に同じ。又、鰻鯉甲の條に記載がある。【衄血の止まぬもの】蛤粉一兩を七回羅ひ、槐花半兩を炒り焦して研勻し、一錢づつを新汲水で調へて服す。（楊氏家藏方）

(二) 木村(重)曰ク、
文蛤ハ日本ノほぐ
リニ似ル、殻表ニ電
光形ノ美ナル模様ア
リ。他ニ三種ニ産ス。

(二) 文 蛤 (本經上品)

和名 蛸
學名 *Meretrix literata*
科名 はまぐり 蛤科

釋名


花蛤

時珍曰く、いづれも形を以て呼んだ名だ。

集解

別錄に曰く、文蛤は東海に生ずる。表に文がある。採取に一定の時期

はない。



文 蛤

弘景曰く、大、小いづれも紫斑がある。
保昇曰く、今は萊州の海中に出る。三月中旬に採
る。背上に斑文がある。

恭曰く、大なるものは圓くして三寸、小なるものは圓くして五六分のものだ。
時珍曰く、按ずるに、沈存中の筆談に「文蛤とは現に吳地方で食ふ花蛤くわがふのことで、
その形は一方が小さく一方が大きく、殻に花斑のあるものだ」とあるは正にそのも
のだ。

修治

海蛤に同じ。

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

【惡瘡、五痔を蝕す】（本經）

【欬逆、胸痺、腰痛、脇急、鼠癭、大孔出

血、婦人の崩中漏下】（別錄）【能く煩渴を止め、小便を利し、痰を化し、堅を軟にし、

口、鼻中の蝕疳を治す】（時珍）

發明

時珍曰く、按ずるに、成無已は『文蛤の鹹は腎に走つて水氣に勝つ』

といつた。

附方

舊一、新一。

【傷寒文蛤散】張仲景は『病の陽に在るは、汗して解すべ

きものだ。反つて冷水を嚥き、或は灌ぎ、更に煩熱を益し、水を欲し、渴せぬには、

この散を主とする。文蛤五兩を末にし、方寸匕づつを沸湯で服す。甚だ效がある。

【口、鼻の疳蝕】數日にして蝕し盡さんとするには、文蛤を灰に燒き、臘猪脂で和

して塗る。（千金翼）

（一）木村（重）曰ク、
蛤蜊ハ殻頂ヲ中心ニ
輪脈アリ、幅一寸ニ
達スルアリ。支那海

（二） 蛤 蜊

音は梨（リ）
である。

（宋嘉祐）

和名 おきしじみ
學名 *Cyclina sinensis*, Gmelin.
科名 はまぐり（蛤）科

ニ多産シ、食川貝ノ代表ナリ。地方ニヨリテハしほふき、はひかひチ云フ事アリ。ハリー(蛤蜊)ト云フ。

(二) 閩ハ福建地方、浙江地方。

海錯、書經ニ「厥貢海錯、海物惟錯」トアリ。海産物ヲ錯トイフ。海産ノ名物トインガ如キ意味ナリ。

(三) 噂笑作罪、未詳。

釋名

時珍曰く、蛤の類で人體を利するものだからかく名けたのだ。

集解

機曰く、蛤蜊は東南海中に生ずる。白殻、紫唇で大きい二三寸のもの



蛤蜊

肉氣味

【鹹し、冷にして毒なし】藏器曰く、この物の性は冷ではあるが、

丹石を服する人と相反す。これを食へば腹が結痛する。

主治

【五臓を潤ほし、消渴を止め、胃を開き、老癬で寒熱となりたるを治す。

婦人の血塊には煮て食ふがよし】(禹錫) 【煮て食へば酒を醒す】(弘景)

發明

時珍曰く、按ずるに、高武の痘疹正宗に『俗に、蛤蜊海錯は能く疹を

發し、多くは脾、胃を傷損し、痰を生じ、嘔吐し瀉痢するといふが、これはみな噂笑作罪だ。又、痘毒が目に入りたるには、蛤蜊汁を點ける。空青に代へ得るものだといふが、そもそも空青なるものは銅の精氣を得て生ずるもので、性寒であつて赤目を治するに用ゐるものだ。痘毒の場合は臟腑の毒氣上衝である。空青で治し得る

害のものでない。蛤蜊は寒ではあるが、而も濕中に火あるものだからこれも心得て置く必要がある』とある。

(五) 蛤蜊粉

釋名

海蛤粉

時珍曰く、海蛤粉とは海中の諸蛤の粉をいふので

(五) 木村(重)曰ク、
蛤蜊粉ハ二枚貝ノ灰
分即チ「カルシウム」
ヲ謂フナルベシ。
Ash of shells.

あつて、江湖に産する蛤粉、蚌粉はうぶんと區別するための名稱だ。今は一般に、ただ海粉、蛤粉と呼んで區別してゐる。寇氏の所謂、衆蛤の灰とはこの物を指したのだ。近世では單に蛤蜊粉のみを藥に入れることになつてゐるが、しかし商人の所有品はやはり多くは衆蛤のものだ。概して海中の蚌、蛤、蚶、蠣は、性、味が鹹、寒で甚だし相違はない。功能も軟、散で大同小異だ。江湖の蚌蛤は鹹水わづみずに浸漬しんじくされないものだ、これはそれとは異つて、ただ能く熱を清し、濕を利するだけのものである。今の藥種店には綠粉のやうな状態のもので海粉と稱する一種があるが、それは水に遇へば爛れ易い。蓋し後世の者がただその名にかこつけて販賣してゐるだけのものだが、しかし海中の沙石の間に出るものだから、その功力はやはり能く痰を化し、堅を栗つらにする。

修治

震亨曰く、蛤粉は蛤蜊を燒煨せうかいして作る粉だ。煎藥には入れない。

時珍曰く、按ずるに、吳球は『凡そ蛤粉を用ゐるには、紫口の蛤蜊を炭火で煨いて作つたものを取り、熟栝じやくくわつう樓ろうを子を連ねたものと共に搗き和して團にし、風乾して用ゐるが最も妙だ』いつてある。

正誤

穢曰く、丹溪は『蛤粉とは海石のことだ』といつてある。寇氏は海石の事實を以て蛤粉に註してある。して見ると、この二物は通じ用うべきものだ。海石、即ち海粉。蛤粉、即ち蛤蜊殻を焼いて作つたものである。

時珍曰く、海石とは海中の浮石のことだ。石部に詳記してある。汪機は、朱、寇二氏の説なりと誣しひて引證し、陳嘉謨の本草にもまたそれを引據してあるが、現に朱、寇二先輩の著書に就いて調べて見るに、いづれもさやうな説はない。此にその誤を正して置く。

氣味

【鹹し、寒にして毒なし】

主治

【熱痰、濕痰、老痰、頑痰、疝氣、白濁、帶下。香附末と共に薑汁で調へて服すれば心痛に主效がある】震亨【熱を清し、濕を利し、痰食を化し、喘嗽ぜんそうを定め、嘔逆を止め、浮腫を消し、小便を利し、遺精、白濁、心痺疼痛を止め、積塊

を化し、結氣を解し、癭核を消し、腫毒を散じ、婦人の血病を治す。油で調へて湯火傷に塗る】(時珍)

【發明】

震亨曰く、蛤粉は、能く降し、能く消し、能く熨にし、能く燥する。

時珍曰く、寒は火を制して鹹は潤下する。故に能く降すのだ。寒は熱を散じて鹹は血に走る。故に能く消すのだ。堅さをば鹹を用ゐて熨にする。それはその水に屬して性の潤なる點を應用するのだ。濕をば滲を以て燥する、それは火化を経たもので小便を利する點を應用するのだ。

好古曰く、蛤粉なるものは腎の經の血分の藥だから、濕嗽、腎滑の疾に主效があるのだ。

【附方】

舊一、新三。

【氣虛水腫】昔、滁州の酒庫攢司陳通が水腫を患つて瀕死に

陥つたとき、多くの醫師は治療し得なかつたが、一老女が大蒜十箇を泥のやうに搗いた中に蛤粉を入れて梧子大の丸にし、毎食前に二十丸づつを白湯で服させたところ、服し盡すと小便が桶に數箇ほど出て癒えた。(華濟方) 【心氣疼痛】眞蛤粉を炒つて白くし、香附末等分を佐藥とし、白湯に淬して服す。(聖惠方) 【白濁、遺精】潔古

は『陽盛にして陰虛するから精が漏れるのだ。眞珠粉丸が主效がある。蛤粉を煨いて一斤、黃柏わうはくを新瓦で炒つて一斤を細末にし、白水で梧子大の丸にし、一日二回、一百丸づつを空心に溫酒で服す。蛤粉は味が鹹いもので、且つ能く腎陰を補し、黃柏は苦いもので心火を降す。【雀目、夜盲】眞蛤粉を黃に炒つて末にし、化した油蠟で和して皂子大さうしだいの丸にし、猪腰子中に入れて麻で縛り、一日一回、蒸して食ふ。

(儒門事親)

(二) 蛭

丑眞の切(チン)と録音する。

(宋嘉祐)

和名 あげまき
學名 *Notonecta constriata*, Lamark.
科名 さねたますにがひ(磯眞蘇枋貝)科

釋名


集解

藏器〇〇曰く、蛭は海泥中に生ずる。長さ二三寸、太さ指ほど、兩頭の開いたものだ。

時珍〇〇曰く、蛭は海中の小蚌である。その形は長短、大小一定せず、江、湖中の馬刀、蟻かん、蜆けんと似たもので、その種類が甚だ多い。(三) 閩粵地方では田にこれを種かひ、

(三) 閩、粵ハ福建、廣東、廣西地方ヲイフ。

(一) 木村(重)曰ク、蛭ハまでニ似タル海産ノ二枚貝ニシテ、軟泥地ニ埋沒シテ生息ス、九州地方ニ多シ。



〔鰻〕

潮泥の打ち上げて来て沃ぐのを候ち、それを鰻田といふ。その肉をば鰻腸と呼ぶ。

肉 氣味 【甘し、温にして毒なし】 詵曰く、

天行病後に食つてはならぬ。

主治 【虚を補し、冷痢を治するには、煮て食ふ。

胸中邪熱の煩悶を去るには食後に食ふ。丹石を服した人に與へるに宜し、婦人産後の虚損を治す】〔嘉祐〕

擔羅（拾遺）

和名不詳
學名不詳
科名不詳

集解

藏器曰く、蛤の類であつて、新羅國に生ずる。彼の地では食ふ。

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【熱氣、食物を消化する、昆布に

雜へて羹にすれば結氣を治す】〔藏器〕

(一) 木村(重)曰ク、車螯ハあげまきニ似テ更ニ黒色ヲ帯ビ、殻又硬シ。
宮波附近ニテハツア
ーゴ(車螯)ト稱ス

車螯 (宋嘉祐)

和名 缺
學名 Isunosen sp.
科名 きぬたまがひ科

釋名

蜃 音は腎(シン)である。時珍曰く、車螯は俗に訛つて昌娥蜃といふ。蛟蜃の蜃と同名ではあるが物は異ふ。周禮に『鼈人は互物を掌り、春は鼈蜃を獻じ、秋は龜魚を獻ず』とあるところを見ると、蜃とは大なる蛤の通稱であつて、やはり單に車螯のみを指した名稱ではなかつたらしい。

集解

藏器曰く、車螯は海中に生ずる。大蛤のこと、即ち蜃のことである。能く氣を吐いて樓臺を現すものだ。春、夏島瀛を圍繞して常にこの氣がある。



【螯車】

頌曰く、南海、北海いづれにもあつて、採取に一定の時期はない。その肉を食つて見ると、蛤蜊のやうだが堅硬で味が劣る。近世では癰疽に多くこの殻を用ゐるが、北方の海のものを用ゐるに堪へない。背の紫色なるものを海人はやはり紫貝と呼んでゐるが、それは誤だ。

(二) 鐘鮪人名、疏ハ鮪ノ誤、何處之門生也、世視ニ出ツ。

(三) 羅江ハ唐ニ縣ヲ置ク、即チ今ノ四川省ノ羅江縣ナリ。

時珍曰く、殻は色が紫で玉のやうに鮮かな光があり、花のやうな斑点がある。海人は火で炙つて殻の開いたとき肉を取つて食ふ。(二) 鍾鮪は『車螯、蟹、蟬、蝸は、眉目内に缺け、蟾殼外に絨づ。香なく臭なし、瓦礫と何ぞ殊らん。宜しく庖厨に充て、永く口食と爲すべし』とあり、羅願は『雀は淮に入つて蛤となり、雉は海に入つて蜃となる。蜃とは大蜃のことだ。肉は食物になり、殻は器物の飾になり、灰は墻壁を固り寒く材料となり、粉にして顔の化粧品にもなる。俗に蛤粉と呼ぶ。また或は珠を生ずることもあつて、用途の多いものだ』といひ、又、臨海水土記には『車螯に似て角の正しからぬものをば移角といふ。車螯に似て殻の薄いものをば姑勞といふ。車螯に似て小なるものをば羊蹄といひ、羅江に出る』とある。古代には一般に雉の化したものをば蛟蜃の蜃だと考へてゐたのである。而るに陳氏、羅氏はそれを蛤蜃の蜃としたが、それは誤りらしい。鱗部蛟龍の條に詳述してある。

肉

氣味

【甘く鹹し、冷にして毒なし】説曰く、多食してはならぬ。

主治

【酒毒、消渴、竝に癰腫を解す】(鹹器)

殼

氣味

肉に同じ。

主治

【瘡癰、腫毒には、二回赤く焼き醋に淬して

末にし、甘草と等分を酒で服す。并に醋で調へて傳ける〔日華〕「積塊を消し、酒毒を解し、癰疽發背の煖痛を治す」〔時珍〕

發明

時珍曰く、車螯は、味は鹹く、氣は寒であつて降る、陰中の陰であつて、血分に入る。故に宋時代には、これを癰疽の治療に用ゐて惡物を取り下し、奇功があるといつたものだが、やはり患者の氣血、虛實、老少の如何を密にした上で用ゐべきものである。今の外科にはこれを用ゐることを知る者が尠い。

附方

新二。

〔車螯轉毒散〕

發背癰疽を治し、發病後年月の淺深と大人、小兒

（同）一盞ハ二盞ノ誤カ。

とを問はず、病根を利し去るので傳變を免れる。車螯、即ち昌娥の背が紫色で光があつて厚いものを、鹽で固濟して赤く煨き、火毒を出して一兩、甘草末一錢半、輕粉五分を末にし、每腹四錢を、栝樓一箇、酒一盞を一盞に煎じて調へて服す。五更に惡物を轉下するを度とし、なほ下らぬときは再服する。甚しきものも二服以上を必要とせしめ。〔外科精要〕

〔六味車螯散〕治症は上に同じ。車螯四個を黃泥で固濟して赤く煨き、毒を出して研末し、燈心三十莖、栝樓一箇の仁を取つて香しく炒り、甘草節を炒つて二錢、これを一服とし、三味を酒二盃に入れて半盃に煎じ、滓を去つ

て蜂蜜一匙を入れ、それで車螯末二錢、膩粉少量を調へて空心に溫服する。惡涎毒を下すを度とする。(本事)

魁蛤 (別錄上品)

和名 はいかひ
學名 Anadara granosa, Linne.
科名 ふれがひ(鬼蛤)科

校正

時珍曰く、宋嘉祐には別に蚶の條を掲げてあるが、此には郭璞の説に據つて一條に合併した。

(一) 木村(重)曰ク、
魁蛤、支那本土ノ海岸ニ分布ス。殻ニハ隆起放射線アリテ淡水ノ多少注入スル所ヲ好ミテ棲ム、淡水中ニ産スルモノナ特ニモウハ一(毛蛤)ト稱ス。

釋名

魁陸 別錄 蚶 一には蚶と書いてある。瓦屋子(嶺表錄) 瓦墜子 時

珍曰く、魁とは羹斗(かひじやくし)のことだ。この蛤は形がそれに肖てゐるからかく名けたのである。蚶とは味が甘いから、文字は甘に従ふのだ。按ずるに、嶺表錄異に『南方の地では空慈子と名ける。尙書の盧鈞は、その殻が瓦屋の壘のやうなところから瓦屋、瓦壘と改稱した。廣地方ではその肉を珍重し、炙いて酒の肴にして天鰲と呼んでゐる』とある。廣地方ではこれを蜜丁と謂ふ。名醫別錄に『一名活東』とあるは誤だ。活東とは蚶斗のことで、爾雅に記載されてある。伏老 頤曰く、

(二) 嶺表錄異ニハ『南中舊呼爲蚶子』トアリ。

説文に『老伏翼は化して魁蛤となる』とある。それで伏老と名けたのだ。

集解

別錄に曰く、魁蛤は東海に生ずる。正圓で、兩頭が空で表に文がある。

採取に一定の時期はない。

弘景曰く、形は紡に似たもので、軽く小さく、狭く長く、外に縦横の文理がある。



〔蛤 魁〕
一子壁瓦 蚶一

これは老蝠が變化したものだといふ。方に用ゐることは至つて稀だ。

保昇曰く、今は萊州に出る。形は圓く長く、大腹、

横櫛に似て兩頭に孔がある。

藏器曰く、蚶は海中に生ずる。殻が瓦屋のやうだ。

時珍曰く、按ずるに、郭璞の爾雅註には『魁陸、即ち今の蚶であつて、状態は小蛤のやうに圓く厚い』とあり、臨海異物志には『蚶の大なるものは徑四寸あり、背上の溝文が瓦屋の壟に似たものだ。肉は極めて佳味である』とある。現に浙東附近では海濱の畑田でこれを種ひ、蚶田と呼んでゐる。

肉 氣味 【甘し、平にして毒なし】 鼎曰く、寒なり。炳曰く、溫なり。凡

(三) 浙東トハ浙江省ノ東部ヲ指ス。

そこれを食つたならば、直ぐに飯を食つて壓する。さうせねば口が乾くものだ。時珍曰く、按ずるに、劉恂は『炙いて食へば人體を益するが、過多なれば壅氣する』といつた。

主治

【痿痺、洩痢、便膿血】（別錄） 【五臓を潤ほし、消渴を止め、關節を利

す。丹石を服した人はこれを食ふが宜し。瘡腫、熱毒を免れる】（壘） 【心脊の冷氣、腰脊の冷風。五臓を利し、胃を健にし、健啖ならしめる】（藏器） 【中を溫め、食物を消化し、陽を起す】（蕭炳） 【血色を益す】（日華）

殻**修治**

日華曰く、凡そこれを用ゐるには、陳久なるものを取り、炭火で赤く煨き米醋に淬すこと三回、火毒を出して粉に研る。

氣味

【甘く鹹し、平にして毒なし】

主治

【焼いて醋に淬し、醋で丸に

して服す。一切の血氣、冷氣、癥癖を治す】（日華） 【血塊を消し、痰積を化す】（震亨） 【肉を連ねて焼いて性を存し、研つて小兒の走馬牙疳に傅けるが有效である】（時珍）

發明 時珍曰く、鹹は血に走つて堅きを癭にする。故に互蘊子は能く血塊を消し、痰積を散するのだ。

(一) 木村(重)曰ク、最大ノ二枚貝ニシテ印度方面ニ多産シ、南方支那ニモ棲ム。二三ノ書、車渠ハほたてがひ(海扇)ト云フモ、ココニハしやこヲ探ル、海月ノ項参照。

(二) 一本、掲テ揖ニ作ル。
(三) 西國トハ地中海沿岸地方チイフ。西域ハ今ノ新疆省ノ地ナリ。

車渠(海薬)

和名 しやこ
學名 *Tridacna gigas*, L.
科名 しやこがひ(車渠貝)科

校正

玉石部より此に移し入る。

釋名

海扇

時珍

按ずるに、韻會に「車渠は海中の大貝であつて、背上の壘文が車輪の渠のやうだから名けたものだ。車溝を渠といふ」とある。劉積の霏雪錄には「海扇は海中の甲物であつて、その形は扇のやうで背の文は瓦屋のやうだ。三月三日に潮の盡きたとき出る」とある。梵書にはこれを牟


婆各(三)掲拉婆といつてある。

集解

李珣曰く、車渠は、玉石の類だといふ。(三)西

國に生ずる。形が蚌蛤のやうで文理がある。西域では七寶の一到に數へられてゐる。

時珍曰く、車渠は大蛤だ。大なるは長さ二三尺、濶さ一尺ばかり、厚さ二三寸あり、殻の溝壟は蚌殼のやうで深く大きく、全體に縦の文が



[渠 車]

あつて瓦溝のやうだ。横の文はない。殻の内部は玉のやうに白皙だ。やはり甚だ高價なもので、番人はこれを器物の飾にする。これは玉石類のものだとか、或は玉類中にも車渠といふものがあつて、それがこの蛤に似てゐるからこの蛤もさういふのだなどといふ謬妄をいふもある。沈存中の筆談には『車渠は、大なるものは箕ほどあり、背に渠壟があつて蚶殻のやうなものだ、これで作つた器は精緻にして白玉のやうだ』とあり、楊慎の丹鉛錄には『車渠で盃を作る』とあり、その註に『酒を一分まで多く満て過ぎても溢れないといふ。實際に試みたが果してその通りだつた』とある。

殻 氣味

【甘く鹹し、大寒にして毒なし】

主治

【神を安じ、宅を鎮

(宅) 道家ニテ精神、魂魄ノ居ル處ヲ屋宅ト稱ス。此ニ宅トイフハ、恐ラクソノ屋宅ノ意ナラン。

める。諸毒藥、及び蟲螫を解するには、砒理と等分を人乳に磨つて服す。極めて效驗がある】(均)

發明

時珍曰く、車渠は蓋し瓦壟の大なるものことだ。故にその功用もやはり彷彿たるものなのである。

貝子 (本經下品)

和名 めんがたからがひ
學名 *Prasaria moneta*, L.
科名 たからがひ(寶貝)科

(一)木村(重)曰ク、貝子ハ海産ノたからがひナリ。中部支那ヨリ南支那ニ互ツテ多シ、貝色薄黄、黄、白色等種種アリ。バイツ(貝子)ト稱シ、小兒ノ驚除トスル所アリ。種ハ他ニ二三アリ、又二三ノ屬アリ代表的ノモノナトル。

釋名

貝齒 別錄) 白貝(日華) 海肥 俗に貳と書く、音は巴(ハ)である。

時珍曰く、貝の字は象形の文字であつて、その中の二點はその齒刻を象り、その



貝子

下の二點はその垂れた尾を象つたものだ。古代には貝を貨幣とし、龜を貴寶として交易をなしたもので、その二箇を朋といつた。今では雲南だけでこれを海肥と稱して通用し、單位一を庄といひ、四庄を丰と

いひ、四丰を苗といひ、五苗を索といふ。

頌曰く、貝は腹下が潔白で魚齒のやうな刻がある。故に貝齒といつたのだ。

集解

別錄に曰く、貝子は東海の池澤に生ずる。採取に一定の時期はない。

弘景曰く、南海に出る。此にいふものは小さい白貝子のこと、一般に軍用のものや服器の裝飾に用ゐるものだ。

珣曰く、雲南に極めて多く、錢貨として交易に用ゐてゐる。

頤曰く、貝子は貝類の最小なるもので、やはり鯛のやうな状態で長さ一寸ばかり、色は微白、また深紫黒のものもある。現に多くは穴を穿けて小兒の翫弄物にしてゐる。北方の地では衣服や氈帽に綴り付けて飾とし、理髪店で鏡の飾などにし、畫家で物を研るに用ゐる。

時珍曰く、貝子とは小貝子のこと、大いさは拇指の頂ほど、長さは一寸ばかり、背も腹もみな白い。この種の諸貝はいづれも背が龜の背のやうに隆く、腹下が兩方に開いて相向つて魚齒のやうな齒刻があり、その中の肉は蜆蚌のやうで首と尾とがある。故に魏子才の六書精蘊に「貝は介蟲であつて、背の穹くして渾しきは天の陽に象り、腹の平にして折けたるは地の陰に象る」とある。貝は種類の多いもので、爾雅を見ると『貝は、陸に在るを賸——音は標（ヘウ）——といひ、水に在るを蝸——音は函（カン）——といひ、大なるを鮡——音は杭（カウ）——といひ、小なるを鱗——音は脊（セキ）——といひ、黒きを玄といひ、赤きを赭といひ、黃質、白文なるを餘貳——音は池（チ）——といひ、白質、黃文なるを餘泉といひ、博くして——標なるを蜃——音は

（三）標ハ類（音ハ匡軌ノ切キ）爾雅ニハ

『蛇博而類』トアリ、
 註ニ類ハ中央廣ク、
 兩側銳キナリトア
 リ。
 (三)爾雅ニ螭トアリ。
 (四)三代ハ夏、殷、
 周。
 (五)相貝經ニ正ヲ貞
 ニ作ル。
 (六)同書、珠ハ朱ニ
 作ル。
 (七)同書ニ畫ヲ蓋ニ
 作ル。
 (八)同書ニ消ヲ清ニ
 作ル。
 (九)同書ニ腹ヲ伏ニ
 作ル。
 (一〇)相貝經、脊ヲ背
 ニ作ル。
 (一一)本書ニ硃ヲ朱ニ
 作ル。
 (一二)本書ニ近ヲ親ニ
 作ル。
 (一三)本書ニ雌ヲ雌ニ
 作ル。

巴(ハ)——といひ、大にして險なるを蝸——音は困(キン)といひ、小にして(三)狹きを
 蝸——音は責(セキ)といふ』とある。又、古代の書の相貝經には甚だ詳に記述して
 あつて、その文に『朱仲がこれを琴高から受けて會稽の太守嚴助に遺す』といひ、
 『徑一尺の貝は(四)三代の(五)正瑞、靈奇の祕寶である。それに次ぐ一尺までのもので、
 赤電、黒雲の狀あるものをば紫貝といふ。素質、紅章のものをば(六)珠貝といふ。青
 池、綠文のものをば綬貝といふ。黒文、(七)黃畫のものをば霞貝といふ。紫貝は疾を
 癒し、朱貝は目を明にし、綬貝は氣障を(八)消し、霞貝は蛆蟲を(九)服す。齡を延べ壽
 を増す機能はないけれども、その害を禦ぐ點は同一である。またこれよりも下なる
 もので鷹喙蟬(一〇)脊のものがあつた。これはただ濕を逐ひ、水を去るだけのもので奇功
 はない。貝の大なるもので輪ほどあるものは目を明にする。南海の貝で(一二)硃磔ほ
 どで白駁あるものは、性は寒、味は甘で水毒を止める。浮貝といふは人をして性慾
 を減退せしめるものだから、婦人に(一三)近けてはならぬ。それは黒白各半するもの
 だ。濯貝といふは人をして善く驚せしめるものだから、小兒に近けてはならぬ。それ
 は黃唇で齒に赤駁のあるものだ。(一四)雖貝といふは人をして瘡を病ましめるもので、

二四木書ニ蟾トウ子トウ隣トウニ
作ル。

二五木書ニ惠トウ子トウ魅トウニ
作ル。

二六木書ニ惡トウ子トウ志強トウ
ニ作ル。

二七木書ニ鬼魅トウヲ迷
鬼狼狗トウニ作ル。

黒鼻で皮のないものだ。（二五）蟾貝といふは人の胎を消せしめるものだから、妊婦に見
せてはならぬ。それは脊に赤帶の通つてゐるものだ。（二五）惠貝といふは善く人を忘れ
しめるもので、非常に赤くして内殻に赤絡のあるものだ。鬻貝といふは小兒を低能
にし、婦人を多淫ならしめるもので、青唇、赤鼻のものだ。碧貝といふは人をして
盗ましめるもので、脊上に縷あつて唇に勾る、雨の時は重く、霧れば軽くなるもの
だ。委員といふは人をして （二六）惡せしめ、夜行の場合に能く （二七）鬼魅、百獸を伏す
るもので、赤くして中が圓く、雨の時は軽く、霧れば重くなるものだ』とある。

修治

珣曰く、凡そ薬に入れるには焼いて用ゐる。

敷曰く、凡そこれを使用する場合に花蟲殻（二六）を用ゐてはならぬ。眞に似てゐるが、
ただその物には效力がない。貝子は、蜜、醋で相對して浸し、蒸して取り出し、清
酒で淘り研つて用ゐる。

氣味

【鹹し、平にして毒あり】

主治

【目瞤、五癰（二五）。水道を利す。鬼疰（二六）、蠱毒（二七）、腹痛、下血（本經）】

【温疰寒熱。
肌を解し、結熱を散ず】（別錄）【燒き研つて目に點ければ瞤を去る】（弘景）【傷寒狂熱】

〔甄權〕「水氣、浮腫を下す。小兒の疳蝕、吐乳」〔李珣〕「鼻淵で膿血を出すもの、下

痢、男子の陰瘡を治し、漏脯、麝腦の諸毒、射罔の毒、藥箭の毒を解す」〔時珍〕

附方

舊四、新四。

【目花醫痛】貝子一兩を焼いて麝のやうに研り、龍腦少量を入れて點ける。瘰癧肉があるには眞珠末等分を加へる。〔千金〕【鼻淵膿血】貝子を焼いて研り、一日三回、三錢づつを生酒で服す。【二便關格】通ぜずして悶脹するは

二三日で死亡するものだ。貝齒三枚、甘遂三銖を末にし、漿水で和して服す。須臾にして通ずる。〔肘後方〕【小便不通】白海肥一對を、一箇は生、一箇は焼いて末にし、

溫酒で服す。〔同氏方〕【下疳陰瘡】白海肥三箇を紅く煨き、研末して搽る。〔簡便單方〕

【食物中毒】貝子一箇を含んで自ら吐く。○聖惠では、漏脯毒、麝腦毒、及び射罔が諸肉中に在て有毒のものを治するに、いづれも貝子を焼いて研り、半錢を水で調へて服す。【射罔の中毒】方は上に同じ。【藥箭簇の毒】貝齒を焼いて研り、一日

三回、三錢づつを水で服す。〔千金方〕

(一) 紫貝 (唐本草)

和名 はなまるゆき
 學名 *Trosaria capusporontis*, L.
 科名 たからがひ(寶貝)科

(一) 木村(重)曰ク、紫貝ハ貝子ニ似タルたからがひナリ、山頂ニ種種ノ形ノ白斑アリ、栗色ノモノ又濃紫色ノモノアリ、南支那、臺灣等ニ分布ス、他ニ此ニ似タル種アリ。

釋名

文貝(綱目)

研螺

時珍曰ク、南州異物志に『文貝は甚だ大きく、質

は白く、文は紫で、姿なく、自然に外飾を假らずして光彩煥爛たるものだからかく名けたのだ』とある。頤曰ク、畫家が物を研るに用ゐるから研螺といつたのだ。

集解

恭曰ク、紫貝は東南海中に出る。形は貝子に似て大いさ二三寸、背に紫斑があつて骨が白い。南方の蠻地ではこれを探つて貨幣として用ゐる。



〔貝 紫〕

宗彥曰ク、紫貝は背上が深紫色で黒斑がある。

頤曰ク、貝は種類が極めて多く、古代にはこれを寶貨としたのだが、紫貝が就中高價のものだつた。後世では用ゐられず、賤しいものとされて藥中にも使用されることが稀だ。

時珍曰ク、按ずるに、陸機の詩疏に『紫貝は質白くして玉の如く、紫點が文をなしてみな行列して一个所に集り、大なるは徑一尺七八寸ある。』交

(二) 交趾ハ草部芳草類山薑ノ註、九眞ハ

同上、及び蟲部卵生類紫蠟ノ註ヲ見ヨ。

(三) 疹下ニ入目ヲ脱ス。食物本草ニ此ノ二字アリ。

(一) 木村(重)曰ク、珂ハ日本産ノほととぎすかひニ似テ、殻ハ黒色ノ海産二枚貝ナリ、支那本土ニ分布ス。今假ニ屬名ヲ採リテ後致サ候ツ。

趾ち、九眞きゅうしんではこれを盃や盤にする』とある。

修治 貝子に同じ。

氣味 【鹹し、平にして毒なし】

主治 【目を明にし、熱毒を去る】(唐本) 【小兒の癰疹はんしん、目瞤もくそい】(時珍)

附方 新一。【癰疹の目に入りたるもの】紫貝、即ち研螺げら一箇を生で細末に

研り、羊肝べうかんを切片してその上に摻り、括つて米泔で煮熟し、瓶に盛つて一夜露し、空心に嚼んで食ふ。(嬰童百問)

(一) 珂 (唐本草)

和名 缺
學名 *Iradydantes* sp.
科名 いがひ(貽貝)科

釋名 馬珂螺(綱目) 瑊 音は恤(ジツ)である。時珍曰く、珂とは馬勒はろくの飾であつて、この貝がそれに似てゐるから名けたものだ。徐表は馬珂としてある。通典

に『老鵬らうほうは海に入つて瑊、即ち珂かとなる』とある。

集解 別錄に曰く、珂は南海に生ずる。採取に一定の時期はない。白くして

蚌けいのやうだ。



〔珂〕

恭曰く、珂は貝類であつて、大いさは鰓ほど、皮は黄黒で骨は白い。物を裝飾する材料になる。

時珍曰く、按ずるに、徐表の異物志に『馬珂螺は太きは圍り九寸、細きは圍り七八寸、長さ三四寸ある』とある。

修治

敷曰く、珂は、冬期に採つた色の白膩なもの、并に白い旋水文のあるものに限る。火に觸れてはならぬ。用をなさなくなるものだ。凡そこれを用ゐるには、銅刀で末に刮けつり、研細して二重に羅ろひ、再び千回研る。婦人の薬には入れない。

氣味

〔鹹し、平にして毒なし〕

主治

〔目瞤もくそい〕血を斷ち、肌を生ずる〔唐本〕〔瞤膜、及び筋贅肉を消す。刮つて點ける〕〔李珣〕

〔顔面の黒さを去る〕〔時珍〕

附方

新二。

〔目に生じた浮瞤〕馬珂三分、白龍腦半錢、焼いた白礬一分を研

勻して點ける。〔聖惠方〕

〔顔の黒さを白くする〕馬珂、白附子びやくふし、珊瑚さんご、鷹屎ようし白等分を

末にし、毎夜人乳で調へて傅け、翌朝漿水で洗ふ。〔同上〕

(一) 木村(重)曰ク、石蚶ハ潮ノ満線ノ岩石ノ割目等ニ群生ス、體ハ絶ノ脚ノ如ク、柄部ニ石灰質ノ殻アリ、廣ク海濱ニ分布ス。コレニ似タル別屬アリ、今代表的ナルモノヲ探ル。

石 蚶

音は劫(カフ) (綱目)
である。

和名 かめのて
學名 *Micha micella*, (Linné)
科名 えぼしがひ(烏帽子貝)科

釋 名

紫蛭 音は劫、蚶と同じ。紫籜 音は枵(カフ)である。龜脚(俗名)

集 解

時珍曰く、石蚶は東南海中の石上に生ずる。蚌蛤の屬だ。形は龜の脚



〔蚶 石〕
— 脚龜 —

のやうで、やはり爪のやうな状態のものがある。殻は蟹、螯のやうで色が紫だ。食へる。眞臘記に『長さ八九寸のものがある』とある。江淹の石蚶賦には『また

足、翼があり、春雨に遇へば花を生ずる』とある。それは郭璞の江賦に『石蚶は節に應じて葩を揚ぐ』とあるからだ。荀子は『東海に紫蚶、魚鹽あり』といったのはこのものだ。或はこれを紫貝、及び石決明とするものもあるが、いづれも誤だ。

氣 味

【甘く鹹し、平にして毒なし】

主 治

【小便を利す】(時珍)

(二) 淡 菜 (宋嘉祐)

和名 けがひ
學名 *Mytilus japonicus*, Tamaru.
科名 いがひ(貽貝科)

釋名

殼菜(浙地方で呼ぶ名稱) 海蛭 音は陸(へい)である。東海夫人時

珍曰く、淡とはその味を、殼とはその形をいつたもの、夫人とはその似てゐるところから名けたものだ。

集解

藏器曰く、東海夫人は東南の海中に生ずる。珠母に似たもので、一頭が小さくして中に少しの毛を啣む。味は甘味だ。南方の地では好んで食ふ。



詵曰く、平常焼いて食へば、苦くして人體に宜しくない。少量の米と共に先づ煮て後に毛を除き去り、再び蘿蔔、或は紫蘇、或は冬瓜を入れて共に煮れば更に妙である。

日華曰く、形状は尾籠なものだが、甚だ人體を益す

(一) 木村(重)曰く、淡菜ハ海産ノ二枚貝ニシテ、殻皮ハ黒褐色ニ棕櫚毛狀ノ長毛ヲ密生ス。支那ニ於テハ珍味トサレ高價ナリ、婦人ハ迷信的ニコレヲ好食ス。一名クンツアイ(貢菜)ト呼ビ最モ美味トサル貝ナリ。支那海岸ニ産スルモ額少シ。

る。

時珍曰く、按ずるに、阮氏は『淡菜は海藻上に生ずるものだ。故に癭を治す。海藻と同功だ』といつてある。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】日華曰く、多食すべきものでない。多食すれば頭、目を悶闇せしめるが、微し通じをつければ止まる。藏器曰く、多食すれば丹石を發し、腸結を起す。久しく食へば頭髮が脱ける。

主治

【虚勞の傷憊、精血の衰耗、及び吐血、久痢、腸鳴、腰痛、疝瘕、婦人の帶下、産後の瘦瘠】藏器【産後の血結、腹内の冷痛。癥瘕を治し、毛髮を潤ほし、崩中帶下を治す。焼いて一頓に食つて飽かしめる】孟詵【煮熟して食へば、能く五臓を補し、陽事を益し、腰脚氣を理し、能く宿食を消化し、腹中の冷氣瘕癖を除く。やはり焼いて汁を沸き出させて食ふのである】日華【癭氣を消す】時珍

海 贏 (拾遺)

和名 てつぼら
學名 *Thais rud. Linn.*
科名 はねがひ(骨貝)科

校 正

時珍曰く、唐本の甲香を此の一條に併せ入る。

(一) 木村(重)曰ク、
ほらがひナリ、暖海
ニ産ス。道教ノ道士
コレヲ法螺トシテ吹
ク、ハイラ(海螺)
ト呼ブ。ハイラト稱

スル中ニハ、ばいノ
如キ小ナルモノモ稱
スル事アリ。

釋名

流螺（圖經）

假猪螺（交州記）

厖（厖）を甲香（厖）と名ける

時珍曰く、螺は

厖（厖）と同じ。また蝨（蝨）とも書く。厖の文字は虫に従ふ厖（厖）の省文であつて、蓋し蝨の厖形のものといふ意味だ。厖の字は掩（掩）（エン）と發音する。閉ぢ厖れた状態をいふ。

集解

頌曰く、海螺、即ち流螺であつて、厖を甲香といふ。南海に生ずるも

（二）嶺外ハ廣東、廣西地方、閩中ハ福建省地方、明州、台州ハ石部齒石類食鹽ノ註ナ見ヨ。

のだ。今は（一）嶺外、閩中の近海の州郡、及び明州にいつれもある。或は台州の小さなものだけが佳いともいふ。その螺は大いさ小兒の拳ほどの青黄色のもので、長さ四五寸ある。諸種の螺の中でこの螺の肉が最も味が厚い。南方地方ではこれを食べ。南州異物志に『甲香は大いさ甌（甌）ほどあつて、前面の一邊は直（直）く擽（擽）へて長さ數寸あり、罎（罎）りの殻はでこぼことして刺がある。その厖（厖）を衆（衆）くの香に雜（雜）せて焼けば益（益）。芳しいが、この物のみを焼けば臭い』とある。今は醫家で用ゐることは稀だが、ただ香を合せる者が用ゐる。又、小甲香といふ螺子のやうな形状のものがあつて、その厖（厖）を取つて香を調合する。海中の螺類には非常に大なるものもあつて、珠螺といふは瑩（瑩）潔（潔）で珠のやうなものだ。鸚鵡螺（鸚鵡螺）といふは形が鸚鵡の頭のやうだ。いづれも杯に作れる。梭尾螺（梭尾螺）といふは形が梭のやうなもので、今の佛教徒が吹くものがそれである。

（三）日南ハ石部玉ノ
註ヲ見ヨ。 瀬海ハ南
海ノ別稱。

いづれも藥に入れない。

時珍曰く、螺は蚌はうの屬であつて、大なるものは斗ほどある。（三）日南の瀬海中に出



〔海〕

る香螺は簪を甲香に雜へられる。老銅螺は光彩があつて鏡の背面を飾るに用ゐる。紅螺は色が微紅、青螺は色が翡翠のやうだ。蓼螺は味が蓼のやうに辛い。紫貝

が鳥の形のやうだ。その肉は常に殻から離れて食物を漁くさりに外部へ出る。すると寄居蟲がその留守に入つてゐるが、螺が還るとその蟲が外部へ出る。肉が魚に食はれて了ふと殻が浮き出すもので、それを人間が取つて杯に作る。

肉 氣味 【甘し、冷にして毒なし】

主治 【或は三四十年来に互る永き目痛には、生きた羸の汁を取つて洗ふ。或は

黄連末を内に入れて汁を取つて點ける】（藏書）【菜に合せて煮て食へば心痛を治す】

（孫思邈）

甲香

修治

敷お曰く、凡そこれを使用するには、生茅香、皂角と共に半日煮

て、石臼で搗いて篩つて用ゐる。

經驗方に曰く、凡そそれを使用するには、黄泥と水とで一日煮て温水で浴過し、再び米泔、或は灰汁で一日煮て再び浴過し、蜜酒で一日煮て浴過し、燂き乾して用ゐる。

頤曰く、傳信方に記載してあるその方法は『甲香一斤毎に泔一斗半で微火で一復時煮て、泔を換へて再び煮る。かく凡て二回換へて漉し出し、多人數でその香上の涎物を刮り去り、白米三合、水一斗と微火で煮乾し、また蜜三合、水一斗で三伏時煮てから、炭火で地上を燒き熱して酒を洒いで潤ほした上にその香を鋪き、一伏時の間新瓦でその上を蓋ひ、冷えて硬まるを待つて石の臼、木の杵で搗き爛らし、沈香末三兩、麝一分を入れて和して搗き、型に入れて固めてから瓶に入れて貯へ、久しく埋めて置いてから始めて燒く。凡そこの香を燒くには、大火爐に熱灰を多く入れ、剛い炭で強く燒いて盡く燒け去るやうにすべきものであつて、爐邊に火を置き水を煖めて置けば香が散ぜぬ。この法は劉尧奉禮から出たものだ』とある。

宗奭曰く、甲香はよく香烟を管するものだ。沈、檀、龍、麝の香と共に用ゐる

(四) 管ハ支配スルト
イフホドノ意味ナリ

が就中佳し。

【氣味】 鹹し、平にして毒なし】

【主治】 【心腹の満痛、氣急。痢を止め、淋を下す】(唐本) 【氣を和し、神を清

し。腸風痔瘻に主效がある】(李珣) 【瘰癧、疥癬、頭瘡、癢瘡、甲疽、蛇、蠍、蜂の
整傷】(藏器)

甲煎 (拾遺)

和名 米
學名 米
詳

(一) 木村、重曰ク、
甲煎、米詳、或ハ蠟類
ノ乾肉ヲ謂ノニ非ザ
ルカ、後改テ俟ツ。

集解



藏器曰く、甲煎とは諸藥、及び美なる果、花と灰に燒き、蠟で和して

製造した口脂のことだ。主たる治效は甲香とほぼ同じ。

製造後三年を経過したものが良し。

時珍曰く、甲煎は、甲香と沈、麝等の諸藥や花物とで

調製したもので、口脂にもなれば焚麝する香にもなる。

唐の李義山の詩に所謂『沈香、甲煎を延燎となす』とは

この物のことだ。

【氣味】 【辛し、溫にして毒なし】

【主治】 【甲疽、小兒の頭瘡、吻瘡、口邊の曉瘡、耳後の月蝕瘡、蜂、蛇、蠍の

瘡。いづれも傳ける】(藏器)

(二) 田 螺 (別錄上品)

和名 たにしノ一種
學名 *Viviparus quadrata*
科名 たにし(田螺)科

(一) 木村(重)曰ク、
支那ノ淡水産ノたに
しハ種類甚ダ多シ、
今代表的ナルモノヲ
採ル。他ニ一屬アリ
蛸鴨飼養餌トシテ用
キ、大ナルモノハ有
毒トシテ食用トセ
ズ。

【集 解】

弘景曰く、田螺は水田中、及び湖、瀆の岸側に生ずる。形は圓く、大なるは梨、橘ほど、小なるは桃、李ほどのもので、一般に煮て食ふ。

保昇曰く、形狀は蝸牛くわきうに類して尖つて長く、青黄色である。春、夏に採取する。

時珍曰く、螺は蚌の屬であつて、その殻は旋文せんぶんをなし、その肉は月の盈ち虧けに随ふものだ。故に王充は『月天に毀け、螺淵に消す』といつたのだ。説卦に『離を贏となし、蚌となし、龜となし、鼈となし、蟹となす』とあるは、いづれもその外剛くして内柔なるをいつたものだ。

肉 氣味 【甘し、大寒にして毒なし】

主治

【目熱赤痛、渴を止める】（別錄） 【煮汁は熱を療じ、酒を醒す。眞珠、黄

連末（かんまつ）を内に入れ、良久して汁を取つて目中に注げば

目痛を止める】（弘景） 【煮て食へば大、小便を利し、

腹中の結熱、目下黄、脚氣衝上、小腹急硬、小便赤

澀、手、足の浮腫を去る。生で浸して汁を取つて飲

めば消渴を止める。肉を搗いて熱瘡に傅ける】（藏書）

【丹石の毒を壓す】（孟詵） 【濕熱を利し、黄疸（わうたう）を治す。



田子（たこ） 小 蕪（わ） い

搗き爛して臍に貼れば、熱を引いて下行し、禁口痢を止め、水氣、淋閉を下す。水を取つて痔瘡、胡臭に搽る。燒き研つて癰癤、癰瘡を治す】（時珍）

附方

舊二、新二十一。

【消渴飲水】晝夜止まず、小便の數あるには、心鏡では、

田螺五升を水一斗に一夜浸し、渴するときに飲む。毎日一回、水、及び螺を換へる。

或は煮て食ひ汁を飲むも妙である。○聖惠では、糯米二升を稀粥一斗に煮て冷まし、

田中の活螺三升をその中に入れ、螺が粥を食ひ盡して沫を吐くを待ち、それを取り

收めて飲む。立ろに效がある。【肝熱の目赤】藥性論では、大田螺七箇を洗淨し、新汲水で養つて泥穢（でいさい）を去り、水を換へて一升で洗つて螺を取り出し、清淨な器に入れ、少量の鹽花を甲中に著けて自然汁を器に承け取つて目に點ける。一箇毎にかくして用ゐてから放ち去る。【爛弦風眼】方法は上に同じ。ただ鹽花の代りに銅綠を用ゐる。【飲酒のための口の糜れ】螺蚌（らほう）の煮汁を飲む（聖惠）。【酒酔の醒めぬとき】水中の螺蚌、葱、豉（じ）を煮て食ひ、汁を飲めば解す（肘後）。【小便不通】鼓の如く腹脹するには、田螺一箇、鹽半ヒを生で搗き、臍下（さいか）一寸三分の處に傅ければ通じる。熊彥誠が曾てこの病に罹つたとき、この方を授けられて果して癒えた（類編）。【禁口痢疾】大田螺二箇を搗き爛らし、麝香三分を入れて餅にし、煨（や）き熱して臍間に貼る。半日にして熱氣が下行して食思が起り、甚だ效がある（丹溪）。【腸風下血】酒毒に原因するものには、大田螺五箇を、殻が白くなつて肉が乾くまで焼いて研末し、それを一服として熱酒で服す（百一）。【大腸脱肛（だつこう）】三五寸脱下したるには、大田螺二三箇を井水で三四日養つて泥を去り、雞爪黃連を研細して末にし、それを臍中（さいちゆう）に入れて化して水となるを待ち、肛門を濃茶で洗淨し、雞翎（けりう）にその末を蘸（つ）けて掃ひ、軟い帛

で托上する。自然に復して再發せぬ。(德生堂經驗方) 【反胃嘔噎】はんいおうえつ田螺を洗淨して水で

養ひ、泥を吐出するを待つて澄し取つて晒し、半乾して梧子大の丸にし、三十丸づつを藿香湯くわかうたうで服す。爛殻を研つて服するもよし。(經驗方) 【水氣浮腫】大田螺、大蒜、

車前子等分を搗いて膏にし、臍上に攤のして貼る。水は排尿と共に下る。象山縣の一

縣民がこれを病んだとき、この方を得て癒えた。(仇遠釋史) 【酒疸、諸疸】田螺を數

日間水で養つて泥を去り、取出して生で搗き爛らし、好酒の中に入れて布帛で濾過

し、一日三回その汁を飲む。日に日に效がある。(壽域) 【脚氣攻注】生の大田螺を搗

き爛らして兩股上に傅け、冷氣が足まで趨おもふを覺えて平安になる。又、丹田に傅けて

小便を利するがよし。董守約は曾てこれを用ゐて效があつた。(釋史) 【痔漏疼痛】乾

坤生意では、田螺一箇の中に片腦一分を入れ、水を取つて揉もる。それには豫め冬瓜

湯で患部を洗淨する。○孫氏は、田螺一箇を針で刺し破り、白礬末はくばんまつを入れて共に一

夜埋め、螺内の水を取つて瘡上に掃く。またよく痛を止めて甚だ妙である。○袖珍

では、馬齒莧湯ましかんたうで洗淨し、活螺螯くわつらうを搗いて傅ければその病が癒える。【腋氣胡臭】

乾坤生意では、田螺一箇を水で養ひ、罽えんの開くを俟つて挑あげて巴豆仁はづにん一箇を中に入

れ、盃中に夏は一夜、冬は七夜置いて自然に水になつたものを取り、常に揉る。久しくして根を絶つ。○又ある方では、大田螺一箇の中に麝香三分を入れ、露地に七週間埋めて取り出し、患部を洗ひ拭つて墨を塗り、再び洗つて見て墨のある部分が中心の患部だから、そこに三五回右の螺汁を點ければ瘥える。「瘰癧の潰破せるもの」田螺を肉共に焼いて性を存し、香油で調へて揉る（集要方）「疔瘡惡腫」田螺に氷片を入れて水に化し、瘡上に點ける（普濟）「風蟲癰瘡」螺螄十箇、槿樹皮末一兩を共に碗に入れ、蒸し熱して搗き爛らし、礬紅三錢を入れ、鹽水で調へて揉る。（孫氏）「指を繞る毒瘡」手、足の指に生じたるには、活田螺一箇を生で搗き碎き、それを貼つて縛れば瘥える（多能鄙事）「妬精陰瘡」大田螺二箇を殼のまま焼いて性を存し、輕粉を入れて共に研つて傅ければ效がある（醫林集要）

殼 氣味 【甘し、平にして毒なし】

主 治 【焼いて研つたものは尸疰、心腹痛、失精に主效があり、瀉を止める

（別錄）「爛れたものを焼き研つて水で服すれば、反胃を止め、卒心痛を去る」（藏書）「爛殻を細末に研つて服すれば、下血、小兒の驚風、瘡、瘡瘍の膿水あるを止める」（時珍）

附方

新三

【心、脾痛】止まぬには水甲散が主效がある。田螺殻——溪間のものでもよし——を、松柴片を層層に積んで焼き、火を吹き松灰を去つて殻を取つて研末し、烏沈湯、寛中散の類で調へて二錢を服す。不傳の妙がある。(集要) 【小兒の頭瘡】田螺殻を焼いて性を存し、清油で調へて搽る。(集要) 【小兒の急驚】年古き白田螺殻を灰に焼き、麝香少量を入れて水で調へて灌ぐ。(集要)

蝸

贏

(別錄)

和名 ひめたにし
學名 Viviparus histrio, Gould.
科名 たにし(田螺)科

(一) 木村(重)曰ク、小型ノたにしニシテ寧波料理ニ於テハ美味ノモノトセラル、日本ニテ九州地方ニ分布ス。

(二) 江夏ハ石部紫石英ノ註ヲ見ヨ。

(三) 漢河ハ鱗部魚類鮡魚ノ註ヲ見ヨ。

釋名

螺蛳

時珍曰く、師とは衆多なるをいふ。形が蝸牛に似てその類のものが衆多だからこの二種の名稱があるのだ。爛殻を 鬼眼睛 と名ける。

集解

別錄に曰く、蝸螺は江夏の溪水中に生ずる。田螺より小さくして上に稜がある。

時珍曰く、處處の湖、溪にゐるもので、江夏、漢河に就中多い。大いさは指頭ほどで殻は田螺よりも厚い。ただ泥水だけを食ふものだ。春期に採り、鍋に入れて

蒸すと肉が自ら出る。それを酒で煮、糟で煮て食ふ。清明節後には中に蟲があるから用ゐられない。

藏器曰く、この物は容易に死なぬもので、誤まつて泥に入つたものをそのまま壁に塗り込んで了ふと、數年経つてもなほ活きてゐるものだ。

肉 氣味 【甘し、寒にして毒なし】

主治

【燭館、日を明にし、水を下す】（別錄） 【渴を止める】（藏器） 【酒を醒

し、熱を解し、大、小便を利し、黃疸、水腫を消し、反胃、痢疾、脫肛、痔漏を治す】（時珍） 又曰く、燭館の二字は訛誤のやうに思はれる。

附方

新七。 【黃疸、酒疸】 小螺鰯を養つて泥土を去り、日毎に煮て食ひ、汁

を飲むが有效だ。（水類） 【黃疸吐血】 病後に身體、面部が俱に黃になり、一盆ほども吐血し、諸藥の奏效せぬには、螺十箇を水で漂して泥を去り、搗き爛らして一夜露し、五更にその清んだ部分を取つて服す。二三回で血が止んで癒える。あるこの病の患者にこれを用ゐて奏效した經驗がある。（小山怪證方） 【五淋、白濁】 螺鰯一盆を殼共に炒り熱し、白酒三盃を入れて一盃に煮取り、その肉を挑げ取つて食ひ、その酒

（時珍曰く、燭館ノ二字恐クハ訛誤ナリ。）

で飲下す。數回にして效がある。(扶壽精方) 【小兒の脱肛】螺螄二三升を桶の中に鋪

いて坐る。少頃して癒える。(簡便) 【痘疹目瞤】螺螄を水で煮て常に食ふが佳し。(濟

急仙方) 【自遊風腫】螺螄肉に鹽少量を入れ、泥に搗いて貼る。神效がある。(葉氏摘玄方)

爛殼 時珍曰く、泥中、及び牆壁上の年久しきものが良し。火で煨いて用ゐる。

氣味 同し。主治 【痰飲積、及び胃脘痛】震亨 【反胃、膈氣、痰嗽、鼻

淵、脱肛、痔疾、瘡癰、下疳、湯火傷】(時珍)

發明

時珍曰く、螺なるものは蚌蛤の屬であつて、その殼の大抵蚌粉、蛤粉、蚌、蜆の類と同功なることは、摠合して觀察すれば自から首肯される。

附方

新十。【卒に起つて咳嗽】屋上の白螺、或は白蜆殼を搗いて末にし、酒

で方寸匕を服す。(肘后方) 【濕痰心痛】白螺螄殼を洗淨し、焼いて性を存して研末し、

酒で方寸匕を服すれば立ろに止まる。(正傳) 【膈氣疼痛】白玉散——壁上の陳い白螺

螄を焼いて研り、一錢つづを酒で服するが甚だ效がある。(孫氏) 【小兒の軟癰】谷

間の年久しき螺螄を灰に焼いて傳ける。(奇效) 【湯火傷瘡】多年の乾いた白螺螄殼を

煨いて研り、油で調へて傳ける。(普案) 【楊梅瘡爛】古牆上の螺螄殼、辰砂等分、片

〔註〕軟癰ハ俗ニナツ
ブシト云フ。

〔考〕哮喘ハ百日咳。

腦少量を末にして搽る。【小兒の哮喘】南向きの牆上の年久しき螺蛸を末にし、日脯時に水で適當に調へ、日の落ちる時刻に、手を舉げ合掌し歸依して吞む。即效がある。(葉氏摘玄方) 【瘰癧の已に破れたもの】土牆上の白螺蛸殻を末にし、日毎に傅ける(談華翁方) 【痘瘡の收らぬもの】牆上の白螺蛸殻を洗淨し、煨き研つて搽る。(醫方摘要)

二 蓼 羸 (拾遺)

和名 缺
學名 *Ichthia sp.*
科名 ばていら(馬蹄螺科)

集 解

藏器曰く、蓼螺ハニ永嘉の海中に生ずる。味が蓼のやうに辛辣だ。

時珍曰く、按ずるに、韻會に『蓼螺は紫色で斑文がある。現に寧波から出る泥螺で、形狀は蠶豆のやうだ。海錯の代りにもなる。』

肉 氣 味 【辛し、平にして毒なし】

主 治 【飛尸、遊蠱には生で食ふ。薑醋で浸すがいいよ佳し。(藏器)】

(一) 木村(重)曰ク、
蓼羸ハ海產ナリ、か
たつかりニ似テ頂低
シ、寧波附近ニテハ
ニイラ(泥螺)ト稱
ス、泥中ニ棲ム、生
食セズ必ズ鹽藏後食
ス。ささこもどきニ
類ス、今假ニ屬名ヲ
定メテ移改ナ候ツ。
(二) 永嘉ハ草部芳草
類馬蘭ノ註ヲ見ヨ。
(三) 寧波ハ唐ノ明州
ノ地、今ノ浙江省鄞
縣ソノ舊治ナリ。

（二）本料（重）曰ク、
寄居蟲ハ錯脚一有同
大ニシテ第二脚ヨリ
細シ、印度ヨリ日本
ニ分布サル、他ニ一
属アルモ一般的ノモ
ノサトリ、後放ア候
ッ。

（二）寄居蟲（拾遺）

和名 あしほそやどかり
學名 *Spiropatrus spiriger*, (de Haan)
科名 バグルス科

釋名 寄生蟲

集解

藏器曰く、陶氏の蝸牛くわぎうの註に『海邊に大いに蝸牛に似たものがある。火で殻を炙けば走り出るものだ。これを食へば人に益あり』とあるが、按ずるに、これは螺殻らかくの間にある寄居のことで、螺ではない。螺蛤が蓋を開けて食物を漁るの



〔寄居蟹〕

を狙つてゐて、螺蛤が蓋を合せようとすると、已にその殻中に還つてゐるもので、海族は多くこれに宿を借られて了ふものだ。又、南海に蜘蛛うづに似た一種のもので螺殻中に入つて殻を負ふて走るものがある。觸れると縮つて螺のやうだが、火で炙れば出る。

一名時ていといひ、格別功用のないものだ。

時珍曰く、按ずるに、孫愐は『寄居の壘殻中にゐるものを名けて蟬びといふ』といつた。寄居もやはり一種だけではない。

氣味 缺 主治 【顏色を益し、心志を美くする】(弘景)

(一) 海月 (拾遺)

和名 いたやがひ
學名 *Pecten liguatus*, Sowerby.
科名 はたてがひ(帆立貝)科

(一) 白井曰ク、海月玉珧元ト二物、時珍之ヲ合ス誤ナリ。
木村(重)曰ク、海月ハ扇狀ノ二枚貝、左右概ネ不同ニ膨ラム、殻裂ハ淡褐赤色ナリ。支那本土ノ海岸ニ分布ス。

釋名

玉珧

音は姚(エウ)である。

江珧

屬類

馬甲

藏器

曰ク、海月は蛤の

類であつて、半月に似てゐるところから名けたものだ。水沫から變化したもので、煮ればやはり變じて水となる。時珍曰ク、馬甲、玉珧といふはいづれもその形色に因つて名けたものだ。萬震の贊に「厥の甲の美なること珧玉の如し」とあるはこの物のことだ。

集解

時珍曰ク、劉恂の嶺表錄には『海月は大いさ鏡ほど、白色、正圓のも

(一) 搔頭ハサシケン
長恨歌ニ見ユ。
(二) 鮑ハ胃ノ厚キ處
ヲ云フ。牛頭鮑項ハ
何物ヲ指スカ詳ナラ
ズ。
(三) 奉化縣、即チ浙
江省ノ奉化縣、今ハ

ので、普通海岸に死んでゐる。その柱は搔頭尖ほどで、その甲は玉のやうに美しい」とある。段成式の雜俎には『玉珧は、形は蚌に似て長さ二三寸、廣さ五寸、上が大きく、下が小さい。殻中の柱を炙いて食へば牛頭鮑項のやうな味がある』とある。王氏の宛委錄には『奉化縣では、四月に南風が吹いて來ると江瑤が打ち上

會稽道ニ屬ス。

(五) 木村(重)曰ク、海鏡、和名ひあふぎ、

科名はたてがひ(帆立貝)科。左右兩殼一様ニ膨ラミタル小型ノほたてがひニシテ、殻表ニ美麗ナル色アリ、日本ノ中部ヨリ南方ノ海産。(六) 瑣瑠ハ瑣鮎ノ誤。

げられて來て、一个處で數百採れる。蚌のやうでやや大きく、肉はなまぐさ腥く韌いもので食へないが、ただ四箇の肉柱だけは、長さ一寸ばかりで珂雪のやうに白く、雞汁で淪ゆでて食ふと肥美なるものだ。火力が過ぎると味がなくなる』とある。

附 錄

(五) 海鏡 時珍曰く、一名鏡魚、一名瑣瑠、一名膏藥盤といひ、南海に生

ずる。兩片相合して形を成すもので、殼は鏡のやうに圓く、内側は甚だ瑩あきらかに滑で日光に映ると雲母うんぼのやうだ。その内部には蚌胎はうたいのやうな少わづかな肉があり、腹には大いさ豆ほどで蟹のやうな狀態の寄居蟲がゐて、海鏡が空腹になると、その寄居蟲が出て物を食ひ、歸つて來て中に入ると海鏡が滿腹する。郭璞の賦に(六)『瑣瑠は蟹を腹とし、水母は鰕を目とする』とあるはこれをいつたのだ。

氣 味

【甘く辛し、平にして毒なし】

主 治

【消渴、氣を下し、中を調へ、五臟を利し、小便を止め、腹中の宿物を消し、人をして饑ゑ易く能く食せしめる。生薑せいしょう醬じやうと共に食ふ】(蠃器)

海 燕 (綱 目)

和名	不詳
學名	不詳
科名	不詳

(一) 木村(重)曰ク、不詳、後攻テ俟ツ。白井曰ク、日本ニテハ古來たこのまくらニ充テタリ。英名 Star-fish,

(二) 簞菌ハ座蒲團、

集 解

時珍^〇曰く、海燕^{かいえん}は東海に出る。大いさ一寸ばかりのもので、形狀は扁^{ひらた}くして面が圓く、背上が青黒で腹下が白い。海螵蛸^{かいとうせう}のやうに脆く、三^{さん}簞菌^{ぜんじん}のやうな紋があり、口は腹下に在つて細沙を食ひ、口の傍に五本の眞直、又は勾^{こう}になつたものがあつて、それが即ち足である。臨海水土記に『陽遂足は海中に生ずる。色は青黒で腹が白く、五本の足があるが、頭、尾が判らない。生きてゐる時は體が栗^{やほ}かだが、死ねば乾いて脆^{ちろ}い』とあるはこの物だ。臨海異物志の記載に『燕魚は長さ五寸、陰雨には一丈餘も飛び起さる』とあるが、これも或は同名のものだらう。

氣 味

【鹹し、溫にして毒なし】

主 治

【陰雨の際に損痛を發するには、

煮汁を服し汗を取れば解す。また滋陽藥にも入れる】(時珍)

(一) 木村(重)曰ク、扁球形ノ卷貝ニシテ、殼表黒綠色ヲ呈ス、酢中ニ投入スレバ旋回運動ヲ起ス。支那沿岸ニ分布シ食用トサル、他ニ數種アリ。シヤンツエツー(相思子)ト稱ヘラル。

(二) 郎君子 (海藥)

和名すがひ
學名 *Turbo coroculus* Gmeline.
科名 さざえ(拳螺)科

集解

珣曰く、郎君子は南海に生ずる。雌と雄とあるもので、形狀は杏仁に似て青碧色だ。眞僞を試験するには、口に含んで熱し、それを醋中に放して見ると雌雄が互に相逐ひ、逡巡として合して下るもの、卵が栗のやうな状態のものならば眞物である。やはり得難いものだ。

時珍曰く、顧玠の海槎錄に『相思子は、形狀は螺のやうなもので、内部が石のやうに實し、大いさ豆ほどのものだ。篋笥などの中に藏して置くと、幾年経つても壞れない。醋の中へ入れるとくるくるといつまでも廻つてゐるものだ』とある。按ずるにこれが郎君子そのものだらう。

氣味

缺

主治

【婦人の難産にはこれを手に握れば分娩する。極めて效驗のあるものだ】

本草綱目介部第四十六卷 終

本草綱目禽部

第四十七卷

本草綱目禽部目錄第四十七卷

(一) 師曠ハ周代ノ管人、字子野、音律ヲ好クス、又善ク味ヲ知ルト稱セラル、現存ノ禽經ハ依託ノ書ニシテ後世ノ僞作ナリ。
 (二) 五方ハ東西南北及中央ヲ指ス。
 (三) 尾驛ノ驛ハ尾肉ヲ云フ。
 (四) 晴睨ハ眼睛ニテ睨睨スルコト。

(五) 少皞ハ少昊ニ同ジ、黃帝ノ子ナリ。
 (六) 五鳩ハ少昊ノ時ノ官名、五鳩ハ民ヲ鳩ムル者ナリ、五鳩ハ即視鳩鳩鳩鳩爽鳩鳩鳩ノ五氏ナリ、

李時珍曰く、二足にして羽あるを禽といふ。(一) 師曠の禽經には『羽蟲三百六十、毛は四時に協ひ、色は(二) 五方に合す』とある。山禽は岩に棲み、原鳥は地に處り、林鳥は朝嘲り、水鳥は夜夜き、山禽は味が短くして尾が修く、水禽は味が長くして尾が促い。その交尾狀態は、或は(三) 尾驛に依り、或は(四) 晴睨に依り、或は聲音に依り、或は異類と交合する——雄子、孔雀が蛇と交合するの類——その生れる狀態は、或は翼で抱いて卵を孚し、或は同氣のものから變化し——鷹が鳩に變化するの類——。或は異類のものから變化し——田鼠が鷺に變化するの類——。或は變化して無情のものとなる——雀が水に入つて蛤となるの類——。物界現象の關係はかくもさまざまである。これが研究に従ふものは、容易な努力ではないわけだ。(五) 少皞は(六) 五鳩、九扈を取つて官名とし、詩人が(七) 雄雉、鷓鴣を材料として感懷を觀した如きは、その意味にまた微妙な點がある。(八) 妖天せず、(九) 覆巢せず、(一〇) 殪卵せずして庖人は六禽を供し、翬——音は趙(シ)である——氏は猛鳥を攻め、碧菓氏は(一二) 天鳥の巢を覆すことを制定さ

民ヲ聚ムルヲ以テ職トス、九扈ハ少昊ノ時ノ官名、九扈トハ九農正ヲ指ス、各其職掌アリ今其解ヲ略ス。

(七) 雄雉ハ詩經ノ邶風ニ見エ、鷓鴣ハ豳風ニ見ユ。

(八) 妖天ノ天ハソコナハズト讀ム、天ハ物ノ極ナルヲ天ト云フ、幼ニ同ジ。

(九) 覆巢ハ巢ヲグツガヘサズト讀ム。

(一〇) 殖卵ハ卵ヲチアラズト讀ム。

(一一) 天鳥ハ惡鳥ヲ指ス。

(一二) 川舍ハ取捨ニ同ジ。

(一三) 仁殺ハ生殺ノ意。

(一四) 記ハ玉藻王制ヲ指ス。

(一五) 木村(重)曰ク、現在鳥ノ種類ハ二萬種以上、留鳥、候鳥、

れたる聖人の物に於ける(一三)用舍、(一五)仁殺の意は、まことに徒然ではなかつたと思はれる。(一四)記に『天産を陽と作す』とあるが、鳥類は陽中の陽であつて、概して多くは陽を養ふものである。ここにはその食料品、藥劑として用ゐられるもの、及び毒害なものと注意を用するものを集載して禽部とし、すべて七十七種を水禽、原禽、林禽、山禽の(一五)四類に分類した。舊本草部三品共五十六種の内、本書では一種をば併入し、獸部より一種を移入し、蟲部より一種を移入し、有名未用より一種を移入した。

神農本草經五種 梁の陶弘景註。

唐本草二種 唐の蘇恭。

食療本草二種 唐の孟詵、張鼎。

嘉祐本草十三種 宋の掌禹錫。

圖經本草一種 宋の蘇頌。

本草綱目五種 明の李時珍。

名醫別錄十一種 梁の陶弘景註。

本草拾遺二十六種 唐の陳藏器。

開寶本草一種 宋の馬志。

日華本草一種 宋人大明。

食物本草十種 明の汪穎。

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對

漂鳥ノ別アリ、分類
シテ今鳥古鳥目ハ三
亞目、本書ニ走鳥亞
目ト胸峰亞目トナ載
ス。
胸峰亞目ハ十四族ヲ
含ミ中十族本書ニア
リ、族ニハ各數多ノ
科アリ科ノ下又屬ヲ
置ク、十族ハ即チ阿
比、鵲、鷹、鷹、鵲、
鵲、鵲、杜鵑、佛法僧、
雀族ナリ。

禽の一 水禽類二十三種

唐甄權藥性	蕭炳四聲	唐李珣海藥	孫思邈千金
楊損之刪繁	南唐陳士良食性	蜀韓保昇重註	宋寇宗奭衍義
唐慎微證類	陳承別說	金張元素珍珠囊	元李杲法象
王好古湯液	吳瑞日用	朱震亨補遺	明徐用誠發揮
寧源食鑑	汪機會編	陳嘉謨蒙筌	
鵲 嘉祐	鵲 別錄	鵲 食物	鵲 附す。
陽鳥 拾遺	鵲 食物	鵲 綱目	鵲 嘉祐
鵲 別錄	鵲 本經	鵲 食物	鵲 綱目
鵲 別錄 即ち鴨。	鵲 食療	鵲 即ち野鴨。	鵲 拾遺
鵲 嘉祐	鵲 拾遺	鵲 旋目、方目を附す。	鵲 別錄
鵲 食物	鵲 拾遺	鵲 別錄	鵲 拾遺
蚊母鳥 拾遺	鵲 拾遺	鵲 拾遺	鵲 拾遺
右附方 舊七 新十七			

禽の一 水禽類二十三種

(二) 鶴 (宋嘉祐)

和名 そでくろづる、一名しろづる、一名そでづる。
 學名 *Grucogeranus leucogeranus* (Pallas)
 科名 つる(鶴)科

釋名

仙禽(綱目)

胎禽

時珍曰く、鶴の字の篆文は首を翹げて尾の短い形の形象である。あるひは、白色の

(一) 木村(重日ク、鶴ハ全體純白色ニシテ頭ノ前方及ビ顔ハ裸出シテ青色ヲ呈ス、翼ノ風切ハ黒色、嘴ト脚ハ淡紅色。西比利亞ニ蕃殖シ、冬期ニ中部亞細亞、北部印度、東南歐洲ニ渡ル、日本ニ渡來スルコト稀ナリ。

白鶴(バイハオ(北平)バゴ(南支)仙鶴チエンチン(北平)ト稱ス。

此外くろづる(灰鶴青(ワイハオチン) *Agriolornis grus ilfordi* (Sharp)) たんづる(丹頂 *M. japonicus* (Miller)) まなづる(*Pseudogeranus vipio* (Pallas)) 等モ産ス。

それは誤だ。



〔鶴〕

雌メ雄オたるものだからかく名けたともいふ。八公相鶴經に『鶴は羽族の(三)宗にして仙人の驥キなり。千六百年にして胎産する』とある。胎、仙なる稱呼はこれから出たものだらう。世に、鶴は卵生でないなどいふが、

集解

禹錫〇曰く、鶴には白いもの、玄くろいもの、黄きなるもの、蒼あそいものがあるが、薬用には白いものを入れる。その他の色のものはこれに次ぐ。

（一）宗ハ大木ヲ云フ
鳥ノ首領ヲ云フ。
（二）驢ハ驢足ノ馬、
此處デハノリモノノ
意。

（五）翎ハ尾羽。

（六）雲霄ハ虚空ノコ
ト、オホソラ。

（七）子毛ハ初年ノ羽
毛ヲ指ス。

（八）毳毛ハ字書ニ細
毛トアリ。

（九）胎化ハ胎生ノコ
ト。

時珍〇曰く、鶴は鶴かうより大きく、長さ三尺、高さ三尺餘、喙の長さ四寸、丹頂にし
て目赤く、頬赤く、脚青く、頸修ながく、尾凋しほみ、膝粗あらく、指纖ほそく、羽白く、（五）翎黒く、
また灰色、蒼色のものもある。常に夜半を以て鳴き、その聲は（六）雲霄に唳わび、雄は
上風に鳴き、雌は下風に鳴き、聲で交つて孕む。蛇、虺きをも食ひ、降真香の烟を聞
けば降り、その糞は化して石となる。いづれも物類の相感である。按ずるに、相鶴
經には『鶴は陽鳥だが陰に遊ぶもので、その行動は必ず洲すや渚なみ、若くはその附近にの
み止まり、林木に集るといふことがない。二年にして（七）子毛を落して黒點を易へ、
三年にして産伏する。又七年にして羽翮うかくが具はり、又七年にして飛んで雲漢せまに薄り、
又七年にして舞ふこと節に應じ、又七年にして鳴くこと律に中り、又七年にして大
毛が落ちて（八）毳毛が生え、或は雪のやうに白く、或は漆のやうに黒い。百六十年に
して雌雄互に視合つて孕み、千六百年にして形が始めて定まる。飲むけれども食は
ず、（九）胎化する』とある。又按ずるに、俞琰は『龜、鶴は能く任脈めいを運めらすものだ。

〇〇巨蒐、小川琢治博士ノ考證ニ據レバ巨蒐、即チ漢志朔方郡ノ渠搜ノ地トナシ漢代朔方郡ニ居タルモノノ郷土ハ賀蘭山脈ノ西ニアリタルモノノ如シトナス。又、馮資ニ織皮學尙術友渠搜ノ文アリテ、蔡元定ノ傳ニ水經ヲ引イテ蓋シ朔方ノ地ニ近シトイヒ、小川博士ノ説ニ近シ。然ルニ徐位山ハ朔方ノ渠搜ト古ノ渠搜國トナ二トナシ、隋書ノ東去疏勒千里。去瓜州五千五百里トアルニ據リ蔡説ヲ非トナス。記テ參考ニ供ス。
 〇〇白鶴、穆天子傳各種本ミナ白鶴ニ作レ。
 〇〇水村(重)曰ク、鴨ハ褐色ニ濃斑點アリ一腹二個ヲ常トス。
 〇〇水村(重)曰ク、鴨ハ喉嚨ヲ云フ。

故に多壽にして死といふことがない。氣が中にあるからだ』といった。鶴の骨で笛を作るとその聲が甚だ清越だ。

白鶴血

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

【氣力を益し、虛乏を補

し、風を去り、肺を益す】(嘉祐)

發明

禹錫曰く、按ずるに、穆天子傳に『天子〇〇巨蒐に至る。二氏〇〇白

鶴の血を獻じて飲ましむ。人の氣力を益すと云ふ』とある。

腦

主治

【天雄、葱實と和して服すれば、目が明にして能く夜間字を書き得るやうになる】(抱朴子)

るやうになる】(抱朴子)

卵

氣味

【甘く鹹し、平にして毒なし】

主治

【痘毒を豫防し、多き

をば少からしめ、少きをば出なくする。一箇づつを小兒に與へて食はす】(時珍)

載は活幼全書にある。

骨

主治

【酥で炙つて滋補藥に入れる】(時珍)

地中の砂石子

主治

【水に磨つて服すれば蠱の毒邪を解す】(嘉祐)

(一) 木村(重)曰ク、

鶴ハ全體純白色、只

扇羽、風切羽ハ黒色、

丹頂鶴ト誤ラル事多

シ、東部西比利亞、

北支那、朝鮮ニ多シ、

兵庫縣出石郡鶴山ハ

本邦ニ於ケル唯一ノ

蕃殖場ナリ。

白鶴バイクアン(北

支) バフキ(浙江)長

脚鶴チヤンキヤオコ

(南支方言)ト稱セラ

レ、南支ニテハ蛇チ

食スト謂ハル。此外

なベカふ黒鶴(ヘイ

クアン)アリ。

陽鳥ノ項參照。

(二) 烏帶ハ頸ノ前部

ノ黒色ノ羽毛ナラ

シ。

(二) 鶴 (別錄下品)

和名 かふのとり
學名 *Ciconia boyciana*, Swinhoe
科名 かふのとり(鶴)科

釋名

皂君(詩疏)

負釜(同)

黒尻

時珍曰く、鶴の字の篆文は形を象徵し

たもので、その背、尾の色が黒いものだから、陸機の詩疏に皂君などの諸名があるのだ。

集解

弘景曰く、鶴には兩種あつて、鵠に似て樹に集ふものを白鶴といひ、

黒色にして頸の曲るものを烏鶴といふ。今は白いものを用うべきものとなつてゐる。

宗奭曰く、鶴は、身は鶴のやうだがただ頭に丹頂がなく、(三) 烏帶がなく、それとま

た善く啖^{さひ}ばず、ただ喙で相撃つて鳴くだけのものだ。多く樓殿の屋根の端角に窠を

作つてゐるものだ。嘗て朝夕この鳥を注意して觀たが、池を作つて魚を養ふといふ

説のやうな事實は一向になかつた。

時珍曰く、鶴は鶴に似てゐるが頂が丹でなく、頸が長く、喙が赤く、色は灰白で翅、尾は俱に黒い。多く高木に巢ひ、その飛ぶ有様は、勢よく大空高く揚つて旋

(三) 鶺鴒ハ露シクスル
 ナイフ。蟲部科斗ノ
 條ニ鳴デ以テコレヲ
 鶺鴒スレバ科斗皆出ヅ
 トアルト同意義ナラ
 シ。



〔鶴〕

回し、さながら陣形をなして飛ぶ。
 天を仰いで號鳴すれば必ず雨が降
 る。卵を抱く場合は影を以てする。
 或は聲で鶺鴒するものだともい
 ふ。禽經には『鶴は三子を生み、
 その一が鶴になる。巽極つて震と
 成り、陰は陽に變ずる。震は鶴で
 ある。巽は鶴である』とある。

正誤

藏器曰く、人間が巢を探つて鶴の子を取ると、その六十里四方が旱魃
 になる。能く群り飛んで激しく雨を散らすものだ。その巢の中には泥で池を作り、
 水を含み運んでそれに湛へ、魚や蛇を飼つてその子に食はせる。鶴が卵を抱くとき
 には、ために冷えることを恐れて礬石を取つて卵を囲み、それで燥氣を助ける。

時珍曰く、寥廓たる大自然は、陰陽升降して油然として雲を作し、沛然として雨
 を下すのである。區區たる微鳥の私忿を以て、いかで天地を旱魃せしめ得る力があ

らうか。況や鶴は水鳥だ、雨を候つ方の側の動物ではないか。池を作るとか、礬石を取るとかいふ説は、ともに陸機の詩疏と張華の博物志から出たものだが、馬鹿げたことだ。

骨 氣 味

【甘し、大寒にして毒なし】藏器曰く、小毒あり。沐湯に入れて

頭を溶すれば、髪が盡く脱けて再び生えない。又、樹木を枯らす。主治 【鬼、蠱

の諸疰毒、五尸、心腹痛】(別錄)甄權曰く、單獨にこれのみを黄に炙いて研り、空心

に方寸匕を暖酒で服するもよし。時珍曰く、千金には、尸疰を治するものに鶴骨丸といふがある。

脚 骨 及 び 嘴 主 治

【喉痺、飛尸、蛇虺の咬傷、及び小兒の閃癰、大腹痞

滿には、いづれも煮汁を服し、また灰に焼いて飲で服す】(藏器)

卵 主 治

【痘毒の豫解。一箇を水で煮て小兒に啖はせれば、痘を出なくし、

或は出てもやはり稀ならしめる】(時珍) 記載は活幼全書にある。

屎 主 治

【小兒の天釣驚風の間歇不定に發るには、炒り研つて半錢に牛黄、

麝香半錢、炒つた蠟五箇を入れて末にし、半錢づつを新汲水で服す】(時珍)

(白) 木村(重)曰ク、
脚ハ暗赤色、嘴ハ黒
色、下嘴ノ下面ハ赤
色。
(五) 木村(重)曰ク、
卵ハ白色、一腹三個
乃至六個。

(二) 鵪 鷄 (食物)

和名 まなづる
學名 *Isardus grunns vici (Pallus)*
科名 つる科

(一) 白井曰ク、まなづるノ考定ハ岡田氏ノ説ニ從フ。
木村(重)曰ク、まなづるハ現今支那ニテハ玄鵪ト呼び、鵪鷄ハ死語ニ屬セリ。

(二) 關西ハ兩谷關以西、即チ今ノ陝西、甘肅二省ノ地ヲ指ス。
(三) 江ハ江蘇地方。

釋名

鵪鵪(爾雅) 麋鵪(爾雅) 鵪鵪(爾雅翼) 麥鵪 時珍曰く、按ずるに、羅願は「鵪^{さう}、麋^びはその色が蒼くして麋のやうだからだ。鵪鵪とはその聲をいつたのだ。」關西では鵪鵪^{こつぐく}と呼び、山東では鵪鵪と呼ぶを訛^{なま}つて錯落といふ。南方では鵪鷄と呼び、(三) 江地方では麥鵪と呼ぶ』とある。

集解

鵪曰く、鵪鷄は、形狀は鵪ほどの大いさで、頂に丹がなく、兩頬が紅



〔鵪 鷄〕
——鵪 鷄——

時珍曰く、鵪は水鳥であつて、田澤、洲渚の間に餌^{あさ}を漁る。大いさは鵪ほどのもので青蒼色だが、また灰色のものもあり、頸が長く、脚が高く、群り飛ぶを見て霜の降ることを豫知し得る。或は、これは古代に鵪鵪^{しやくくまう}といつたそのもので、その皮は

裘きうに作り得るものだといふ。鳳と同名だ。

附 録

鵲せう 時珍曰く、按ずるに、羅願の爾雅翼に『鵲鵲は水鳥である。』

雁の屬であつて、雁に似て頸長くして綠色だ。皮は裘に作り得る。霜の時には暖い土地に來るものだ』とある。故に禽經には『鵲飛べば霜ふり、鵲飛べば雨ふる。鵲、即ち商羊のことだ』とある。又、西方にゐる鳳にも鵲鵲なる名がある。

肉 氣 味

【甘し、溫にして毒なし】

主 治

【蟲を殺し、蠱毒を解す】（注類）

發 明

時珍曰く、鵲は古代には多く食つたものだ。故に宋玉の小招に『鵲の酸、毛鵲せうに鳥、煎には鴻鵲』とあり、景差の大招には『炙鵲しやうせう、蒸鳥じやうじやう、粘鵲せんじやうを陳ちん』とある。今ではただ田舎者が捕へて食ふ位のもので、改まつた料理には一向用ゐない。

陽 鳥 （拾 遺）

和名 なべかふ
學名 *Mimopelargus niger* (Trine)
科名 かふのとり（鵲）科

釋 名

陽鵲（拾遺）

(日) 木村(重)曰ク、鵲せう未詳。雁ノ異名ナリト一書ニアリ、後攻チ俟ヅ。岡田信利曰ク、藟山先生ハあまつばめニ充テラレタリ、後攻チ俟ヅ。
(丑) 鵲ハ雁ノ汁少キモノ。雁ハ肉ダケノ羹ナリ。
(六) 煎トハ煎蒸シタル料理ナリ。
(七) 炙ハ焼キ肉。
(八) 蒸、本書ニハ蒸トアリ。
(九) 粘ハ淪ナリ。ユデ沈マスナリ。
(一〇) 陳、本書ニハ陳トアリ。
(一) 木村(重)曰ク、陽鳥ハ體ノ前半ハ黒色ニシテ種ノ光澤アリ、胸以下ハ純白色ナリ、歐洲南部ヨ

リ蒙古、支那、日本等ニ分布シ、冬期ハ亞弗利加、印度ニ至ル。但シ日本ニテハ現在殆ンド見ラレズ
 黑鵒（ヘヘグアン）（全支）陽鳥（ヤンウー）（北平）ト稱ス。
 （二）建州ハ唐ニ置ク今ノ福建省建甌縣ソノ舊治ナリ。
 （三）木村（重）曰ク、嘴ハ紅赤色。

（一）木村（重）曰ク、鵒ハ體鼠色、頭ノ後方ニ灰褐色ノ三角形ノ斑紋アリ、頭上、眼先ハ皮膚裸出シ、粗ニ剛毛アリ、東部四比利亞、蒙古、支那、海南ニ分布ス、朝鮮ニ多シ。
 江蘇省江陰ノ動物園ニ一羽アリ（昭和五年春）南支ニハ稀ナ



（一）鵒 鵒（食物）

釋名

扶老（古今注） 鵒鵒

俗に鵒鵒と書く、時珍曰く、すべて鳥は秋にな

ると毛が脱けて禿げるものだが、この鳥は頭が禿げてゐて、秋に毳するやうでもあり、又、老人の頭童のやうでもあり、また扶杖のやうな状態でもあるところからかかる諸種の名稱が生じたのだ。説文には『禿鵒』としてある。

集解

藏器曰く、陽鳥は建州に出

陽鳥 長くして白い。

嘴 主治

『灰に焼いて酒で服す

鳥鵒

れば、惡蟲に咬まれて成つた瘡を治す』（藏

器）

和名 くろづる、一名れずみづる。
 學名 *Merula orientalis* (Shumpei)
 科名 つる（鵒）科

集解

時珍曰く、禿鶯さくしやうは水鳥中での大なるもので、南方に出る。大湖沼地に

り、禿鶯トチウト呼べり。故ニ此種名ヲ附シテ後攷ヲ俟ツ。(鶴頂參照)

(二) 鵞ハ更生毛ヲ云フ。

(三) 頭童ハアタマノハゲタル貌。

(四) 常賦ハ一定ノ貢納品ノコトナラン。

(五) 魯トハ今ノ山東省ノ兗州ヨリ鄆、涓ニ至ル一帯ノ地ナシ

ゐるもので、その形状は鶴のやうで大きく、青色色だ。翼を張つた廣さは五六尺、頭を挙げた高さは六七尺あり、頸長く、目赤く、頭の頂には全く毛がなく、頂の皮の二寸四方ばかりが紅色で鶴の頂のやうだ。その喙は深黃色で扁く直く、長さ一尺餘あり、食物の入る喉の下には鵝鵝ていこのやうに胡袋があり、足の爪は雞のやうで黒く。その性極めて貪惡なもので、人と能く闘ひ、好んで魚、蛇、及び鳥の雛を啖ふ。詩に『鶯あり。梁にあり』とあるはこのものだ。元から入つたもので、我が明朝の常賦にもやはり鶯ちやうの供御くごを奉るといふやうなことがある。按ずるに、飲膳正要に『鶯鵞には白いもの、黒いもの、まだらなものの三種あつて、名けて胡鶯鵞といふ。その肉にもやはり差異がある』とある。又按ずるに、景煥の間談には『海鳥の鷄鵬あんきやうは即ち今の禿鶯だ』とあつて、その説は環氏の吳記に所謂『鳥の大なるは禿鶯、小なるは鷄鵞』とあると合致してゐる。現に洪水の年に鶯がともすると人里近くまで飛んで來るので、一般人が怪しみ駭くこともあるが、これはまた魯人が鷄鵬を怪んだといふ話と同じことで、いづれも平常見ないものだから怪むのだ。



【鶴】

肉

氣味

【鹹し、微寒にして毒なし】 正〇要

に曰く、甘し、温なり。

主 治

【蟲、魚の中毒】

〔注題〕【中を補し、氣を益し、甚だ人體を益する。炙つて食ふが就中美味だ。脯マにして日常の食事にすれば

氣力を強くし、奔馬に追ひつくほど走れるやうになる。〕時珍 記載は飲膳正要、及び古今注、禽經にある。

髓

氣味

【甘し、温にして毒なし】

主 治

【精、髓を補す】〔正〇要〕

喙

主 治

【魚骨哽】〔注題〕

毛

主 治

【水蟲の毒を解す】〔時珍〕

記載は埤雅にある。

〔六〕木料（重）曰ク、喙ハ基部綠色ニシテ先端黃色。
〔七〕木料（重）曰ク、毛ハ鼠色、白、灰褐色。

〔二〕木料（重）曰ク、くろへらさぎハ體白色、頭部黒ク、體ニ黄褐色ヲ混ズ、嘴屬平ニシテ杓子狀ヲ呈ス、支那南方ニ産ス、朝鮮、臺灣ニモ多少

鶯 鷯

音は鶯童（モウ トウ）である

（綱目）

和名 くろへらさぎ
學名 *Phalacrocorax minor*, Temm. et Schl.g.
科名 とさ（朱鷺）科

釋 名

越王鳥（綱目）

二 鶴頂（同）

鷯鷯（同）

集 解

時珍曰く、按ずるに、劉欣期の交州志に『鶯鷯、即ち越王鳥である。』

産ス、モントント發音ス、精シクハ後考テ俟ツ。

(二) 丹羽正伯曰ク、本草綱目並ニ潜確類書等ノ書ニ鶴頂チ鵪鶉ト同物ト考候ハ誤ニテ御座候、鵪鶉ノ形傷申候故草體仕候ト相見申候、外ノ書ヲ考候ニ鵪鶉ハ大鳥ニテ、鶴頂ハ鴨ノコトクナリト相見申候。

(三) 九眞交趾ハ草部芳草類山薑ノ註ヲ見コ。

(四) 羅山疏ハ竺法真羅浮山疏ノ略。

(五) 白井曰ク、典籍ニ鶴頂鳥形大如鴨毛黑色顴嘴亦具其顴蓋骨厚寸餘外紅色光如黃蠟嬌黃可愛堪作藥帶出南番大海中トアリ、本草啓蒙ニ之ヲホウテンニ充ツ、口ク和産ナシ異國ヨリ頭骨ノミ來ル、俗ニ是ヲ鳳頂ト云フ或ハ鳳類ニ作ル、黃色ニシテ甚ダ硬ク鵪鶉ノ如シ、一方ニ赤眼アル者アリ鰭鰭ニ造ル、今渡ルモノハ多クハ黃色ノミニシテ赤眼ナシ云云。

白井曰ク、ホウテンダマハ善ノ珠ニモ用ウルコトアリ、予ガ母曾テ之ヲ藏セリ黃色ニシテ一方ニ紅眼アリシヲ覺ユ、丹羽正伯物産日記

水鳥であつて、九眞、交趾に出る。大いさは孔雀ほど、嘴は長くして一尺餘あり、黄、白、黒色で漆のやうに光瑩だ。南方の地ではこれを飲器に作る」とある。(一) 羅



體 像

咲ふ。糞は薰陸香のやうなものだ。その山の者はこれを取つて香にする。薬用にも用ゐるものだ」とある。楊慎の丹鉛錄には『鵪鶉、即ち今の鶴頂だ』とある。

糞 主治 【水で和して雑瘡に塗る】(竺法真羅山疏)

山疏には『越王鳥は形骸は鳥、鶯のやうで足が長く、口が勾つて末が冠のやうになり、二升ほどのものを受け得るやうになつてゐる。これを酒器にすれば極めて堅緻なものだ。この鳥は地を踐まず、江、湖の水を飲まず、衆くの草を食まず、魚を食はず、ただ木葉のみを

ニ鵯頂嘴ノ圖アリ、之ヲ鷹司信輔氏ニ示シ鑑定ヲ請ヒシニ *Tringoides virens* (Forster) ナランカトノ圖示ヲ得タリ。

(一) 木村(重)曰ク、

鵯ハ體白色、背面ノ羽毛軸ハ黒ク下喉ニ黄斑アリ、歐洲ノ東南部、北部亞非利加、蒙古支那ニ分布ス。鵯鵯(デイウ(南支)ト稱ス。

(二) 沙水、東次ニ經ニ『唐其之山。無草木。多沙石。沙水出焉。南流注于澤水。其中多鵯鵯』トアリテ、註ニ音黎トアリ。畢氏ハ黎ト鵯ト聲相近シ、鵯ハ當ニ鵯ト爲スベシトイフ。

鵯鵯 (宋嘉祐)

和名 がんてう
學名 *Pelecanus crispus*, Bruch.
科名 ペリカン科

釋名

望鵯

鵯鵯

音ハ戸澤(コタケ)である。

逃河

一には洵と書く。洵鵯

禹錫曰く、昔、肉を竊ねすんだある者が河に入つてこの鳥に化したので、今でも肉を有

つてゐる。それで逃河と名けたのだといふ。

ふ。

鵯鵯

時珍曰く、これは俗間の語り草だ。按

ずるに、山海經に『沙水、鵯鵯多し。その名を自ら呼ぶ』とある。それが後世

轉訛して鵯鵯となつたのだ。又、吳諺に、

『夏至前に來るものを鵯鵯と呼び、水を

主るといふ。夏至後に來るものを鵯塗と呼び、旱を主るといふ』とある。陸機が



鵯鵯

—河

主るといふ。夏至後に來るものを鵯塗と呼び、旱を主るといふ』とある。陸機が

胡ハ皮袋サ云フ。

『水澤へ行くと、胡を以て水を屏み^く瀾^{らん}して魚を取つて食ふ』といつたところから、鵜^うと叫び、洵河^{しんが}といひ、俗に洵鵜^{しんが}といふ、形を形容した名稱であつて、又、訛つて駝鵜^{だう}ともいふ。

集解

禹錫^う曰く、鵜鵜は大きい蒼鵞^{そうが}ほどで、頤^{みか}下に二升ほどの物を容れ得る皮袋があり、それが展^つび縮みが自由で、中に水を盛つて魚を養つて置く。身は全部水沫だといふが、しかし胸前に二箇の肉塊があつて、列つて拳のやうになつてゐる。詩に『惟れ鵜梁^うに在り、其の味^{あじ}を濡^ぬさず』とあるが、味とは喙^{くちばし}のことで、嘴^{くちばし}を大切にするものだといふ意味だ。

時珍^し曰く、鵜鵜は處處にゐる水鳥で、鶚^{おさく}に似て甚だ大きく、灰色だ。蒼鵞^{そうが}のやうで喙^{くちばし}が長さ一尺餘あり、眞直で且つ廣く、口中は正赤色で、頤^{みか}下の胡の大きいさが數升入れる囊^{ふくろ}ほどある。好んで群り飛び、水に沈んで魚を食ひ、また能く少^{ちう}かの水をば屏み瀾^{らん}らして魚を取る。地方人はその肉を食ひ、その脂を取つて薬に入れる。その翅骨^{かいつこ}で作つた筒は喉鼻薬を吹くに甚だ妙だ。水を囊^{ふくろ}に盛つて魚を養ふとか、身は全部水沫だとかいふ説は蓋し妄談だ。

〔目〕 嚙ハ食物ヲ貯フル食道ノ一部、胡ニ同シ。

〔注〕 水質(重)白ク、嘴ハ蒼灰色。

○又按ずるに、晁以道は『鵜の屬に漫畫といふものがある。嘴で水を畫いて魚を漁^{あさ}るのだが、一息も停まらずに行動するものだ。また信天縁といふがある。これは終日凝立してその場所を易へず、魚がその前を通り過ぎるまで俟つてゐてそれを取る。所謂天縁に信^{まか}せるといふわけだ。俗に青翰と名けるそのものである。また青莊とも名ける。この二鳥は貪慾な人物と、清廉な人物とに喩^{たと}へる』とある。

脂油

時珍曰く、剥いで取つた脂を熬り溶して掠め取る。それをその鳥の〔目〕嚙に盛れば滲み漏らないが、他の物に盛れば透り走つて了ふ。

〔氣味〕

〔鹹し、溫、

滑にして毒なし〕

〔主治〕

〔癰腫に塗り、風痺を治し、經絡に透り、耳聾を通ず

る〕〔時珍〕

〔發明〕

時珍曰く、淘鷺油は性走つて能く諸藥を導き、或は患部に透つて毒を抜くものだから、能く聾、痺、腫毒の諸病を治す。

〔附方〕

新一。

〔耳聾〕

淘鷺油半匙、礞石一小豆ほど、麝香少量を和勻し、綿

で裹んで挺子にして耳を塞ぎ、口に生鐵少量を含む。三五回用ゐれば效がある。(青蘘)

〔氣味〕

〔鹹し、平にして毒なし〕〔赤白久痢で疳となつたるに主效があ

る。焼いて性を存して研末し、水で一方寸匕を服す」〔嘉祐〕

舌 主治 【疔瘡】時珍

毛皮 主治 【反胃吐食。焼いて性を存し、二錢づつを酒で服す】時珍 記載

は普濟にある。

鶩 (別錄上品) 和名 がてう

英名 Goose
學名 *Anas domestica*, Linn.
科名 がんあふ(雁鴨)科

釋名 家雁(綱目) 舒雁 時珍曰く、鶩は自ら呼ぶやうな鳴聲を出すものだ。

江東地方でこれを舒雁じよがんといふは、雁に似て舒遅たるものだからだ。

集解 時珍曰く、江淮以南で多くこれを畜ふ。蒼、白の二色があり、また

大きくして胡袋を垂れたものもあつて、いづれも眼が綠色、喙が黄色で掌が紅く、

善く闘ふ。その夜中に鳴くは時刻に應ずるものだ。師曠の禽經には『脚の蹠すねに近

きものは。能く歩む。鶩、鶩びくがそれだ』とある。又『鶩が卵を伏おほふには月に逆さかふ』

とある。これは卵を抱くときは月に向ひ、月の氣を取つて卵を助けるといふ意味で

(一) 木村(重)曰ク、

鶩ハ白色ノモノ多シ
家禽化サレタル雁ナ
リ、日本ノ本草書ニ
云フ唐雁ナリ。

鶩(ウオ(北支)ゴリ
(南支)ト稱ス。

(二) 江淮ハ水部雨水
ノ註ヲ見ヨ。

(三) 鶩ハ尾肉ヲ云フ。

(鳥) 唇藩ハ口吻着ノ
別名、俗ニカラスノ
キヲト云フモノ。



〔鴨〕

ある。性能く蛇、及び蚓を啖ひ、射工を制す。
故にこれを飼養すれば能く蟲虺ちゆうきを辟ける。或
は鶩は性來生蟲を食はぬものだともいふが、
さうではない。

白鶩膏

臘月に鍊つて取收める。

氣味

【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【耳に

灌げば卒聾を治す】(別錄)

【皮膚を潤ほす。顔

の化粧料に合せるがよし】(日華) 【顔に塗れば

の化粧料に合せるがよし】(日華) 【顔に塗れば

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

日華曰く、白鶩は辛し、涼にして毒な

し。蒼鶩は冷にして毒あり、瘡腫を發す。洗う曰く、鶩肉は性冷なり。多食すれば霍
亂せしめ、痢疾を發す。李廷飛曰く、嫩わかい鶩は毒である。老いたる鶩は良である。

主治

【五臟を利す】(別錄)

【五臟の熱を解す。丹石を服する人に宜し】(孟詵)

【煮汁は消渴を止める】(藏器)

發明

藏器曰く、蒼鶯は蟲を食ふ、射工の毒に主として良し。白鶯は蟲を食はない、渴を止めるに勝れてゐる。

時珍曰く、鶯は氣、味俱に厚い。風を發し、瘡を發することこれより甚しきものはない。火で熏じたものは就中毒であつて、曾てその害の事實を口撃した。しかるに本草には、その性を涼なりとし、五臓を利すといひ、韓愈の醫通に、この物は風を疏すといつてあるが、さういふ筈はないと思ふ。又、葛洪の肘後方に『人家に白鶯、白鴨を養へば射工に食はるるを辟くべし』とある。して見ると、所謂白鶯は蟲を食はぬ、病を發せぬの説も正しくはない。但し蒼鶯に比すればその力が薄いといふだけである。渴を止めるといふことだが、凡そ胃氣を發するものは皆よく津を生ずるものだ。ただ渴を止めるだけのものと解釋すべきものではない。そこで性涼なり、平なりといふけれども、參苓白朮散は渴を治する要藥だが、しかし全然寒でも涼でもないではないか。

騮 一名尾騮。尾肉である。時珍曰く、内則では舒雁の騮は食へぬとなつてゐる。厭ふべき臊氣があるからだ。しかし俗間の賤い者はこれを嗜んで食ふ。

主治

【手足の皸裂に塗る。耳中に納れば、聾、及び聾耳を治す】（日華）

血 氣味

【鹹し、平にして微毒あり】

主治

【射工の中毒には、これを

飲み、并にその身に塗る】（陶弘景）【藥毒を解す】時珍曰く、祈禱家で多くこれを用ゐる。

膽 氣味

【苦し、寒にして毒なし】

主治

【熱毒を解す。また痔瘡の初

期には頻りにこれを塗抹すれば自ら消する】（時珍）

附方

新二。

【痔瘡の核あるもの】

白鶯膽二三箇から汁を取り、

熊膽二分、片

腦半分を入れて研勻し、氣の泄れぬやうに澆器に入れて密封し、使用するには手の指で塗る。立ろに效がある。（劉氏保壽堂方）

卵 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【中を補し、氣を益す。多食

すれば痼疾を發す】（孟詵）

涎 主治

【咽喉の穀賊】（時珍）

發明

時珍曰く、

按ずるに、洪邁の夷堅志に『小兒が誤つて稻芒を呑み、咽

喉中に粘著して出ないものを穀賊と名ける。ただ鶯涎を灌げば癒える』とある。蓋

し驚涎の殻を消かすは相制の關係だ。

毛 主 治

【射工水毒】(別錄)

【小兒の驚癇。又、灰に焼いて酒で服すれば噎

疾を治す】(蘇恭)

發 明

弘景曰く、(五)東川には溪毒が多いが、驚を養つてそれを辟ける。毛羽でも佳く、并にその血を飲む。驚は必ずしも射工を食ふものではないが、蓋しその

威力で相制するのだ。

(五) 東川トハ今ノ四川省ノ東部ヲ指ス。
(六) 邕州ハ金部自然銅ノ註ヲ見ヨ。

時珍曰く、禽經に『驚飛べは蜮沈む』とある。蜮とは射工のことだ。又、嶺南異物志には『(六)邕州の蠻地では驚腹の毳毛を選び取つて衣服や寝具にする。綿のやうに柔で暖だが性は冷である。嬰兒に尤も宜く、能く驚癇を辟ける』とあり、柳子厚の詩に『驚毛臘を禦き山(七)巔を縫ふ』とあるがそれである。蓋し毛と肉とは性が異ふのだ。

附 方

新二

【通氣散】

誤つて銅錢、及び鈎繩を呑みたるには、驚毛一錢を

灰に焼き、磁石を皂子大ほどを煨き、象牙一錢を焼いて性を存して末にし、半錢づつを新汲水で服す。(醫方妙選) 【噎食病】白驚の尾毛を灰に焼き、一錢づつを米湯で

(七) 巔ハ毛織物ヲ云フ。

(ハ) 木村(重)曰ク、
掌上黄皮ハみづかき
の膜ナリ、一般ニ水
禽ノ水カキハ支那ニ
テ料理トシテ上味ナ
リ。

(九) 眠倒ハ横ニナリ
テ居ルモノ。

(一) 木村(重)曰ク、
ひしくひハ羽ハ褐色
尾ノ先端白ク嘴ハ淡
黄色ナリ、支那本土
ニ冬期飛来ス。
鴈(シエン)(北支) 鴈
鶩(ダイゴ)(南支) ト
稱サル。日本ニ普通

服す。

(ハ) 掌上の黄皮 【主治】

て凍瘡に塗るが良し【(時珍) 記載は譚犖翁諸方にある。

尿 【主治】

【汁を絞つて服すれば小兒の鵝口瘡を治す】(時珍) 記載は秘録にあ
る。【蒼鵝の尿を蝨、蛇の咬毒に傳ける】(日華)

附方 新一。【鵝口瘡】

内部から生じて外に出るは治するが、外部から生じて
内に入るものは治せない。草を食ふ白鵝の排泄した清糞から汁を濾し取り、沙糖少
量を入れて搽る。或は雄鵝糞の(九) 眠倒するものを取つて灰に焼き、麝香少量を入れ
て搽る。いづれも效がある。(永類鈴方)

(一) 鴈 (本經上品)

和名 ひしくひ
學名 *Anser segetum scoriotristis*, Swinhoe
科名 おんあふ(雁鴨)科

釋名

鴻 時珍曰く、按ずるに、禽經に『鴈とは水(かん)を以て言ふ。三南よりし
て北す。鴈とは山を以て言ふ、(一) 北よりして南す』とあり、張華の註に『鴈、鴈、い

ノきがん〔Anser anser〕モ亦産シ、鴈鴈ト稱セラル。

(二) 原書ニ北ヨリ南ストアリ。

(三) 原書ニ南ヨリ北ストアリ。

(四) 正字通ニ婆ヲ婆ニ作ル。

(五) 雁門ハ石部代赭石ノ註ヲ見ヨ。

づれも音は鴈である。冬になれば南に適^おいて水干に集る、故にその文字は干に従ふ。春になれば北に嚮^{むか}つて山岸に集る、故にその文字は岸に従ふ。小なるを鴈といひ、大なるを鴻^{こう}といふ。鴻とは大の意味だ。多く江渚に集るから文字は江に従ふ」とある。梵書にはこれを僧^{そう}婆^ばといつてある。

集解

別錄に曰く、鴈は江南の池澤に生ずる。取るに一定の時期はない。

弘景曰く、詩疏に『大なるを鴻といひ、小なるを鴈といふ』とあつて、現に鴈類にはやはり大小はあるが、いづれも同一形状のものだ。また野鵞と呼び、鴈より大きいものがある、人家で養ふ蒼鵞に似たものをば鵞^が鵞^がといふ。鴈は江湖の地に棲むもので、夏は産卵期なので皆北に往く。これは恐らく雁門以北の地ではこれを食はないからであらう。採るに一定の時期はないが、冬期に採つたものが好い。

恭曰く、鴈は陽鳥である。燕と反對に往來するもので、冬には南に翔^かり、夏には北に徂^ゆつて北方で子を孵^ふすものだ。北方人はこれを食はないからなどといふことはなす。

宗奭曰く、鴈は熱いときは北に往き、寒いときは南に來る。かくて和氣を選んで棲

(六) 禮幣ハ贈答品。

(七) 稻若水曰ク、雁上白字ヲ加フベシ。

(八) 衡陽、三國吳ニ縣ヲ置ク、今ノ湖南省衡山縣ノ東北ニ故城アリ。今ノ衡山縣ハ湖南省衡陽治ナリ。

むものだ。(六) 禮幣にこれを用ゐる意味は、一はその違はざる信を取り。一はその和を取つたものだ。

時珍曰く、鴈は、その形狀は鶩に似て、やはり蒼白の二色がある。今は一般に白く



〔鴈〕

して小なるものを(七) 鴈とし、大なるものを鴻とし、蒼いものを野鶩とし、また鶩かがともいふ。

これは爾雅に鵠りくあうとあるそのものだ。鴈に四徳あつて、寒くなれば北から南に来て、(八) 衡陽までに止まり、熱ければ南から北へ往つて鴈門に歸る、これは信で

ある。飛ぶには行列の順序があつて、前方のものが鳴き後方のものがそれに和する、これは禮である。配偶者を失へば再び他と配偶せぬ、これは節である。夜には羣り宿してその内の一羽が巡警し、晝は蘆をぐ啣んで網を避ける、これは智である。

ところがこれを捕る者がその特長を利用し、（カ）紈を畜つて置いてその同類を誘き寄せ
る。それは愚なる一點だ。南へ向つて來るときは瘦せてゐて食へないが、北に向つ
て往くときは肥えてゐるから取るに適當の時期だ。又、漢書、唐書にはいづれも五
色の鴈なる記載がある。

鴈肪

正誤

【一名鴈肪】

弘景曰く、鴈とは野鴨のことだ。本經に『鴈肪、

亦た鴈肪と名く』とあるが、これは鴈と鴈と相類似してゐるので誤つたのだ。

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【風癰拘急、偏枯血氣、通利せぬ

もの。久しく服すれば氣を益し、飢えず、身を輕くし、老に耐へる】（本經） ○心鏡

に曰く、上記の證には、肪四兩を鍊淨し、毎日空心に一匙づつを暖酒で服す。【毛、

髮、鬚、眉を長くする】（別錄） 洗曰く、生髮膏に合せて用ゐる【諸石藥の毒を殺す】（吳普）

【耳聾を治す。

豆黃と和して丸にして用ゐれば、勞を補し、肥えたるを瘦せ

しめ、人體を白くする】（日華） 【癰腫、耳瘡に塗る。又、結熱胸痞の嘔吐を治す】時

珍曰く、外臺にこの證を治する鴈肪湯といふがある。

附方

新二。

【生髮】鴈肪を日毎に塗る。（千金方）

九 大觀ニ食字下ニ
其肉ノ二字アリ。

二〇 金匱本ニ北サ此
ニ作ル。

肉 氣味 「甘し、平にして毒なし」 思邈曰く、七月には鴈を食つてはなら

ぬ、人の精神を傷めるものだ。禮に『鴈を食ふには腎を去る。人に利あらず』とあ

る。主 治 「風麻痺。久しく食すれば氣を動じ、筋骨を壯にする」〔日華〕 臟腑

を利し、丹石の毒を解す〔時珍〕

發 明 弘景曰く、鴈肪は一般に多く、食はないが、その肉はやはり好いもの

らしい。宗奭曰く、一般に鴈を食はぬが、それはその物が陰陽の升降、少長の行序

を知るものだから、それで食はぬといふのであらう。道家ではこれを天が厭ふとい

ふ。これも一説だが、食へば諸風を治するものだ。

骨 主 治 「灰に焼き、米泔に和して頭を沐すれば髪を長くする」〔孟詵〕

毛 主 治 「喉下の白毛は小兒の癰を療するに有效だ」〔蘇恭〕 「自ら落ちた鬚

毛を小兒が佩びると驚癰を辟ける」〔日華〕

發 明 時珍曰く、按ずるに、酉陽雜俎に『臨邑地方では春、夏に網で鴻、鴈

を取り、その毛で暑氣を禦く』とあり、又、淮南萬畢術には『鴻毛で囊を作れば以

て江に渡る可し』とある。やはり一箇の壺を持つて流に入るやうなものだ。

水を渡る者には心得て置くべきことである。

屎白 主治 【灸瘡腫痛には、人精で和して塗る】〔梅師〕

(一) 鵠 (食物)

和名 おほはくてう(大白鳥)
學名 *Gymna cygnus Linne*
科名 がんあふ(雁鵠)科

釋名

天鷲 時珍曰く、按ずるに、師曠の禽經に「鵠はその鳴聲が喈喈たる

ものだから鵠といふ」とある。吳僧贊寧は「凡そ物の大なるをばみな天を以て名とする。天とは大なるものの意味だ」といつた。して見ると天鷲なる名稱も蓋しこの意味からであらう。羅氏は「鵠、即ち鶴なり」といつたが、やはりさうではない。

集解

時珍曰く、鵠は鴈より大きく、羽毛が白くして澤がある。翔れば極めて高く揚り、善く長途を行く。所謂「鵠は浴せずして白く、一舉にして千里」とはそのことだ。また黃鵠といふもあり、丹鵠といふもあつて、三湖、海、江、漢の間にいづれもある。遼東に産するものは就中甚しく海青鵠を畏れる。その皮毛は天鷲絨といふ服飾になる。按ずるに、飲膳正要には「天鷲には四種の品等があつて、大

(一) 木村(重)曰く、おほはくてうハ全身純白色、嘴基部ハ黃色ナルモ他ハ黑色ナリ、歐洲、亞細亞ノ北部ニ分布シ、冬期ニ地中海、支那ニ渡來ス、青森縣小湊海岸ニテハ年毎數百羽越冬ノ爲ニ飛來ス、支那ニテモ珍鳥トシテ想吃天鵠肉ノ言アリ。

鵠(ク) 天鵠(テイシニエ(北支)テンオ(南支))ト稱ス、別ニハクテウ「Gymna cygnus (Linnaeus) Alpher」ナリ。

(二) 湖海ハ洞庭、鄱陽等ノ大湖、及ビ海洋。江漢ハ揚子江、

漢江ヲ指ス。

(三)花斑ハ羽毛ニ斑紋アルヲ云フ。



〔鵞〕

—天—
—驚—

金頭鵞といふは鴈に似て項が長い。食料としての上級品で鴈よりも美味だ。小金頭鵞といふは形がやや小さい。花鵞といふはその色が(三)花斑になつてゐる。一種は不能鳴鵞で、飛ぶと翔ける響がある。その鵞の肉は微し腥(すこしなまじい)い。いづれも大金頭鵞に及ばぬものだ。それぞれ特産地がある』とある。

肉 氣味 【甘し、平にして毒なし】

主治 【醃(つけ)、炙(い)つて食へば人の氣力を益

。穎曰く、冷なり。忽氏曰く、熱なり。し、臟腑を利す】(時珍)

油 冬期に肪を取つて鍊(な)つて取收める。氣味 缺 主治 【癰腫に塗り、

小兒の疳耳を治す】(時珍)

附方 新二。 【疳耳で膿の出るもの】天鵞油で草烏末を調へ、龍腦少量を入

れて和して傅ける。立るに效がある。無いときは鴈油を以て代用する。(通玄論)

絨毛

主治

【刀杖金瘡に貼れば立ろに癒える】(注類)

(一) 鴝

音は保(ホ)である。

(綱目)

和名 のがん
學名 Otis tarda (Gyrfalke, Tazemowl.)
科名 のがん(野雁)科

釋名

獨豹

時珍曰く、

按ずるに、羅願は「鴝は豹の文があるから獨豹と名

(一) 木村(重)曰ク、
まがんに似テ斑紋豹
ノ如シ、北支那ニ多
ク分布ス、呼稱ハイ
ヅレモ鳴音ヨリ來ル
モノナリ。鴝(バア
オ(北支) 又ハバ
(南支) 鵠(ブー(北
支) 獨豹(トウバチ)
青翰ノ稱アリ。

けたので、それを鴝と訛つたのだ』といひ、陸佃は「鴝は性羣居し、鴈のやうに行
列を爲る。故にその文字は牟に従つたので、牟は音は保(ホ)である。相次ぐの意味

だ』といった。詩に「鴝行」とあるは
この鳥のことだ。

集解

時珍曰く、

鴝は水鳥であ

つて、雁に似て斑文があり、後趾がな
い。性木に止まらぬもので、その飛ぶ

状態は肅肅たるものだ。物を食ふには
嚙み返して食ふ。肥腴にして脂多く、



〔鴝〕

——翰 青——

二 閩ハ今ノ福建省
地方ヲ指ス、

肉は粗く、味が美味だ。三 閩地方の俚語に『鴛には舌がなく、兎には脾がない』といひ、或は、雌ばかりで雄がなく、他の鳥と交尾するともいひ、或は、鴛は鷺鳥を見る^みと糞で射かける。すると鷺は自ら毛が脱けるものだともいふ。

肉 氣味 【甘し、平にして毒なし】 時珍曰く、禮記に『鴛奥を食はず』と

ある。奥とは臍^{ひし}脰のこと、深奥なる部分である。主治 【虚せる人を補益し、

風痺氣を去る】(正要)

肪 主治 【毛髪を長くし、肌膚を澤^{つや}やかにする。癰腫に塗る】(時珍)

二 鷺

音は木(ホク)である。

(別錄上品)

和名 あひる

英名 Duck

學名 Anas boschas domestica, Linne.

科名 がんあふ科

二 木村(重)曰ク、
あひるハかもノ家禽
化サレタルモノ、鴨
(アー)家鴨(チャア
ー)鴨子(アーツ)ト
稱サル。

釋名

鴨 説文)

舒鳧(爾雅)

家鳧 綱目)

鵝鴨 音は末匹(マツヒツ)である。

時珍曰く、鷺は通じて木とも鷺とも書く。性が質木で何等他意ないものだ。故に庶人は以て贅とすといひ、曲禮に『庶人匹を執る』とあつて、匹とは二羽の鷺のこと、で、匹夫、卑末の意味だ。故に廣雅には鷺を鵝鴨といつてある。禽經には『鷺は鳴

聲が呷呷あふあふといふ、その自ら呼ぶ聲を名としたものだ。鳬ふは能く高く飛ぶが、鴨は舒緩あやふして飛べないものだから舒鳬あふといふ』とある。

正誤

弘景曰く、鳬あふ、即ち鴨であつて、家鴨と野鴨とある。

藏器曰く、尸子に『野鴨を鳬あふといひ、家鴨を鵞あひといふ』とある。飛翔ひじやうし得ない有様は庶人が耕稼を守るやうなものだ。


保昇曰く、爾雅に『三野鳬は鵞なり』とあるが、しかし本草に鵞肪ほくほうとあるは家鴨のことだ。

宗奭曰く、この數説に據ると、鳬と鵞とはいづれも鴨であつて、王勃の滕王閣序に『落霞と孤鵞と齊ひとしく飛ぶ』とあるに見れば、鵞の野鴨なることは明である。勃は名だたる學者だから必ず根據あつていつたものに相違あるまい。

時珍曰く、以上四氏の説では藏器の説が正しい。陶氏は鳬と鵞との名稱を混同し、寇氏は鵞を野鴨とし、韓氏は爾雅を引いて錯あやまつて舒鳬を野鳬としたが、いづれも誤つてゐる。此にその誤を正して置かう。蓋し鵞に舒鳬なる名稱があつて鳬に野鵞なる名稱があるところから、王勃がそれを通用したのだ。それは差さ間まないのであつて、

(二)時珍曰ク、野ハ
舒ノ誤。

その意味も自ら明瞭である。按ずるに、周禮に『庶人鶩を執る』とある、いかで野鴨であるわけがあらうか。國風に『鳬と鴈とを弋す』とある、いかで家鴨であるわけがあらうか。屈原の離騷に『寧ろ麒麟と



〔 鶩 〕

鴨

輓を抗せん乎、將た雞鶩と食を爭はん乎。寧ろ昂昂として千里の駒の若くならん乎。將た汎汎として水中の鳬の若くならん乎』とある。かく鳬と鶩とが對照して言はれてあつて見れば、家と野との別は益々自から明瞭だ。

集解

時珍曰く、按ずるに、格物論

に『鴨は、雄は頭が綠色で翅に文があり、雌は黃斑があつて色はただ純黒と純白とのみである。又、白くして骨の黒いものがある。これは藥とし食物として更に佳いものだ。鴨はみな雄は瘡腫で雌が鳴く。重陽、即ち九月九日以後には肥えて美味だ。清明、即ち三月三日以後に卵を生む。それで内陷して肉が充滿してゐない。卵を抱

き伏してゐて、石臼を挽くやうな聲の聞えるときはく嘔して成らぬときである。雌に抱かせずしてかへ解すには牛屎で圍つて産み出さす。これはいづれも物理の不可思議だ』とある。

鵞肪

白鴨のものが良し。鍊過して用ゐる。

氣味

【甘し、大寒にして毒な

し】思邈曰く、甘し、平なり。

主治

【風虛寒熱、水腫】（別錄）

附方

新二。

【瘰癧の汁の出るもの】汁が出て止まぬには、鴨脂あふしで半夏末を調

へて傳ける。（永類方）

肉 氣味

【甘し、冷にして微毒あり】

弘景曰く、黃雌鴨は補するに最も勝

れたものだ。説曰く、白鴨肉が最も良し。黑鴨肉は有毒で、中を滑し、冷を發し、脚氣を利す。目の白いものは食つてはならぬ、人を殺すものだ。瑞曰く、腸風下血の人は食つてはならぬ。時珍曰く、嫩いものには毒がある。老いたるものが良し。尾びすゐ臊を食つてはならぬと禮記に記載がある。昔、ある者が鴨肉を食つて癥となつたとき、秣米じまつべいを用ゐて治療すると癒えたといふ。その例は秣米の條に掲げてある。

主治

【虚を補し、客熱を除き、臟腑、及び水道を和し、小兒の驚癇を療ず】

〔別錄〕【丹毒を解し、熱痢を止める】〔日華〕【頭に生じた瘡腫には、葱、豉と和して

煮て汁を飲む。卒然の煩熱を去る】〔孟詵〕 いづれも白鴨を用ゐる。

發明

劉完素曰く、驚の水を利するは、其氣が相感じて使となるからである。

時珍曰く、鴨は水禽であつて、水を治す。小便を利するには青頭の雄鴨を用ゐるが宜い、それは水木生發の關係を利用するのである。虚勞、熱毒を治するには烏骨の白鴨を用ゐるが宜い、それは金水寒肅の關係を利用するのである。

附方

舊三、新一。【白鳳膏】葛可久は『久虚發熱、咳嗽、吐痰、咳血、火が金

位に乗ずるものを治するに、黒嘴白鴨一羽を用ゐ、先づ血を取つて溫酒を入れ、適量に飲む。これは直ちに肺の經に入つて潤補せしめるのである。かくて鴨をば毛を乾して持み取り、脇下に竅を開けて腸を去つて拭ひ淨め、大棗肉二升、參苓平胃散末一升を入れて縛定し、一箇の沙甕中にそれを入れて炭火で慢に煨き、一瓶の陳い酒を三回に入れ、酒が乾くを度として取り出し、その鴨、及び棗を食ふ。頻りに試みて療效を取る』といつた。〔十藥神書〕【大腹水病】小便の短少なるには、百一方では青頭の雄鴨を煮て汁を飲み、寢具を厚く被て汗を取る。○心鏡では、十種の水病

(三) 大鵬ニ鼓半升ナ
鎗飯半升ニ作ル。

の死に垂^{なんたん}たるを治す。青頭鴨一羽を普通のやうに庖丁を入れ、切つて米、并に五味を和して粥に煮て食ふ。○又ある方では、白鴨一羽を淨治し、^(三) 鼓半升と薑、椒とを鴨の腹中に入れて縫合し、蒸熟して食ふ。

頭 雄鴨のものが良し。

主 治

【煮て服すれば水腫を治し、小便を通利する】

恭曰く、古方に鴨頭丸といふのがある。

附 方

新。

【鴨頭丸】

陽水暴腫で顔面赤く、煩燥し、喘^{ぜんきふ}急し、小便の澀るを

治し、その效神の如きものだ。これは裴河東の方である。甘草^{かんていれき}麝を炒つて二兩を熬膏し、漢防已末二兩、綠頭鴨の血と頭全部を共に三千杵搗いて梧子大の丸にし、一日三回、七十丸づつを木通湯で服す。一には猪苓^{ちよりやう}一兩を加へる。(外臺祕要)

腦 主 治

【凍瘡にはこれを取つて塗るが良し】(時珍)

血 白鴨のものが良し。

氣 味

【鹹し、冷にして毒なし】

主 治

【諸毒を

解す】(別錄) 【熱して飲めば野葛の毒を解す。已に死せるものも咽に入れば活^いさる】

(孟詵)

【熱血は生金、生銀、丹石、砒霜^{ひさう}の諸中毒、射工の毒を解す。又、中惡を治

す。また溺死者にはこれを灌げば活さる。蚯蚓^{きういん}の咬瘡はこれを塗れば癒える】(時珍)

(母) 木村(重)曰ク、
舌ハミヅカキト共ニ
上味ノ料理トサル。
(五) 往後ハ後方ニ返
張スルコト。

附方

新三。

【中惡の卒死】或は先づ病むで痛み、或は就寢中突然絶命せるには、いづれも雄鴨を取り、死人の口に向けてその頭を斷つて口中に血を瀝し込み、外に竹筒でその肛門に吹き込む。これを十分に試みれば人氣を通じ易くして活きる。(肘後) 【あらゆる蠱毒を解す】白鴨血を熱飲する。(廣記) 【小兒の白痢】魚凍に似たものを痢下するには、白鴨を殺してその血を取り、滾つた酒に泡けて服すれば止まる。(摘玄方)

舌 主治

【痔瘡に蟲を殺す。相制する力を利用するのだ】(時珍)

涎 主治

【小兒の瘡風で頭、及び四肢みな(五) 往後するには、鴨涎を滴す。

又、蚯蚓に吹かれた小兒の陰腫を治するには、雄鴨から取つて抹すれば消く】(時珍) 記載は海上にある。

膽 氣 味

【苦く辛し、寒にして毒なし】

主治

【痔核に塗るが良し。又、

赤目の初期に點けるも效がある】(時珍)

肺衣

即ち臍脰の内皮である。

主治

【諸骨硬には、一錢を水に研つて服すれ

ば癒える。その消導の作用を取るのである】(時珍)

卵 氣味

【甘く鹹し、微寒にして毒なし】

詵曰く、多食すれば冷氣を發し、

呼吸短くして背悶せしめる。小兒が多食すれば脚軟となる。鹽で貯藏して食ふが人體に宜し。士良曰く、瘡毒を生じた人がこれを食べれば惡肉を突出せしめる。弘景曰く、鼈肉、李子と食合せてはならぬ、人體を害ふものだ。樵と食合せれば産兒が順でなくなる。主治 【心腹、胸膈の熱】（日華）

發明

時珍曰く、現に世間で鴨子を鹽藏し、その方法もさまざまだが、俗間の話に、小兒の泄痢に鹹卵を炙つて食へば、やはり間ま癒えるものもあるといふ。蓋し鴨肉は能く痢を治し、炒鹽も血痢を治す、その關係に因るものだ。

白鴨通

即ち鴨屎である。馬通の場合の通と同意義だ。

氣味

【冷にして毒

なし】

主治

【石藥の毒を殺し、結縛を解し、畜熱を散す】（別錄）

【熱毒、毒痢

を治す。又、雞子白と和して熱瘡腫毒に塗れば消く。蚯蚓咬に塗つても效がある】

（孟詵）

【汁を絞つて服すれば、金、銀、銅、鐵の毒を解す】（時珍）

附方

舊一、新二。

【石藥の過劑】

（はくあふ）

白鴨屎を末にし、二錢を水で服すれば效が

ある。（百一方）

【乳石の發動】煩熱するには、白鴨通一合を湯一盞に漬け、澄清して

冷飲する。(聖惠方) 【熱瘡腫痛】 忍び難きには、家鴨糞を雞子白と共に調へて傅ければ消く。(聖惠)

(二) 鳧 (食療)

和名 かるがも(又ハナツガモ)
 學名 *Tollonetta pectorifrons* Zonotrichia (Swinhoe)
 科名 がんあふ(雁鴨)科

釋明

野鴨 詩疏 野鷺 同上 鵞

音は施(シ)である。沈鳧 時珍曰く、鳧は凡

て高く飛ぶ貌であつて、鳧とはその意味を取

つた文字である。爾雅に『鵞は沈鳧なり』と

あるは、鳧の性は好んで没するものだからである。俗に晨鳧と書くは、鳧は常に晨に飛ぶからだといふ。これでも意味は通じる。

集解

時珍曰く、鳧は東南方の江、海、



【 鳧 】

野鴨 — 鴨 —

(一) 水村(重)曰ク、かるがもハ蒙古、支那、日本等東亞ニノミ分布ス。
 野鴨、ユ、エーヤー(北支)マアア(南支)ト汎稱サルルモ水鴨子(スイヤーツ)(四川)沈鳧(チエンフ)トモ云ハル。此外まがも、こがも等種類多ク總テ野鴨(Wild duck)ト稱サレ、支那ノ太湖江河ニ大集團ヲナシテ其數何千タルヲ知ラズ。

湖泊中にいづれもゐる。數百羽群をなして、朝や夜に天を蔽ふて飛び、その聲は風雨が來たやうに聞え、稻や梁を忽ちに食ひ盡すものだ。陸機の詩疏に『形狀は鴨に似て小さく、雜青白色で背上に文があり、喙短く、尾長く、脚卑く、掌紅く、水鳥としての謹愿きんげんなるもので、肥えて寒に耐へる』とある。或は『食用には綠頭のものを上とし、尾の尖つたものがこれに次ぐ』といふ。海中の一種の冠鳥といふは頭上に冠がある。これは石首魚の變化したもので、いづれも冬期に取るべきものだ。

肉 氣味

【甘し、涼にして毒なし】 説曰く、九月以後、立春以前には、食物として病人に益すること全く人家で飼つたものに勝る。寒ではあるが氣を動じない。日華曰く、胡桃、木耳、豆豉と食合せてはならぬ。

主治

【中を補し、氣を益し、胃を平にし、食物を消化し、十二種の蟲を除く。諸種の小熱瘡があつて年久しく癒えぬには、ただ多く食へば癒える】（孟詵）【熱毒風、及び惡瘡癰を治し、腹臟一切の蟲を殺し、水腫を治す】（日華）

血 主治

【挑生蠱毒を解するには熱飲して探吐する】（時珍） 記載は摘玄にある。

(一) 木村(重)曰ク、
 しなかつぶりハ主
 トシテ湖沼ニ棲息ス
 ルモノ、海上ニ出ヅ
 ルコトアリ、水中ノ
 潛行巧ニシテ所謂浮
 集ヲ作ル、かいつぶ
 リト稱セラルルモノ
 支那ニ五屬アリ、今
 代表者ヲ取ル、一般
 ニ水鳥(シユキニヨ
 ウ)ノ名ニテ知ラル。

鵞 鵞

音は豊梯(ヘキ
 テイ)である。

(拾遺)

和名 しなかつぶり

學名 *Polioptilus nivicollis p. eggeri* (Reichenow)
 科名 かいつぶり科

釋名

須臾(爾雅)

水鷺

音は札(サツ)である。(正要)

鵞鵞(日用)

刁鴨(食

療) 油鴨(俗)

時珍曰く、

鵞鵞、

須臾

なる名稱の意義は詳でない。鷺、刁、零丁

はいづれもその形状の小なるをいひ、油とはその肥えたることをいつたものだ。

集解

藏器曰く、

鵞鵞は水鳥であつて、大いさは鳩ほど、脚は鴨のやう、尾

は連り、陸行することは不能で常に水中に

ゐる。人間が近寄ると直ちに沈むが、或は

撃つと飛び起つ。その膏を刀劍に塗ると錆

ない。續英華詩に『馬は啣(くは)む苜蓿葉、劍は

瑩(あきら)なり鵞鵞膏』とあるはそれである。

韓保昇曰く、野鴨には家鴨と似たものも

あり、全然別なものもある。その甚だ小な



シシ

鵞 鵞

るものを刁鴨てうあふと名ける。最も美味なものだ。

(一) 楚トハ今ノ湖北湖南兩省ノ地ヲイフ。

時珍曰く、鶩鶩は南方の湖、溪に多くゐる。野鴨に似て小さく、蒼白の文があり、脂が多くして美味だ。冬期に取る。その種類の多いものだ。揚雄の方言に所謂『野鳬の甚だ小さくして好んで水中に没するものを、(二) 楚から以南では鶩鶩といふ。大なるものを鶩鶩といふ』とあるがそれだ。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【中を補し、氣を益す。五味

で炙いて食へば甚だ美味だ】(時珍) 記載は正要にある。

膏 主治

【耳に滴せば聲を治す】(藏器)

(一) 鶩 鶩 (宋嘉祐)

和名 なしどり
學名 *Dendrocygna javanica* (Tinn.)
科名 がんあふ科

釋名

黃鴨 綱目)

匹鳥

時珍曰く、鶩鶩とは終日竝んで遊ぶ有様に『宛と

(二) 木村(重)曰ク、なしどりハ三列風切羽發達シテ扇狀ヲナス、美麗ナルハ雄ナレドモ夏期ハ雌ノ如キ羽トナル。東部西比利亞、支那、朝鮮、日本ニ分布ス。
鶩鶩(ユアンヤン)(北支)(ローヤン)(南支)ト稱サル。

して水の中央に在り』の意味を含んだ名稱だ。或は、雄の鳴聲は鶩といひ、雌の鳴聲は鶩といふのだともいふ。崔豹の古今注には『鶩鶩は雄雌相離れず、人間がその

一羽を獲ると残りの一羽は思慕して死ぬ。故にこれを匹鳥といふ」とある。涅槃經にはこれを婆羅迦隣提といつてある。

集解

時珍曰く、鴛鴦は鳬の類であつて、南方の湖、溪中にある。土穴中に棲むもので、大いさは小さい鴨ほど、

その質は杏黄色きやうくわうしきで文彩があり、頭は紅、鬣れふは翠、翅は黒、尾は黒、掌は紅で、頭に垂れた白い長毛があつて尾に至る。頸を交へて臥し、その交接は再しない。

〔鴛 鴦〕



肉 氣味

【鹹し、平にして小毒あり】孫曰く、苦し、微温にして毒なし。瑞曰く、酸し、毒なし。詵

曰く、多く食へば大風を患はしめる。

主治

【諸瘻、疥癬かいせん。酒に浸して炙き、熱して瘡上に傅貼ふてふし、冷えれば易へ

る【嘉祐】【清酒で炙いて食へば瘻瘡を治す。羹、臠にして食へば人體を肥麗ならしめる。夫婦不和なるものには、私かにこれを食はすれば互に愛情が復活する】【孟詵】【炙いて食へば夢中に戀ひ惱むものを治す】【孫思邈】

附方

舊一、新一。【五癭漏瘡】鴛鴦一羽を普通のやうに拵へて炙熟し、細に切つて五味醋で食ふ。羹にするも妙である。(食醫心鏡) 【血痔の止まぬもの】鴛鴦一羽を淨治し、切片して五味、椒、鹽で醃け、炙いて空心に食ふ。(奉親養老方)

鵞

鵞

音は溪敕(ケイ
チヨク)である。

(宋嘉祐)

和名 おほなしどり
學名 未詳
科名 未詳

釋名

溪鴨(異物志)

紫鴛鴦

時珍曰く、按ずるに、杜臺卿の賦に『鵞鵞は

(二)木村(重)曰ク、
鵞鵞學名未詳、和名
ハ和書ニおほなしど
リトアリ、紫鴛鴦ノ
語アリ、コレひとり
がモ(Marcel)屬)ナ
謂フカ、或ハなしど
リノ別種ナ云フカ、
後攻チ俟ツ。

邪を尋ねて害を逐ふ』とある。この鳥は専ら短狐を食物とするので、溪中で物を害ふものを敕逐し、その溪中に游んでは左は雄、右は雌と隊伍整然として居る有様が禮式、節度があるやうに見えるといふ意味である。故に説文には又、鶯鵞と書いてある。その形は鴛鴦より大きくして色が多く紫だ。やはり好く竝んで遊ぶ。故に紫

(二)短狐ハ卷四十二
溪鬼ノ條ニ解アリ。

鴛鴦といふのである。

集解

藏器曰く、鶺鴒は南方の(三)短狐のゐる土地に多くゐる。性短狐を食ふ

もので、この鳥の棲る處にはその毒氣がない。人家に畜ふて宜きものだ。形は小さくして鴨のやう、毛には五彩があり、首に纓があり、尾に船の舵の形のやうな毛がある。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】冬期

に用ゐる。主治 【これを食へば驚邪、及び短

狐の毒を去る】(嘉祐)



〔鶺鴒 鶺鴒〕

(一)鶺鴒

鶺鴒

音は交晴(カウ
セイ)である。

(拾遺)

和名 あなきぎ
學名 Arde cinerea jonyi, Chuk.
科名 やぎ(鶺鴒)科

釋名

交臚(説文)

菱雞(俗)

鶺鴒

音は堅(ケン)である。(爾雅)

時珍曰く、

(一)本村(重)曰ク、
あなきぎ、頸以下ノ
背面ハ尾ニ至ル迄青
灰色、嘴ハ黃色ニ脚
ハ暗綠色ナリ。東部
西比利亞、支那、日本
ニ分布ス。日本ノ本
草書ニ謂フ如クこゝ

按ずるに、禽經に『白鶺鴒は相睨んで孕み、鶺鴒は晴交して孕む』とあり、又『旋目

さぎ(せぐろいぬ)
Nycticorax nycticorax(Linn.)モ鷺鷥の中ニ合マル。一般ニ鷺(ルー)ノ名ニテ知ラル。

旋目、和名さんかのつゝ、學名 Ixobrychus exilis, Linn. 方目、和名さんかのつゝ、學名 Ixobrychus sinensis(Gmelin) 共ニ鷺鷥科。

その名を鷺鷥せんといふ。方目その名を鷺鷥せんといふ。交目その名を鷺鷥せんといふ。とあり、その眸子はうしを觀て命名したものであつて、その意味は十分そこに盡きてゐる。説文に交かう趾ちといつてあるもやはり趾子を目して命なづけた名である。俗に菱雞と呼び、多く菱かう菰ちう中にあるもので、脚が高くして雞に似てゐるからだといふが、その説もやはり通ずる。


集解

藏器曰く、鷺鷥せんは水鳥であつて、南方の池澤に産する。鴨に似て綠色の毛を全身に纏へたものだ。人家に飼養すればよく馴れて飛び去らない。火災の禁厭になる。博物

志には『鷺鷥は高い樹に巢すんで穴中に子を生み、その母の翼に啣くはまれて飛び下りて飲食する』とある。時珍曰く、鷺鷥は、大いさは鳬、鷺ほどで脚が

高く、雞に似てゐる。喙が長くて好く啄つばむ。その頂には冠のやうな紅毛があり、碧斑のある翠色の

鬣れふがあり、嘴は丹あかく、脰けは青い。愛玩用として飼



〔鷺 鷥〕

へるものた。

(二) 荆鄧ハ今ノ湖北省ノ南部、武昌縣ノ附近ナイフ。

附 録

旋目 水鳥であつて、(三) 荆鄧地方に生ずる。大いさは鷺ほどで尾が短く、紅白色で目が深く、目の傍の毛がみな長くして渦卷いてゐる。上林賦に『交晴旋目』とあるはこのものだ。

方目 一名鳩、音は紡(ハッ)である。一名澤虞。俗に護田鳥と名け、西方の地では蝦蟇護といふ。水鳥であつて、常に田澤中にゐる。形は鷗、鷺に似て色は蒼黒く、頭に白肉冠があり、足が赤い。人を見ると鳴き喚いて去らない。漁人はこれを鳥鶏と呼び、閩地方ではそれを姑雞と訛つて呼ぶ。

肉 氣味

【甘く鹹し、平にして毒なし】

主 治

【炙いて食へば諸種の魚

蝦の毒を解す】(時珍)

(一) 鷺 (食物)

和名 かしらぎ
學名 Hemizus, the entophotes (Swinhoe)
科名 さぎ科

釋 名

鷺鷥(禽經)

絲禽(陸龜蒙)

雪客(李昉の命名したもの)

壽鋤(爾雅)

白鳥

時珍曰く、禽經に『鵲飛ぶときは霜ふり、鷺飛ぶときは露あく』とある。そ

(二) 木村(重)曰く、鷺ハ全身純白色、後頭部ニ所謂箕毛ヲ生ズ、支那ノ中部及南部ニ主産ス、白鷺(パアルー)(北支)パロー(南支)、雪客(シエーユー)白鳥(バイニヤナ)ノ名アリ。

(一) 青、齊ハ今ノ山東省ノ中部、西北部ノ地ヲ指ス。
(二) 吳、揚トハ今ノ江蘇安徽兩省地方ヲイフ。

(三) 陸鰲ハ按鰲ニ同ジ、白鰲ナリ。

の名稱は此から出たものだ。浅い水中を歩んで好く自ら上軀を^あ昂げ^さ下げするさまが物を^つ舂くやうな有様にも見え、鋤を揮ふやうな有様にも見えるところから舂鋤といふ。陸機の詩疏に『^三青、齊地方ではこれを舂鋤といひ、遼東、^四吳揚ではいづれも白鷺といふ』とある。

集解

時珍曰く、鷺は水鳥であつて、林間に棲息し、食物を水中に取り、列



鷺

鷺

をなして羣り飛ぶ。雪のやうに潔白で、頸は細くして長く、脚は青く、善く翹^あげて高さ一尺餘のものだ。指は別れ、尾は短く、喙の長さ三寸、頂に十數本の長毛があつて、絲のやうに毵^{とんじんげん}毵然として細長く、魚を取らんとするときはそれを弭^{なみ}す。郭景純は『その毛は^四鵞鵝に作れるものだ』といった。變化論には『鷺は目を以て^{なみ}眇に視て受胎する』とある。

穎曰く、鷺に似て頭に絲がなく、脚の黄色な

(五) 木村(重)曰ク、白鷺子ハこさぎ一名しらこさぎ、學名 *Erzetta gazzetta*, Linné. 滿洲ニテハこもじろト共ニ鷺子(ワーツー)ト稱サル。
紅鷺、和名あかがしらこさぎ、學名 *Ardeola bacchus* (Bonaparte) 朱鷺(とき)ナラズ。

(一) 木村(重)曰ク、鷺ハ冬羽ハ體白色、翼ハ綠ハ黑色、夏羽ハ褐色ヲ帶ブ。歐洲、亞細亞ノ大部ニ産シ、揚子江ニテハ六百哩上流宜昌(湖南省)ニナホ棲ム、江鷺コレナリ。鷺(エ)ト稱ス。みづこどり(都鳥)トモ稱ス。海濱ニ多キハかもめ (*Larus ca-*

るものを俗に(五)白鷺子と名ける。又、これに類して紅色の紅鷺といふものがある。禽經に所謂『朱鷺』がそれだ。

肉 氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

【虚瘦に脾を益し、氣を補す。

炙熟して食ふ】(汪頌)

頭

主治

【破傷風で肢強し口緊するものには、尾共に焼いて研り、臘猪脂で調へてその瘡口に傅ける】(救急方)

(二) 鷗 (食物)

和名 ゆりかもめ
學名 *Larus ridibundus*, Linné,
科名 かもめ(鷗)科

釋名

鷺

音は鷺(イ)である。水鷺

時珍曰く、鷺とは軽く

漂ふて渥のやう

に水上に浮ぶといふ意味だ。鷺とはその鳴聲である。鷺とは形が似てゐるからだ。

海にゐるものをば海鷺と名け、江にゐるものをば江鷺と名ける。(三)江夏地方では江鷺と訛つて呼ぶ。海中の潮に随つて往來する一種をば信鳥といふ。

ans major, Miltoridout)ナリ。
(一)江夏ハ草部陽草類敗醬ノ註ヲ見ヨ。

(一)木村(重)曰ク、だいさぎハ全身白色、蕃殖期ニハ背ニ延長セル羽毛ヲ生ズ、白鶴トモ稱セラレ。歐洲、亞細亞ニ棲ム、假ニ定メテ後考ヲ俟ツ。



〔鵞〕

集解

時珍曰く、鵞は南方の江、海、湖、溪中に生ずる。形色は白鶴のやうでもあり、小さい白鶏のやうでもあり、喙長く、脚長く、羣り飛んで日光に耀く。三月卵を産む。羅氏は青黑色だといつたが、誤だ。

肉 氣味 缺

(一) 鵞 鵞 音は楊玉(シヨクギヨク)へある (拾遺)

和名 だいさぎ、一名もじろ
學名 *Casmerodius albus* (Linn.)
科名 さぎ(鵞)科

釋名

鵞鵞

時珍曰く、鵞鵞なる名稱の意味は詳でない。按ずるに、許慎の

説文に「鵞鵞は鳳の屬なり。又、江中に鵞鵞と呼ぶ鳥があつて、鳧に似て大きく、目が赤い」とある。これに據れば、鵞鵞とは鵞鵞の音の轉化したものらしい。蓋し

この鳥は文彩もんさいがあつて鳳毛のやうだから同一名稱で呼ばれたものであらう。

集解

燕器えんき曰く、鸚鵡は溪に出るもので、水毒のある處にある。毒蟲を食物とするに因るものである。その形状は鴨のやうで大きく、項が長く、目が赤く、嘴

は斑だ。毛は紫紺色で鸚鵡かうきの色のやうである。



〔場 鸚〕
—— 白 ——

時珍曰く、按ずるに、三輔黃圖、及び事類合璧には、いづれも現に一般に白鶴子と呼ぶものを鸚鵡として『その鳥は潔白にして玉の如し』といつてある。陳氏の鴨のやうで紫紺色だといふ説とは一致しない。白鶴子の形状は、鶯のやうに白く、喙が長く、脚は高いが、ただ頭に絲がないだけのもので、そのすらりとした姿が鶴のやうだから鶴をつけて呼ばれたのだ。林間に棲み、水中に食を漁り、水に近い場所に極めて多い。捕つて食つて見ても甚だ佳味ではないものだ。

〔二〕大觀ニ鳥字ナシ。

〔三〕大觀ニ之箭也ノ上ニ是此蟲ノ三字アリ。

毛 及び 屎 主 治

〔灰に焼いて水で服すれば、溪^ミ鳥毒、砂^{しゃ}蟲、水弩、射工、蟻、短狐、蝦^{かしゆ}鬚等の病を治す。またその鳥を病人の身體に近づけると能く人の身體を咬^くふもので、咬ひ訖^{をば}つてから物でそれを承^うけると沙が出るものである。その沙は即ち沙を含んで人を射るといふその〔三〕箭である。又、籠にその鳥を入れて人に近け、鳥をして病人と互に呼吸を吸はせるもよし〕〔藏器〕

發 明

藏器曰く、以上の數病は大略相似たもので、いづれも山の水の中にゐる蟲に沙を含んで射られたために起るものだが、また水のない場所^{ふか}でこれに罹^{ふか}ることもあつて、或は瘡の如く、或は天行寒熱の如く、或は瘡あるもあり、或は瘡なきもあるが、ただ夜間就寢中に手で身體を摩^もでて見ると辣^{らつ}痛する處があり、よく視ると、針の先ほどの赤點があるものは、急に捻^{ひね}つて芋の葉を内に入れ、細沙を刮出し^さて蒜^{さん}で封^ふずれば癒える。右の如くせねば寒熱が漸次に深くなるものだ。就中蝦鬚瘡は最も毒なるもので、十人の患者中活きるものは一二人である。〔四〕桂嶺には特にこれが多い。但しその發見が早期の場合には、芋、及び甘蔗葉を折つてその角を肉中に入れて勾^くり出すと、蝦鬚のやうな状態のその病根が出て癒えるが、手遅れになれば

〔四〕桂嶺ハ今ノ廣東省ノ西北部、及び廣西省ノ地ヲ指ス。

根が骨に達して丁腫のやうになり、最も經過が悪い。これは好く人の陰部に著くものだ。

時珍曰く、水弩、短狐、射工、蜮は一物である。陳氏が四種として分けたのは正しくない。溪毒といふはその毒氣のみのもので形體はない。砂蟲さしゅうは沙中の細蟲である。

二、鷓鴣 (別録下品)

和名 しなかはう
學名 *Thalacrocorax caupo sinensis* (Shaw et Nodder)
科名 かほう(鷓鴣)科

釋名

鷓 音は意(イ)である。(爾雅) 水老鴣(衍義) 時珍曰く、按ずるに、

韻書には、盧と玆とはいづれも黒いことだとある。この鳥は色が深黒だからかく名けたものだ。鷓とはその鳴聲がその名のやうに聞えるからである。

集解

時珍曰く、鷓鴣ろじは處處の水郷にゐる。鴣げきに似て小さく、色は黒くして

鴉のやうだが、喙が長くして微し曲り、善く水に没して魚を取る。晝は洲渚しゅうしよに集り、夜は林木に集み、久しい間に糞の毒で多く木を枯して了ふ。南方の漁夫には往往こ

(一) 木村(重)曰く、日本、鷓ニ似ル、支那ニ屬アリ、飼養シテ魚類ヲ獲ラシムルモ日本ニ於ケル如ク鷓匠ハ繩ヲ用キズ、飼馴シテ自由ニ水ニ入テ魚ヲ獲ル、揚子江ノ支流ハ殊ニ鷓多シ。
鷓鴣(ルーツエ)水老鴣(シユキラツヤ)共ニ通ズ。

(二)爾雅ニハ『鵒、頭鵒』トアリテ、郭註ニ鵒ハ江東ニテハ一名魚鵒トイフトアリ、釋ニ鵒、一名頭鵒トアリ。

れを摩つないで數十羽を飼養し、それに魚を捕らしめてゐるものがある。杜甫の詩に『家
家鳥鬼を養ひ、頓頓黃魚を食す』とあるが、これを謂つたのだといふことだ。又、
鷓鴣に似た鳥で、頭が蛇のやうで項が長く、冬期には羽毛が盡く落ち、溪岸に栖息
し、人を見ても遁げ歩めずして直ちに水に没する一種がある。これは爾雅に所謂
『鵒、頭は魚鰓』とあるそのものだ。薬用には入れない。鵒の音は拗(エウ)であ
る。

藏器曰く、頭が細く、耳が長く、頂上が長い一種の鳥をば魚鰓ぎょこうと名ける。薬には
用ゐない。

正誤

弘景曰く、この鳥は卵生ではなく、口から雛を吐き出す。一種の不可
思議だ。

藏器曰く、この鳥は口から生れ出る。鬼が兒を吐はき出すやうなものだ。それで産
婦がこの鳥を持つと安産するといふ。

宗奭曰く、世間で、孕婦は鷓鴣を食ふことを忌む、口から雛を吐くからだといふ。
しかし、嘗て余が澧州れいしゅうに在勤中、官舎の裏手に一本の大本があつて、その上に三四

(三)項、爾雅注ニ類
ニ作ル。
(四)背、爾雅注ニ翅
ニ作ル。



〔鵞〕 鵞

十の巢があつたので、朝夕それを注意して見てゐたが、よく交尾もすれば、また碧色の卵殻らんかくが地上一面に落ちてあるのを見た。陶氏、陳氏の説は漫然世人の語り草に随つたもので、事實ではない。

時珍曰く、これは一種の鶇鳥であつて、或は鶇けきとも書く。

鶇けきに似て色が白い。一般人が誤つて白鶇けきといふはこの鳥だ。雌雄相視て雄が上風に鳴き、雌が下風に鳴いて孕み、口からその子を吐く。莊周の所謂『白鶇は相視て眸子めうしを運らさず。而して風化す』とあるそのものだ。昔の人は誤つ

て吐雛を鶇けきとしたが、蓋し鶇けきとは鶇けきとは發音が似てゐたからだ。善く高く飛び、風にも水にも堪へるところから、舟首にこれを畫いたものだ。又、鶇けきに似て(三)項が短く、背上が綠色で腹へう背の紫白色なるものがある、これは青鶇、一名鳥鶇うづきと名ける。陶氏のいつた鳥賊魚の變化した鳥とはこのもので、或は鶇のことだともいふが、それは誤だ。

肉 氣味

【酸く鹹し、冷にして微毒あり】

主治

【大腹鼓脹。水道を利

す】(時珍)

發明

時珍曰く、鷓鴣は、別錄にはその功用を掲げてないが、ただ雷氏の炮炙論の序に『體寒し腹大なるには全く鷓鴣に頼る』とあり、註に『腹が大鼓のやうに大きく、體の寒するには、鷓鴣を焼いて性を存して末にし、米飲で服すれば立ろに癒える』とある。切に謂ふに、腹の鼓大する諸病は皆熱に屬するもので、衛氣が血脈に竝循する場合に體が寒するのだ。炮炙論にいふこの場合は、水鳥はその氣が寒冷で水を利する。その寒は熱に勝ち、水を利する作用が濕を去る結果である。又、外臺に『凡そ魚骨哽には、ただ密に絶えず鷓鴣を念すれば下る』とあるが、これは禁厭制伏の意味だ。

頭 氣味

【微寒なり】

主治

【哽、及び噎には、燒き研つて酒で服す】

(別錄)

骨 主治

【灰に燒いて水で服すれば魚骨哽を下す】(弘景)

附方

新二。

【雀卵面斑】鷓鴣骨を燒いて研り、白芷末を入れて猪脂で和し、

(五) 嚙ノ解ハ鷓鴣ノ
條ニアリ。

夜塗つて朝洗ふ。(摘玄方)

喙

主治

【噎病は、發したとき直ちにこれを啣めばそれで平安を得る】(范汪)

(五) 嚙

主治

【魚哽にはこれを吞むが最も效がある】(時珍)

翅羽

主治

【灰に焼いて半錢を水で服すれば、魚哽噎を治して直ちに癒える】(時珍)

記載は太平御覽にある。

蜀水花

別錄に曰く、鷓鴣の尿である。

弘景曰く、溪谷の間に甚だ多い。手づから取つて白い部分を擇つて用うべきものである。商人の販賣するものは信用し難い。

頤曰く、尿は多く山石上にあつて、色は紫で花のやうなものだ。石からそれを刮り取るのである。別錄にいふ尿が即ち蜀水花であるが、唐時代の面膏の方中に、尿と蜀水花との二物を並用するとある。如何なる理由か判らない。

時珍曰く、別錄を正しとすべきである。唐の方は蓋し傳寫の際の誤だ。

氣味

【冷にして微毒あり】

主治

【面上の黑黥、蟹誌を去る】(別錄) 【顔

面の癰疵、及び湯火瘡痕を療ず。脂、油で和して疔瘡 傅ける】(大明) 【南方の地で

は、小兒の疳、虻^{くわい}を治するに、乾して研末し、豬肉を炙いて蘸^ひけて食ふ。奇效があるといふことだ【蘇頌】【蟲を殺す】【時珍】

附方

舊二、新一。【鼻、面部の酒鼓^{しよこ}】鷓鴣屎一合を研末して臘月猪脂で和し、毎夜塗つて朝洗ふ。(千金) 【魚骨哽咽】鷓鴣屎を研つて方寸匕を水で服し、并に水で和して咽喉の外部に塗る。(范汪方) 【酒を斷^たつ方】鷓鴣屎を焼いて研り、一日一回、水で方寸匕を服す。(外臺)

魚狗 (拾遺)

和名 かはせみ
學名 *Alcedo atthis japonica*, Bonaparte.
科名 かはせみ(翡翠)科

(一) 木村(重)曰ク、
かはせみ日本ニ於ケ
ルト同種ナリ、支那
河湖ニ多シ、魚狗(ユ
ーコウ)鴛(リウ)等
ノ名アリ。他ニやま
せうびん(秦椒嘴)チ
ンチャツツ(Elulo-
joo)屬ム。

釋名


鷓鴣(爾雅) 天狗(同) 水狗(同) 魚虎(禽經) 魚師(同) 翠碧鳥^時

珍曰く、狗、虎、師はいづれも動物を噬^かむ獸類の名であつて、この鳥は魚を害するものだからその獸類と同様の性質なることを取つて名稱としたのである。

集解

藏器曰く、これは即ち翠鳥のことであつて、土に穴を掘つて窠^すを作る鳥だ。大なるを翠鳥と名け、小なるを魚狗と名ける。その青色は翠に似たもので、

はり翡翠ひすいの類だ。



〔狗
——翠

魚〕
魚——

その尾は物の飾になる。また斑白のものもある。いづれも能く水上で魚を取るものだ。

時珍曰く、魚狗は處處の水涯にゐる。大いさは燕ほどで、喙は尖つて長く、足は赤くして短く、背毛は翠色で碧色を帯び、翅毛は黒色で青い光が浮く。婦人の首飾となる。や

肉 氣 味

〔鹹し、平にして毒なし〕

主 治

〔魚哽、及び魚骨が肉に入つ

て出でず、甚しきものには、燒き研つて飲で服す。或は煮汁を飲むも佳し〕〔藏器〕

發 明

時珍曰く、今是一般に魚骨硬を治するにこれを用ゐ、取つて腸を去り、陰陽瓦を用ゐて泥で固濟して煨やいて性を存して藥に入れる。蓋しこれもその相制す

る關係を利用したものだ。

〔附 錄〕

翡翠

時珍曰く、爾雅にはこれを鵠いづといつてある。交、廣、南越の諸

地に産し、水邊に在つて水を飲み物を啄つばみ、穴居して子を生む。また木にも巢を作る。魚狗に似てやや大きいものだ。或は『前身は翡翠であり、後身は翠であつて、翡翠、雁翠などいふ意味のやうなものだ』といひ、或は『雄を翡翠といふ、その色は赤が多い。雌を翠といふ、その色は青が多い』ともいふ。彼の地方では、やはり肉で腊さくを作つて食ふ。方書にはその功用を記してないが、魚狗と同様なものであらうと思ふ。

（二）蚊母鳥（拾遺）

和名 よたか
學名 *Caprimulgus indicus*, Temm. et Schlæg
科名 よたか（蚊母鳥）科

釋 名

吐蚊鳥 鷄（爾雅）音は田（テン）である。

集 解

藏器曰く、この鳥は雞ほどの大いさで色の黒いものだ。南方の池澤の蘆茹ろじよの中に生じ、江東にも多くゐる。その鳴聲は人が嘔吐するやうなもので、一二

（二）木村（重）曰く、夕刻出デテ昆蟲等ヲ捕食ス、東南西北利亞、北支ニ産シ、冬季ハ南方支那ニ分布ス。蚊母鳥（ウシマニヤオ）

(二) 塞北ハ蒙古地方。

升つつの蚊を吐出する。そもそも蚊なるものは惡水中の蟲から羽化して生ずるものであるが、江東には蚊母鳥ぶんもてうといふがあり、(三) 塞北には蚊母樹ぶんもじゆといふがあり、嶺南には蜜母草はうちもさうといふがある。この三物は異類にして同功のものだ。

時珍曰く、郭璞は『蚊母は鳥鶡かうたぐに似て大きく、黃白色の雜文があり、鳴聲は鶡かうの聲のやうだ』といつた。嶺南異物志には『吐蚊鳥は大いさ青鶡せいげきほどで嘴が大きく、魚を食物とする』とある。その産地の相違でかやうにそれぞれの相異があるものだらうか。

翅羽

主治

【扇にして用ゐれば蚊を辟ける】(藏器)

本草綱目禽部第四十七卷 終

本草綱目禽部

第四十八卷

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽の二 原禽類二十三種

雞 本經

雉 別錄

鷄 食療 即ち山雞。

鷺雉 拾遺 即ち錦雞。

鶉 拾遺

鶉 圖經

鷓鴣 唐本

竹雞 拾遺 杉雞を附す。

英雞 拾遺

秧鷄 食物

鶉 嘉祐

鷄 拾遺

鷄 拾遺

鵲 嘉祐

突厥雀 拾遺

雀 別錄

萬雀 拾遺

巧婦鳥 拾遺

即ち鸛鷀。

燕 別錄

石燕 日華

伏翼 本經

即ち蝙蝠。

鼯 本經 即ち飛生。

寒號蟲 開寶

即ち五靈脂。

右附方 舊八十二 新二百三十七

禽の二 原禽類二十三種

鶏 (本經上品)

和名 にはとり
學名 *Gallus domesticus, Brisson.*
科名 きじ(雉)科

(一) 木村(重)曰ク、
鶏(キーマハチー)ト
稱ス、變種スベテノ
稱ナリ。

釋名

燭夜 時珍曰く、按ずるに、徐鉉は『鶏とは稽である。能く時を稽へるといふ意味だ』といつてある。廣志には『大なるを蜀といひ、小なるを荆といふ。その雛を鷄こくといふ』とある。梵書には鶏を鷄こくヒ咤たといつてある。

集解

別錄に曰く、雞は朝鮮の平澤に生ずる。

弘景曰く、雞にはその屬の甚だ多いものだ。朝鮮とは(一)玄菟、(二)樂浪がくろうの地をいふのだが、その總てが雞の產地といふのではあるまいと思ふ。

馬志曰く、藥には朝鮮のものを取つて用ゐるが良しといふわけだ。

頌曰く、今では處處の人家で飼養する。朝鮮から來るものを用ゐるといふ事實は聞かない。

(一) 玄菟ハ蟲部化生
類馬陸ノ註ヲ見ヨ。
(二) 樂浪ハ鱗部無鱗
魚類鮮魚ノ註ヲ見
ヨ。

(目) 木村(重)曰ク、
長尾鶏 なながどり、土佐産ノ如ク長
カラズ。

角鶏 こぶとり、鶏
冠瘡ノ如ク固シ。

長鳴鶏 ながなきと
リ、鶏ノ一品種。

鶴鶏 しやも、支那
馬來地方ニ生ゼル一
品種。

矮鶏 ちやばノ支那
ノ原産。

(丑) 南越ハ石部珊瑚
ノ註、南海ハ土部自
然灰ノ註ヲ見ヨ。蜀
ハ四川省、楚ハ湖北
省ノ地ヲ指ス。

時珍曰ク、鶏はその種類の甚だ多いもので、五方それぞれの産地に因つてその大
小形色にもやはり往々に差異がある。朝鮮産の一種の^(目)長尾鶏は、尾の長さ三四尺
ある。遼陽産の一種の食鶏、一種の角鶏は味が俱に肥美で、大いに諸鶏に勝る。^(丑)南
越産の一種の長鳴鶏は晝夜啼き叫ぶ。南海産の一種の石鶏は潮が満ちて來ると鳴く。
蜀中産の一種の鶉鶏^{くんけ}、楚中産の一種の鶉鶏^{さうけ}は、いづれも高さ三四尺ある。江南産の
一種の矮鶏^{わいけ}は脚が纔に二寸ばかりだ。

鶏なるものは卦に在つては巽^{さん}に屬し、星に在つては昴^{ぼう}に應ずる。外腎がなく、小
腸がない。凡そ人家で故なくして羣鶏が鳴くをば荒鶏といひ、それは不祥事のある
場合としてある。夕暮に獨り啼くときは天恩がある場合としてあつて、これを盜啼^{たうてい}
といふ。老鶏にして能く人間の言葉を發するもの、牝雞にして雄鶏の鳴聲を出すも
の、雄鶏にして卵を生むもの等は、いづれもそれを殺せば何事もない。田舎では、
鶏を飼つて雄がないとき、鶏卵を以て竈^{かまど}に告げ訴へて雌に抱かせる、すると子が生
れる。南方の地では鶏卵に墨で畫いて煮熟^{しやくじやく}し、中の黄を取つて見てそれに現はれる
ところに因つて吉凶^{きうこん}を卜ひ、又、鶏骨を以てその年の豊凶^{うふこん}を占ふ。



〔鶏〕

鶏は鳴くに時刻を知り、棲むには陰、晴を知る。太清外術には『蠱こを蓄たくはへる家からは鶏が飛び去る』とあり、萬畢術には『その羽を焚けば風を招ぎ得る』とあり、五行志には『雄鶏の毛を焼いて酒に入れて飲めば、求むるところ必ず得る』とある。古代には鶏は能く邪を辟けるものだといつた。して見ると、鶏はやはり靈禽れいきんであつて、ただ調理して食物にし得るだけのものではない。

諸鶏肉

氣味・食忌

読よ曰く、鶏は、五色あるもの、黒い鶏で首の白いもの、指の六本あるもの、距けづの四本のもの、死んで足の伸びぬものは、いづれも人を害するものだから食つてはならぬ。

時珍ししん曰く、延壽書に『閹かんけい鶏にして能く啼くものには毒がある。四月に卵を抱く鶏の肉を食つてはならぬ。癰ようを作なして漏なとならしめ、男子、婦人をして虚乏せしめる』

とある。

弘景曰く、五歳以下の小兒が鶏を食へば虻蟲を生ずる。鶏肉と葫、蒜、芥、李とを食合せてはならぬ。犬肝、犬腎と食合せてはならぬ。いづれも洩痢を起すものだ。兎と共に食へば痢となり、魚汁と共に食へば心瘕となり、鯉肉と共に食へば癰癤となり、獺肉と共に食へば通戸となり、生葱と共に食へば蟲痔となり、糯米と共に食へば虻蟲を生ずる。

發明

宗奭曰く、巽は風であり鶏であつて、鶏が五更に鳴くのは太陽が巽の方位に達したときで、その氣に感じて鳴くやうになるのである。現に風病のあるものは、これを食へば必ず發作する。巽を鶏とする有力な驗證だ。

震亨曰く、鶏は土に屬して金、木、火を有し、又、巽に屬して能く肝火を助けるものだ。寇氏がいふ風を動ずる事實は、習慣、習俗の關係でさうなつたものだ。雞の性は補して能く濕中の火を助けるもので、病邪はこれを得ると助長する。魚肉の類の場合でもみなさうである。且つ西北地方は寒が多いから風に中るといふ事實も確にあるが、東南地方は氣候が溫で濕が多い、風が有るといふは根本的に風があつた

のではなくして、いづれも濕が痰を生じ、痰が熱を生じ、熱が風を生じたものである。
時珍曰く、禮記に『天産は陽となり、地産は陰となる』とあるが、鶏は卵生にして地産である。羽はあるが飛ばないものだ。陽精ではあるが、實は風木に屬するのだから陽中の陰である。故に能く熱を生じ、風を動じ、風火相扇ぐところから中風となるのだ。朱氏は寇氏の説を駁して非なりとしたが、やはり駁する方も非である。頌曰く、鶏肉は小毒あるものではあるが、虚羸を補するには主要なものだ。故に食治の方に多くこれを用ゐてある。

丹雄鶏肉

氣味

【甘し、微温にして毒なし】扁鵲曰く、辛し。

主治

【婦

人の崩中漏下、赤白沃。（しやくびやくよくて）神を通じ、惡毒を殺し、不祥を辟ける（本經）【虚を補し、中を温め、血を止め、能く久しき傷瘡の瘡えぬものを愈す】（別錄）【肺を補す】（孫思邈）

發明

晉曰く、丹雄鶏、一名載丹といふ。

宗奭曰く、即ち朱鶏のことだ。

時珍曰く、鶏は木に屬するものではあるが、それぞれの特長に因つて區分すれば、丹雄鶏は離火、陽明の象を稟け得たものだ。白雄鶏は庚金、太白の象を稟け得たも

のだ。故に邪惡を辟けるにはこれがよい。烏雄鶏は木に屬し、烏雌鶏は水に屬する。故に妊娠、出産にはこれがよい。黃雌鶏は土に屬する。故に脾、胃にはこれがよい。而して烏骨のものはまた水、木の精氣を稟け得てゐるものだから、虛熱にはこれがよいのである。各、その五行とその屬する病證とに従ふのである。吳球は『三年の鴈鶏せんけいを常に食へば虚損を治し、血を養ひ、氣を補す』といつた。

附方

新二。

【瘟疫の辟禳】冬至の日に赤雄雞を取つて腊そにし、立春の日になつて煮て食ふ。その全部を食盡すべきもので、他人に分け與へてはならぬ。(肘後方)

【あらゆる蟲の耳に入りたるもの】鶏肉を香しく炙き、耳中を塞いで引き出す。(總錄)

白雄鶏肉

氣味

【酸し、微温にして毒なし】藏器曰く、甘し、寒なり。主治

【氣を下し、狂邪きやうじやを療し、五臟を安ずる。傷中、消渴（別錄）】中を調へ、邪を除き、

小便を利し、丹毒（赤）風を去る（日華）

發明

藏器曰く、白雄鶏は三年養へば能く鬼神に使はれる。

時珍曰く、按ずるに、陶弘景の眞誥（だう）に『道を山中に學ぶには、宜しく白雞、白犬を養つて邪を辟けるがよし』とある。今の術家で祈禱辟禳（ひじやう）にいづれも白雞を用ゐる

はここに起源したもので、これは異端の一説に過ぎない。鶏に何の神、何の妖があるぞ。

附方

舊三、新四。

【癰邪狂妄】自ら聖賢を氣取り、行走してやまぬには、白雄鶏一羽を煮て五味を和し、羹かう、粥じやくを作つて食ふ。(心鏡) 【驚駭、憤怒の邪僻】驚愕、憂愁、恐迫を受け、或は激怒し、悲憂して意志錯亂さくらんし、精神、行動の常規を逸せるには、白雄鶏一羽を普通の料理の場合のやうに作り、眞珠四兩、薤わい白四兩、水三升を二升に煮て盡く食ひ、その汁を盡く飲む。(肘後) 【卒然の心痛】白鶏一羽を普通の料理の場合のやうに作り、水三升で二升に煮て鶏を去り、その汁を六合に煎じ取つて苦酒六合、眞珠一錢を入れて六合に煎じ取り、麝香を豆二粒ほど納いれて頓服する。(肘後) 【赤白下痢】白雄鶏一羽を普通のやうにして臘ろう、及び餌餽いんぞんにして空心に食ふ。(心鏡) 【突然の欬嗽】白鶏一羽を苦酒一斗で三升に煮取り、三服に分服し、并に鶏を淡食する。(肘後) 【水氣浮腫】小豆一升、白雄鶏一羽を普通の料理の場合のやうに作り、水三斗で煮熟して食ひ、その汁全部を飲む。(肘后方) 【肉の壞れる怪病】凡そ口、鼻から腥臭なまけりくい水を出し、椀にそれを取つて見ると鐵色の蝦魚えびのやうな状態のものが

走り躍り、捉へて見ると化して水となるものを肉壞にくぐといふ。ただ多く鶏の料理を食へば癒える。（夏子益奇疾方）

烏雄鶏肉

氣味

【甘し、微温にして毒なし】

主治

【中を補し、痛を止

める】（別錄）

【肚痛、心腹の惡氣を止め、風濕麻痺、諸種の虛羸きよろを除き、胎を安んじ、

折傷、并に癰疽ようそを治す。生で搗いて竹木刺の肉に入りたるに塗る】（日華）

發明

時珍曰く、按ずるに、李廷飛は『黃鷄は老人に宜く、烏鷄は産婦に宜

く、血を暖める』といひ、馬益卿は『妊婦は牡鷄肉を食ふがよし。陽精の全きを天産に取るの意味であつて、これはやはり胎教たいけうに虎豹こへうを見るべしといふやうな意味である』といひ、又、唐の崔行功の纂要には『婦人の出産で死亡するは、多くは富貴の家である。騒ぎが大きいために産婦を驚悸きんきし氣亂せしめるからだ。これはただ一切の人を遠ざけてその産婦一人で出産せしめ、更に牡雞を爛煮らんしゆして汁を取り、その汁で粳米粥を作つて食はせれば自然に無事である。これは和氣の效果だ』とある。蓋し牡雞汁はその性滑なめにして濡ぬなるものだからである。その肉は食はせられない。恐らく消化し難いものだ。今俗間の産科醫師は産後に鷄を食はせ卵を食はせるが、

氣の壯なるものであれば幸に無事であるが、氣の弱いものはそのために痰を起す。それはいづれも右の意味を理解せぬ結果である。

附方

舊四、新六。

【虛弱の補益】洗曰く、虛弱の人には、烏雄雞一羽を洗淨し、五味で極度に煮爛して食ふ。生では反つて人體を損するものだ。或は五味で淹けて炙つて食ふも良し。【反胃吐食】烏雄雞一羽を普通のやうに作り、胡荽子半斤をその腹中に入れ、煮て食ふ。二羽で癒える。【老人の中風】煩熱し、言語の澀るには、烏雄雞一羽を用ゐ、葱白一握を切つて入れて臛に煮、麻汁、五味を投じて空心に食ふ。(養老書) 【脚氣煩懣】烏雄雞一羽を普通料理の場合のやうに作り、米を入れて羹にして食ふ。(養老書) 【寒疝の絞痛】烏雄雞一羽を普通料理の場合のやうに作り、生地黃七斤と共に剉んで甑中に入れて蒸し、器に承けてその汁を取り、早朝に溫服して夕刻までに服し盡す。諸種の寒癖の證を下すものだ。かくて白粥を食ふ。久しき疝痛も三服に過ぎずしてよし。(肘後) 【卒かに起つた欬嗽】烏雄雞一羽を普通の料理の場合のやうに作り、酒に半日漬けて飲む。(肘後) 【腎虛の耳聾】烏雄雞一羽を淨治し。無灰酒三升で煮熟し、熱に乗じて食ふ。三五羽で效がある。【狐尿刺瘡】刺されて臛

痛し、死せんとするには、烏鷄を破つて搗するが良し。(肘後方) 【猫眼睛瘡】べうがんせいさう 身體、

面部に猫の眼のやうで光彩のある瘡が生じ、膿血はないがただ非常に痛痒し、食慾の減退する病を寒瘡と名ける。多く鷄、魚、葱、韭を喫へば自ら癒える。(夏子益奇疾

七 血、大觀ニ陷ニ
作ル。

方) 【打撲傷、顛躓傷】及び牛馬に蹴られて胸腹に破れ血し、四肢の摧折したるには、

八 膏、大觀ニ藥ニ
作ル。

烏鷄一羽を毛のついたまま一千二百杵搗き、苦酒三升を和勻して新布で患部に搗し、膏を布に塗つて貼る。惡寒し、顛ひて吐氣を催ほすときは徐徐に取下し、須臾にして再び一羽の鷄を用ゐて右の如く試み、少頃して更に繰返し、癒えるを度とする。

(肘後方)

黑雌鷄肉

氣味

【甘く酸し、溫、平にして毒なし】

主治

【羹にして食

へば風寒濕痺、五緩、六急を治し、胎を安ずる】【別錄】 【心を安じ、志を定め、邪辟、

惡氣を除き、血邪を治し、心中の宿血を破り、癰疽を治し、膿を排し、新血、及び

産後の虛羸を補し、色を益し、氣を助ける】【日華】 【反胃、及び腹痛、踠折骨痛、乳

癰を治す。又、新産婦には、一羽を淨治して五味を和し、香しく炒つて酒二升の中

に投じ、一晝夜封じてそれを取つて飲む。人體を肥白ならしめるものだ。又、烏油

麻二升を和して香しく熬^いり、それを酒中に入れて用ゐるも極めて有効だ（孟詵）

發明

時珍曰く、黒色は水に屬し、牝の象は陰に屬する。故に烏雌の主として治效のある病證はみな血分の病であつて、各々その類に従ふのである。

附方

新三。

【中風の舌強】言語不能となり、眼睛が動かず、煩熱するには、

烏雌鶏一羽を治淨し、酒五升で二升に煮取り、滓を去り、三回に分けてつづけて服し、葱、薑の粥を食つて暖に臥し、少し汁を取る（飲膳正要） 【死胎の下らぬもの】

烏鶏一羽を毛を去り、水三升で二升に煮て鶏を去り、帛にその汁を蘸^つけて臍下を摩すれば自ら出る（婦人良方） 【虚損、積勞】男女の積が原因で虚し、或は大病後に虚

損して沈困し、酸疼し、盜汗し、少氣し、喘悒^{ぜんてつ}し、或は小腹拘急し、心悸し、胃弱

し、多く横臥して起きること少く、漸次に極端に瘦^やせるものは、長時日を經過して

氣力が竭^つきた場合には治し難い。烏雌鶏一羽を普通のやうに淨治し、生地黃一斤を

切り、飴糖一升と共にその腹中に入れ、縛定^{はくぢやう}して銅器中に入れ、それを瓶中で米五

升を蒸す中に入れて熟したとき取出し、その肉を食ひ汁を飲む。鹽を用ゐてはなら

ぬ。一个月に一回試みれば神效がある（姚僧坦方）

黃雌鶏肉 一氣味

【甘く酸く鹹し、平にして毒なし】。日華曰く、性は温である。

骨熱を患ふものは食つてはならぬ。

【主治】傷中、消渴で、小便頻數にして禁ぜぬ

（ち）大觀ニ絶上ニ續字アリ。

もの、腸澼、洩痢するもの。五臟、を絶傷を補益し、五勞を瘥じ、氣力を益す【別錄】

（こ）大觀ニ疾ヲ瘦ニ作ル。

【勞劣を治し、髓を添へ、精を補し、陽氣を助け、小腸を暖め、洩精を止め、水氣を補す】。【日華】男子の陽氣を補し、冷氣（こ）疾で牀に著くものを治す。漸漸に食ふが良し。光粉、諸石末を飯に和したもので飼つた鶏を煮て食へば補益の效がある【孟

詵】産後の虚羸を治するには、煮汁で藥を煎じて服するが佳し【時珍】

發明

時珍曰く、黃は土の色、雌は坤の象であつて、味の甘は脾に歸し、氣

の温は胃を益す。故に主たる治效はいづれも脾、胃の病に在る。丹溪朱氏の「鶏は土に屬す」とはこの鶏を指して特に示したものに相違ない。他の鶏ではこの鶏のやうには行かぬものだ。

附方

舊三、新六。

【水癖水腫】詵曰く、腹中の水癖水腫には、黃雌鶏一羽を普

通のやうに治淨し、赤小豆一升を和して共に煮た汁を、日中二回、夜一回飲む。【時行黃疾】時行發黃には、脚の金色なる黃雌鶏を普通のやうに淨治し、煮熟してこれ

を食ひ、汁を飲み、全部を食ひ盡す。二回以上の必要はない。また鹽豉少量を入れてもよし、(肘後方) 【消渴飲水】小便頻數なるには、黃雌鶏の煮汁を冷飲し、并に藥にして肉を食ふ。(心鏡) 【下痢禁口】肥えた黃雌鶏一羽を普通のやうに臠にし、それで濕餛飩を作つて空心に食ふ。(心鏡) 【脾虛の滑痢】黃雌鶏一羽を炙いて鹽醋を塗り、煮熟して食ふ。(心鏡) 【脾、胃の弱乏】身體が痿えて黃瘦するには、黃雌鶏肉五兩、白麪七兩を用ゐ、肉を切つて餛飩にし、五味を投じて煮熟し、空心に食ふ。一日一回試みれば顔色を益し、臟腑を補す。(壽觀) 【産後の虛羸】黃雌鶏一羽を毛を去り、背部を開破して生百合三箇、白粳米半升を入れて縫合し、五味汁中に入れて煮熟し、腹を開いて百合、并に飯を取り、汁に和して羹にして食ひ、并に肉を食ふ。(聖惠) 【病後の虛汗】傷寒後の虛弱で晝夜汗が出て止まず、口乾き、心躁するには、黃雌鶏一羽を腸、胃を去つて治淨し、麻黃根一兩、水七大盞と共に煮て汁三大盞に煮取り、滓、及び鶏を去り、肉從蓉を酒に一夜浸して淨め刮つて一兩、牡蠣を假いた粉二兩を入れて一盞半に煎じ取り、一日に服し盡す。(聖惠) 【老人の噎食】通らぬには、黃雌鶏肉四兩を切り、伏苓二兩、白麪六兩で餛飩にし、豉汁を入れて煮て食ふ。三五

服にして效がある。(養老書)

二、烏骨鶏

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【虚勞羸弱るゐじやくを補し、消

二、木村(重)曰ク、
うこつけい 嘴、脚、
骨スベテ黒シ、支那
ニ家畜トシテ多シ。

渴、中惡、鬼擊、心腹痛を治し、産婦に益し、婦人の崩中帶下、一切の虚損の諸病、大人、小兒の下痢禁口を治す。いづれも煮て食ひ汁を飲む。搗き和して丸薬にする

もよし】(時珍)

發明

時珍曰く、烏骨鶏うこけけには、毛白くして骨の黒きものと、毛黒くして骨の

黒きものと、毛は斑まだらで骨の黒きものとがあり、骨、肉ともに黒きものと、肉白くして骨の黒きものとがあるが、但し鶏の舌の黒いものは肉、骨俱に黒く、薬に入れて更に良好である。鶏は木に属するものであるが、骨が反かへつて黒いものは巽せんが坎かんに變じたものであつて、水、木の精氣を受けてゐる。故に肝、腎、血分の病にはこれを用ゐるがよく、男には雄を、女には雄を用ゐる。婦人科の方にある烏鶏丸は婦人のあらゆる病を治するもので、鶏を爛れるまで煮て薬に和し、或は竝に骨を研すつて用ゐてある。

按ずるに、太平御覽に『夏侯弘が江陵かうりようへ行つたとき、一の大鬼が數百の小兒を率

ゐて行くに逢つた。弘が潛にその列の最後について行く一小鬼を捉へて問ふて見ると「われわれは廣州の大殺の一行だ。弓と戟とを持つて荆、揚二州へ人を殺しに往くのだが、この弓や戟が心腹に中つたものは死んで了ふ。他の處に中つたものは救はれぬこともない」といつた。そこで弘が「治療に何か方法があるか」と訊ねると「ただ白烏骨雞を殺して心に薄れば瘥える」といつた。恰もその頃、荆、揚地方には心腹を病むものが甚だ衆かつたので、弘はそのとき教へられた方を用ゐて治療してやつたが、十中の八九まで癒えた。中惡に烏雞を用ゐるは弘から始つたのだ」とある。この説はやや荒唐無稽なところもあるが、しかし方そのものは不可思議な妙效がある。神の授けとでもいふ外はないやうなものだ。鬼擊卒死には、その血を心下に塗つても效がある。

附方

新三。

【赤白帶下】白果、蓮肉、江米各五錢、胡椒一錢を末にし、烏骨

雞一羽を普通のやうに淨治し、それを木瓜の腹中に裝填し、煮熟して空心に食ふ。

【遺精白濁】下元の虚憊せるには、前記の方を用ゐて食ふがよし。【脾虛の滑泄】烏骨母雞一羽を治淨し、豆蔻一兩、草果二箇を焼いて性を存してその鶏の腹中に掺入

し、煮て禁定して煮熟し、空心に食ふ。

(二) 木村(重)曰ク、

反毛鶏ハ羽毛ノ捲キ
タルモノ、形大ナラ
ズ、支那ダケニ産ス。

反毛鶏

主治

【反胃には、一羽を煮爛して骨を去り、人參、當歸、食鹽各半兩を入れて再び共に煮爛し、その全部を食ふ】(時珍) 記載は乾坤生意にある。

發明

時珍曰ク、反毛鶏、即ち翻翅鶏であつて、毛、翻がみな逆に前に向いて生えるものだ。反胃を治するはその類に従ふわけである。

泰和老鶏

氣味

【甘く辛し、熱にして毒なし】

主治

【小兒の痘瘡を内

托する】(時珍)

發明

時珍曰ク、江西の泰和、吉水の諸縣の俗間には、老鶏は能く痘瘡を發出せしめるといふ言ひ傳ひがあつて、家毎にこれを飼ひ、年數の少いものでも

(一) 泰和、吉水ハ縣
名、俱ニ今ハ江西省
廬陵道ニ屬ス。

五六年、多いものでは十年二十年のものを、痘瘡の發する時を待つて五味で煮爛して病兒に與へて食はせ、甚しきには胡椒、及び桂、附の屬を加へる。これはやはり陳文中が痘を治するに木香異攻散を用ゐたと同じ意味であつて、濕熱を助け膿を發する效能を利用したものだ。が、風土の關係上その適する地方と適せぬ地方とがあるから、一般的の通則とするわけには行かない。

ニ日大觀ニ其上ニ尤
ノ字アリ。

鶏頭 丹、白雄鶏のものが良し。【主治】「鬼を殺す。東門上のものが二日良し」

〔本經〕「蟲を治し、惡を禳ひ、癰を辟ける」〔時珍〕

發明

時珍曰く、古代には、正月元日に雄鶏を磔して門戸を祭り、それで邪鬼を辟けたのだ。蓋し鶏は陽の精、雄は陽の體、頭は陽の會であつて、東門は陽の方である。純陽は以て純陰に勝つ意味から行つたものだ。千金方の胎兒の女を男に轉ずる方の中にこれを用ゐたのも、やはりこの意味を取つたのである。按ずるに、應劭の風俗通に「俗に鶏を以て門戸を祭る。鶏は乃ち東方の牲であつて、東方は萬物の作るところだから、その門戸を通過して出るといふ意味だ」とある。山海經にも、鬼神を祠るにはいづれも雄鶏を用うとしてあつて、現に賊風を治する藥に鶏頭散といふがあり、蟲を治するには東門の鶏頭を用ゐ、鬼瘧を治するには雄鶏血を用ゐる。これはいづれもそれに因つて〔五〕死を禦ぎ惡を辟けたものである。又、崔寔の月令に「十二月、東門に白鶏頭を磔す。以て藥に合すべし」とあり、周禮には「鷄人は凡て祭祀禳禬にその鷄牲を供す」とあり、その註に「郊、及び疆を禳つて災變を却くるなり。宮室の器物を作り、血を取つて罄隙に塗るなり」とある。淮南子には「鶏頭

〔三〕本草綱目ニ死ナ
邪ニ作シ。

は瘥を已む』とある。これはいづれも類推される事柄だ。

附方

新一。

【邪魅に襲はれて卒かに昏死せるもの】東門上の鶏頭を末にし、

酒で服す。(千金方)

鶏冠血

三年の雄鶏のものが良し。

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

（六乳、本草洞詮ニ
産ニ作ル。）

【烏鶏は一六乳難に主效がある】（別錄）【目涙の止まぬを治す。日毎に三回點けるが良

し】（孟詵）

【また暴赤目にも點ける】（時珍）

○【丹鶏は白癰風を治す】（日華）

【いづれも

經絡の間の風熱を療ず。頬に塗れば口喎不正を治し、顔面に塗れば中惡を治し、卒に

これを飲めば縊死者の絶命せんとするもの、及び小兒の卒驚、客忤を治す。諸瘡癰、

蜈蚣、蜘蛛の毒、馬嚙瘡、あらゆる蟲の耳に入りたるに塗る】（時珍）

發明

時珍曰く、鶏冠血は、三年の老雄の血を用ゐるはその陽氣の充溢せる

を取るであつて、風が血脈に中れば口が僻喎し、冠血は鹹くして血に走り肌に通

る。鶏の體中で精華の集中された部分であり、天に本づくものであり、上に親しむ

ものである。丹は陽中の陽であつて能く邪を辟けるものだから。中惡、驚忤の諸病を

治するのである。烏は形は陽にして色は陰なるもの、陽中の陰である。故に産乳、

二七太陽石、第十一
卷諸石下ニ其名ヲ舉
グレドモ其物詳ナラ
ズ。

目涙の諸病を治するのである。蜈蚣、蜘蛛の諸毒を治するは、鶏はあらゆる蟲を食ふものだから、それを制するにその畏の關係を利用するのである。高武の痘疹正宗に『鶏冠血を酒に和して服すれば痘を發するに最も佳し』とあるは、鶏は異に屬し、風に屬し、頂血は至清、至高なるものだからである。

附方

舊八、新十一。

【陽氣の益助】詵曰く、丹雄鶏の冠血に天雄、二七太陽粉

各四分、桂心二分を和して丸にして服す。『鬼撃で突然死したるもの』烏鶏冠血を口中に瀝して嚥ませ、同時にその鶏を開破して心下に搗し、冷えてから道傍へ棄てるが妙である。(肘後) 【卒死、寢死】卒死、或は寢死で、氣息極めて微弱にして絶命せんとするを治す。いづれもこれは中惡である。雄鶏冠血を顔面に塗つて乾けば再び塗り、同時に鼻中に吹き入れ、并に灰でその死人の周圍を圍む。(肘後) 【卒然の忤死】言語を發し得ぬには、鶏冠血で眞珠を和して小豆大の丸にし、三四丸を口中に入れば效がある。(肘後方) 【縊死者の死に垂たるもの】心中のなほ溫なるものならば繩を斷つてはならぬ。鶏冠血を刺し取つて口中に滴し、それで心神を安ずる。或は、男には雌を用ゐ、女には雄を用ゐるといふ。(肘後) 【小兒の卒驚】痛む處があるやうだ

がその疾の狀態の判明せぬには、雄鶏冠血少量を口中に滴すが妙である。(譚氏小兒)

【小兒の解顱】丹雄鶏冠上の血を滴し、それに赤芍藥末を粉すが甚だ良し。(普濟) 【陰

毒卒痛】雄鶏冠血を熱酒中に入れて飲み、暖に臥して汗を取る。(傷寒雜要) 【婦人の

陰血】婦人が不自然な交接のために出血するには、雄鶏冠血を塗る。(集驗) 【爛弦風

眼】一日三五回、鶏冠血を點ける。(聖惠) 【對口毒瘡】熱鶏血を頻りに塗つて散ぜ

しめる。(背效方) 【發背癰疽】雄鶏冠血を疽上に滴し、血が盡きたときは再び換へる。

鶏五六羽に過ぎずして痛が止み毒が散じ、數日にして自ら癒える。(保壽堂方) 【浸淫

瘡毒】早期に治療せねば全身に及んで死亡する。鶏冠血を一日四五回塗る。(肘後)

【燥癬の痒きもの】雄鶏冠血を頻りに塗る。(范汪方) 【馬に咬まれた瘡】腫痛するに

は、鶏冠血を塗る。(九) 駁馬には雌鶏を用ゐ、牝馬には雄鶏を用ゐる。(肘後方) 【蜈蚣

の咬瘡】鶏冠血を塗る。(錢相公儀中方) 【蜘蛛の咬瘡】同上。【蜈蚣の毒に中りたるも

の】舌が脹つて口から出るものである。雄鶏冠血に舌を浸し、并に咽ふ。(普藥抄)

【諸蟲の耳に入りたるとき】鶏冠血を滴入すれば出る。(勝金)

鶏血 烏鶏、白鶏のものが良し。

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

二八 對口瘡ハ俗ニ云
フクビキリチヤウ。

二九 駁馬ハ牡馬。

【蹠折骨痛、及び痿痺、中惡腹痛、乳難】（別錄）【驢馬を手術する爲に受けた傷、及び馬咬傷を治すにるは、熱血に浸す。（はくでんふす）白瘰癧風、癰瘍風には、雄鷄翅下の血を塗る】（藏器）【熱血を服すれば小兒の下血、及び驚風を治し、丹毒、蠱毒、鬼排、陰毒を解し、神を安じ、志を定める】時珍曰く、肘後の驚邪恍惚を治する大方中にやはり用ゐてある。

附方

舊一、新九。【陰毒】鷄血を熱酒に衝して飲む。【鬼排卒死】烏雄雞血を心

下に塗れば甦る。（風俗通）【あるゆる蠱毒を解す】白鷄血を熱飲する。（廣記）【驚風で

意識不明となつて回復せぬもの】白烏骨雄鷄の血を唇に抹すれば回復する。（集成）

【縊死者のまだ絶命せぬもの】鷄血を喉下に塗る。（千金）【黃疸で重體のもの】半斤

の大雄鷄の背を破開し、毛を去らずに熱血を帶びたまふ患者の胸前に合せ、冷えれ

ば換へる。日に數羽の鷄を換へて用ゐれば積毒を抜き去つて癒える。これに用ゐた

雞は有毒だから食つてはならぬ。犬はやはりこれを食はない。（唐孫思邈方）【筋骨の折

傷】急に雄鷄一羽を刺して血を取り、患者の酒量を量つて或は半椀に和して飲む。痛

は立ろに止んで神驗がある。（青囊）【雜物の昧目】出ぬものには、鷄肝血少量を滴せ

ば出る。(聖惠) 【蚰蜒の耳に入りたる時】生油で鶏心血を調へて滴せば出る。(綱鑑)

【金瘡の腸出】乾いた人尿末を抹して桑皮線で縫合し、熱鶏血を塗る。(生生編)

肪 烏雄鶏のものが良し。【氣味】【甘し、寒にして毒なし】 【主治】【耳聾】

(別錄) 【禿頭病で髪が落ちるもの】(時珍)

附方 新一。【年久しき耳聾】鍊成した鶏肪五兩、桂心十八銖、野葛六銖を共

に文火で煎じ、三沸して滓を去り、棗ほどづつを葦筒に入れて炙き溶し、耳中に傾け入れる。かく十日間繼續すれば長さ一寸ばかりの聾聵が自ら出る。(千金翼)

腦 白雄鶏のものが良し。 【主治】【小兒の驚癇。灰に焼いて酒で服すれば難産

を治す】(蘇恭)

心 烏雄鶏のものが良し。 【主治】【(三〇五邪)(別錄)

肝 雄鶏のものが良し。 【氣味】【甘く苦し、溫にして毒なし】時珍曰く、微毒

あり。内則に『鶏を食ふには肝を去る。人を利せざるためだ』とある。

主治 【陰を起す】(別錄) 【腎を補し、心腹痛を治す。漏胎下血を安ずるには、

一羽分を切つて酒五合に和して服す】(孟詵) 【風虛目暗を療す。婦人の陰蝕瘡を治す

(二〇五邪)ハ風、寒、濕、癘、飲食、或ハ癘ヲ除キ暑ヲ入ル。

るには、切片して挿入する。蟲を引き出し盡して良し。【時珍】

附方

新三。

【陰痿不起】雄鷄肝三羽分、兔絲一升を末にし、雀卵で和して小豆大の丸にし、一日二回、二百丸づつを酒で服す。【千金】

【肝虛目暗】老人の肝虛目暗には、烏雄鷄肝一羽分を切つて豉と米とを和し、羹を作り粥を煮て食ふ。【養老書】

【睡眠中の遺尿】雄鷄肝、桂心等分を搗いて小豆大の丸にし、一日三回、一丸づつを米飲で服す。遺精には白龍骨を加へる。

膽

烏雄鷄のものが良し。

氣味

【苦し、微寒にして毒なし】

主治

【目の明かならぬもの、肌瘡】別錄【月蝕瘡の耳根を遶るには、一日三回塗る】孟詵

【燈心に薰けて胎赤眼に點けるが甚だ良し。水に化して痔瘡に塗るも有效だ】時珍

附方

新四。

【沙石淋瀝】雄鷄膽の乾いたもの半兩、鷄屎白を炒つて一兩を研勻し、溫酒で一錢を服す。利するを度とする。【十便良方】

【耳痛、眇目】黑雌鷄の膽汁を一日三回づつ塗る。【聖惠】

【眼熱で涙を流すもの】五倍子、蔓荊子の煎湯で洗つて後、雄鷄膽を點ける。【摘玄方】

【沙塵の眯目】鷄膽汁を點ける。【醫說】

腎

雄鷄のものが良し。

主治

【鬚鼻の臭きには、一對を二、三、臍前の肉と等分

ニ脾映 臍ナリトアリ。

(二) 臍脘ハトリノ胃。
(三) 臍ハトリノ胃。

(二四) 痢、大觀ニ利ニ作ル。
(二五) 大觀ニ頻ナ利ニ

に豉七粒を入れ、新瓦で焙じ研り、鶏子清で和して餅にし、鼻前に置いて蟲を引き出す。陰人、鶏、犬に見られることを忌む【十便良方】

嚔

主治

【小便の禁ぜぬもの、及び氣噎して食物の消化せぬもの】(時珍)

附方

新三。

【噎して食物の通らぬもの】鶏嚔の中に食物の入つたまま二箇を濕紙で包み、黃泥で固濟して煨いて性を存して末にし、木香、沈香、丁香の末各一錢を入れ、棗で和して梧子大の丸にし、三丸づつを汁で服す。【小便の禁ぜぬもの】雄鶏の喉嚔、及び臍脘、并に尿白等分を末にし、麥粥清で服す【衛生易簡方】【發背腫毒】鶏嚔、及び臍内黃皮を焙じ研り、濕へるものには乾して摻り、乾けるものには油で調へて搽る。(醫林正宗)

臍脘裏の黃皮

一名 鶏内金

臍脘の音は脾鳴(ヒシ)である。鶏の臍のことだ。

近世では一般にそのまま臍内の黃皮と呼ぶことを諱んで鶏内金と呼ぶ。男には雌のものをを用ゐ、女には雄のものをを用ゐる。

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【洩痢、小便を頻りに

遺するもの。熱を除き、煩を止める】(別錄)【泄精、竝に尿血、崩中帶下、腸風瀉血

作ル。
ニテ大觀ニ遺下ニ湯
字アリ。

を止める」(日華)『小兒の食滯を治し、大人の淋漓、反胃を療じ、酒精を消し、喉閉、乳蛾、一切の口瘡、牙疳、諸瘡を治す』(時珍)

附方

舊二、新十八。

【小便遺失】鷄臙脰一羽分、竝に腸を焼いて性を存し、酒

で服す。男は雌を用ゐ、女は雄を用ゐる。(集驗)『小便淋瀝』忍び難く痛むには、鷄

臙脰の黃皮五錢を陰乾し、焼いて性を存して一服となし。白湯で服す。立ろに瘥え
る。(醫林集要)『膈消飲水』鷄內金を洗つて晒し乾し、栝樓根を炒つて五兩を末にし、

糊で梧桐子大の丸にし、一日三回、三十丸づつを溫水で服す。(總錄)『反胃吐食』鷄

臙脰一羽分を焼いて性を存し、酒で調へて服す。男は雌を用ゐ、女は雄を用ゐる。

(千金)『酒積を消化し導く』鷄臙脰、乾葛を末にして等分を麵糊で梧桐子大の丸にし、
五十丸づつを酒で服す。(袖珍方)『禁口痢疾』鷄內金を焙じ研り、乳汁で服す。『小兒

の瘡疾』鷄臙脰黃皮を焼いて性を存し、乳で服す。男は雌を用ゐ、女は雄を用ゐる。

(千金)『喉閉乳蛾』鷄臙脰黃皮を洗はずに陰乾して焼いて末にし、竹管で吹入る。直ち

に破れて癒える。(青囊方)『一切の口瘡』鷄內金を灰に焼いて傅ける。立ろに效があ

る。(活幼新書)『鷄口白瘡』鷄臙脰黃皮を末にし、半錢を乳で服す。(子母秘錄)『走馬牙疳』

經驗では、鶏肺黄皮の水に落さぬもの五箇、枯礬五錢を研つて搽る。立ろに癒える。

○心鑑では、鶏肺黄皮を燈火の上で焼いて性を存し、枯礬、黄柏末等分、麝香少量を入れ、先づ米泔で洗ひ漱いで後に貼る。【陰頭の疳蝕】鶏内金を水に落さずに拭き淨め、新瓦で焙じて脆くし、火毒を出して細末にし、先づ米泔水で瘡を洗つてから搽る。また口瘡をも治す。(經驗方)

【穀道に生じた瘡】久しく癒えぬには、鶏脛脛を焼いて性を存し、末にして乾して貼る。神の如きものだ。(總錄)

【脚脛に生じた瘡】雄鶏肺内皮を洗淨して貼り、一日一回易へる。十日にして癒える。(小山奇方)

【瘡口の合はぬもの】鶏脛脛皮を日毎に貼る。【發背の初期】鶏肺黄皮の水に落さぬものを陰乾し、使用時に温水で潤ほし、開いて貼る。乾く都度また潤ほす。三五箇に過ぎずして消く。(楊氏經驗方)

【發背の已に潰れたもの】鶏肺黄皮を綿絮と共に焙じ、末にして搽れば癒える。【金二七顯瘡蝕】初生には米、豆ほどで、久しくすると穿蝕するには、鶏内金を焙じ、鬱金と等分を末にし、鹽漿で漱いだから貼る。米食を忌む。

(三七顯ハ腮ノ誤、金
腮瘡ハ頰腮ニ生ズル
瘡ヲ云フ。

(總錄)【小兒の疣目】鶏肺黄皮で擦れば自ら落ちる。(集要方)【鶏骨の哽咽】活きた鶏一羽を打ち死して鶏内金を取り出し、洗淨して燈草で裹み、火の上で焼いて性を存

し、竹筒で咽中に吹入れば消する。肉を見てはならぬ。(攝生方)

腸

男は雌を用ゐ、女は雄を用ゐる。

主治

【遺溺】小便頻數にして禁ぜぬ

には、焼いて性を存し、三指づつを酒で服す。(別錄)

【遺精白濁、消渴を止める】(時珍)

附方

舊一。

【小便頻りにして遺するもの】心鏡では、雄雞腸一羽分で臘を作

り、酒に和して服す。○普濟では、雄雞腸を水で煮て、一日三回その汁を服す。

肋骨

烏骨鶏のものが良し。

主治

【小兒が羸瘦して食事を攝つても肌を生

ぜぬもの】(別錄)

附方

新二。

【小兒の顛陷】

臟腑の壅熱が原因で氣血の働きの十分ならぬた

めである。烏骨鶏一兩を酥で黄に炙き、生地黄を焙じて二兩と末にし、半錢づつを

引飲で調へて服す。(聖惠方) 【瘡中に朽骨あるもの】久しく経過した痘、久しく經

過しか漏で、中に朽骨あるには、烏骨鶏の脛骨に砒石を填實し、鹽泥で固濟して赤

く煨き、毒を出し、骨を研末して飯で粟米大の丸にし、一粒づつを白紙に攤り込ん

で竅中に送入し、拔毒の膏藥で封ずる。その朽骨は自ら出る。(醫學正傳)

距 白雄鶏のものが良し。

主治

【難産には、焼き研つて酒で服す】(蘇恭)

(二八)引飲ハ吸飲器ノ
コトナラン。

【骨哽を下すには、鶏足一羽分を灰に焼いて水で服す】（時珍）記載は外臺にある。

翻翹

白雄鶏のものが良し。

主治

【血閉を下す。左翹毛は能く陰を起す】（別

錄）

【婦人の小便の禁ぜぬものを治し、陰癰を消し、骨哽蝕、癰疽を療ず。小兒の

夜啼を止めるには、その母の氣づかぬやうに席下に置く】（時珍）

發明

時珍曰く、翹翹は、形が鋭くして飛揚の場合にそこに力を集中する部

分である。故に能く血を破り、腫を消し、癰を潰し、哽を下すのだ。按ずるに、葛洪は

『凡そ古井、及び五月には井中に毒がある。そのまゝ直ちに中に入つてはならぬ。入

れば直ちに死ぬものだ。豫め鶏毛を落して試みるがよし、毛が直下に落ちるときは

毒がないが、回旋してゐるものならば毒がある』といつた。又、感應志には『（五

西の日に白鶏の左の翹を灰に焼いて揚げると風が立ろに吹いて来る。黒犬の皮毛を

灰に焼いて揚げれば風が立ろに止む』とある。巽を風となし、鶏を巽に屬すといふ

はこれでも知られる。

附方

舊二、新七。【斗ほどの陰腫】鶏の翹毛の一孔に二本生えたものを灰に焼

いて飲服する。左腫には、右翹を取り、右腫には、左翹を取り、雙方腫れたるに

（二九）五ハ五行チ云フ、
酉ハ老ナリト云フ、
五行ハ木火土金水ナ
レバ、七曜中日月チ
餘キタル特別、日チ
五酉日トイフナルベ
シ。

（三〇）犬觀ニハ右チ左

ニ作ル。

(二二)大觀ニハ左ナ右

ニ作ル。

(二三)大觀ニハ古今錄

驗ニ作ル。

(二四)大觀ニハ毛字下

ニ各一莖ノ三字アリ。

(二五)大觀ニハ經驗後

方ニ作ル。

は雙方の翹を取る。(肘後方) 【突然の陰腫痛】（時珍） 鷄翹六本を焼いて性を存し、蛇牀子末

と等分をその左右に随つて傳ける。（三三） (肘後方) 【婦人の遺尿】雄鷄翎を灰に焼き、一

日三回、方寸匕を酒で服す。（千金翼） 【咽喉骨哽】白雄鷄の左右翹の大毛各一本を灰

に焼き、水で服す。（外臺） 【腸内に癰の生じたるもの】雄鷄頂上の毛、并に尿を焼い

て末にし、空心に酒で服す。（千金） 【鍼の代用として癰を決する】白鷄翹下の兩方の

第一番目の（三三） 毛を灰に焼き、水で服す。直ちに破れる。（三四） (外臺) 【蜀椒の毒を解す】

鷄毛を焼いて烟を吸ふ。并に水で一錢を調へて服す。（千金方） 【馬汗の瘡に入つたも

の】鷄毛を灰に焼き、酒で方寸匕を服す。（集驗方） 【蠅螻尿瘡】烏鷄の翹毛（時珍）を灰に焼

き、油で調へて傳ける。蟲は鷄を畏れるものだからである。（項辭錄）

尾毛

主治

【刺の肉中に入りたるには、十四本を男兒を産んだ母の乳で和し

て封ずれば出るものである】（孟詵） 【蜀椒の毒を解するには、烟に焼いて吸ふ。并に

水で灰を調へ服す。又、小兒の痘瘡（時珍）後に生じた癰を治するには、焼灰を水で和して

附方

新一。

【小便の禁ぜぬもの】雄鷄翎（時珍）を焼いて研り、方寸匕を酒で服す。

（外臺祕要）

尿白 雄鶏の尿には白がある。臘月ろうげつに取り收める。白鶏にして鳥骨のものの尿が更に良し。素間には鶏矢と書いてある。

氣味 【微寒にして毒なし】

主治

（三五）大觀ニ（本經）ノ
二字アリ。
（三六）白虎風ハ急性關
節儼麻質斯。

【消渴、傷寒寒熱しんご、石淋を破る。及び轉筋。小便を利し、遺尿を止め、癰痕を滅す】（六別錄）【中風の失音、痰迷たんめいを治す。炒つて服すれば小兒の客忤、蠱毒を治し、（三六）白虎風を治す。風痛に貼る】（日華）【賊風、風痺を治す。血を破るには黑豆に和して炒り、酒に浸して服す。また蟲咬毒を治す】（醫器）【氣を下し、大、小便を通利し、心腹鼓脹こちやうを治し、癰瘕うようかを消し、破傷中風、小兒の驚啼を療す。水で取つた淋汁を服すれば金、銀の毒を解す。醋で和して蜈蚣ごこう、蚯蚓きうじんの咬毒に塗る】（時珍）

發明

頌曰く、按ずるに、素間に『心腹が滿し、朝は食事を攝とるが暮には攝取不能なるを鼓脹こちやうと名ける。これを治するには鶏屎醃けいしえんを以てし、一劑にして反應があり、二劑にして已む』とあり、王冰の註に『本草には、鶏屎は小便を治すとあるが、蠱脹こちやうを治すとはしてない。今の方法では、湯に漬けて服することになつてゐるだけだ』とある。

（三七）范汪ハ字ハ玄平
東晉潁陽ノ人。
（三八）青龍ハ曹魏ノ文
帝ノ年號。

時珍曰く、鼓脹は濕熱から生じ、また積滯しやくたいから成るものもある。鶏屎は能く氣を下し、積を消し、大、小便を通利するものだから鼓脹を治するに特殊な効果があるのであつて、これは岐伯の神方である。醴ちとは一夜にして始めて發醇はつかうしたばかりの酒醢しゅはいのことだ。又按ずるに、（三七）范汪の方に『宋の（三八）青龍年間に、司徒の下僚の顔奮といふものの娘が風疾に苦み、一方の髀すねが偏痛したが、ある人が、地に坑を掘り、鶏屎、荊葉を取つてその中で燃し、脛をその中に入れて薰ずると、長い蟲が出て遂に癒えた』とある。

附方

舊十四、新三十。

【鶏矢醴けいしち】普濟方に『鼓脹こちやうで朝には食ふが暮に食はれる

ものを治す。この病は脾虛のために水の處分が十分でなく、水が反つて土に勝ち、水、穀の營養分が十分に運行せず、氣が宣流せぬところから中滿を起し、その脹が沈し、實して滑するものである。これには鶏矢醴を主として用ゐるがよし』とある。何大英は『諸種の腹の脹大するものはみな熱に屬する。精氣が膀胱ぼうくわうに滲入じんにふし得ずして別に腑に走り、皮裏、膜外に溢れるから脹滿となつて小便が短く澀るのだ。鶏矢は性が寒であつて小便を利す。誠に萬全不傳の寶だ』といつた。臘月の乾いた鶏矢

白半斤を袋に盛り、酒醕しゅう一斗の中に七日間漬け、一日三回、三盃づつを溫服する。
或は末にして二錢を服するもよし。○宣明では、鷄矢かうじん、桃仁とうじん、大黃だいおう各一錢を水で煎じて服す。○正傳では、鷄矢を炒つて研り、沸湯で淋汁を取り、木香もくかう、檳榔末びんろう二錢を調へて服す。○ある方では、鷄矢、川芎せんきう等分を末にし、酒糊で丸にして服す。

【牽牛酒】鼓脹と、氣脹と、濕脹と、水脹等とに拘らず、一切の肚脹、四肢の腫脹を治す。峨嵋山がみざんのある僧がこの方を用ゐて一般人の治療に效を擧げた。治療を受けた患者が牛を牽いて行つて謝禮をしたといふところから牽牛酒と名けたものだ。乾鷄矢一升を黃に炒り、酒醕三椀で一椀に煮て濾して汁を飲む。少頃して腹中の氣が大いに轉動し、利下する。それで脚下から皮が皺んで消くものだ。なほ消し盡さぬときは隔日に再び試み、同時に田羸てんり二箇を滾る酒の中へ入れて淪ゆでて食ひ、後に白粥を食つて適度に處置する。（積善堂經驗方）【小兒の腹脹】黃瘦するには、乾鷄矢一兩、丁香一錢を末にし、蒸餅で小豆大の丸にし、一日三回、十丸づつを米湯で服す。（活幼全書）【心腹の鼈瘕】及び宿癥、并に突然起つた癥には、白雄鷄を飯で飼つて糞を取り、小便と共に瓦器に入れて黃に熬つて末にし、一日四五回、方寸匕づつを溫酒で

服す。或は雜飯で飼つたものを用ゐ、消するを度とするも佳し。(集驗方) 【米を食つて寢となつたもの】好んで生米を食ひ、口中から清水を出すには、鷄矢、白米各半合を共に炒つて末にし、水一鍾で調へて服す。良久して米のやうな形のものを吐出して瘥える。昔、愼恭道がこれを病んで勞のやうな状態に飢瘦したとき、蜀の僧道廣がこの處方を用ゐて治癒した。(醫說) 【反胃吐食】鳥骨鷄一羽を四五日間食物を與へず水のみを與へ、五蒲蛇ごほじや二條を竹刀で切つて與へて食はせ、排糞するを待つて取り、陰乾して末にし、水で粟米大の丸にし、一分づつを桃仁湯で服す。五七服にして癒える。(證治發明) 【諸菜の中毒】發狂し、吐下し、死せんとするには、鷄矢を燒いて末にし、水で方寸匕を服す。(葛氏方) 【石淋疼痛】鷄矢白を日中に乾して半乾にし、香しく炒つて末にし、一日二回、方寸匕をこ酸漿さんしやうで飲服する。石を下出するものだ。(古今錄驗) 【小兒の血淋】鷄矢尖白けいしせんぱくの粉のやうな部分を炒つて研り、糊ろくづで大豆大の丸にし、三五丸づつを酒で服す。四五服で效がある。【産後の遺尿あなう】禁ぜぬには、鷄矢を灰に燒いて方寸匕を酒で服す。(產寶) 【轉筋てんきんの腹に入りたるもの】その患者の臂、脚が直くすくみ、脈の上下微弦するには、鷄矢を末にし、水六合で方寸匕を和

して溫服する。(張仲景方)

【中風寒痺】口噤し、人事不省なるには、鷄矢白一升を黃

に炒り、酒三升を入れて攪かきませ、澄清ちやうせいして飲む。(葛氏) 【白虎風痛】詵曰く、飯を

患部に鋪ふいて丹雄鷄に食はせ、良久して熱蕪なつせきを取つて封じ、取り訖なつてから患者の

寢臺の下に伏せしめる。【破傷中風】腰脊反張ようせきはんちやうし、牙緊口噤し、四肢強直するには、

鷄矢白一升、大豆五升を黃に炒つて酒を沃なぎ、微さし煮て豆を澄すみ沈ませ、量を計つ

て飲み、汗を取り風を避ける。(經驗方) 【産後の中風】口噤し、痙攣けいれんし、角弓反張す

るには、黑豆二升半を鷄矢白一升と共に炒熟せうじやくし、清酒一升半を入れて浸して一升を

取り、竹瀝ちやくりきを入れて服して汗を取る。(產寶) 【角弓反張】四肢不隨にして煩亂し死せ

んとするには、鷄矢白一升、清酒五升を搗つき篩ふるつて合せ、それを千回せんかい均くみ揚げて飲

む。大人は一升を服し、小兒は五合を服す。一日二服。(肘後) 【小兒の口噤】顔色の

赤くなるのは心に屬し白くなるは肺に屬する。鷄矢白を棗さうの太いさほど綿に裹み、

水一合で煮て二回に分服する。ある方では酒に研つて服す。(千金方) 【小兒の緊唇きんしん】

鷄矢白を研末して傳つたけ、涎が出たときは易へ去る。(聖惠) 【小兒の驚啼きやうてい】鷄矢白を灰

に燒き、二字を米飲で服す。(千金方) 【頭風の痺木】臘月の烏鷄矢一升を黃に炒つて

【同】大觀ニ痛上ニ安
字アリ、處下ニ咬ノ
字アリ。

【同】大觀ニ雄ニ作ル。
【同】大觀ニ五ノ上ニ
取ルノ字アリ。
【同】大觀ニ續下全方
ニ作ル。

末にし、絹袋に盛つて三升の酒中に漬け、頻りに溫服して醉はしめる。【千金方】「喉
痺腫痛」鶏矢白を含んで汁を嚥む。【聖惠】「牙齒の疼痛」鶏矢白を焼いて末にし、綿
で裹んで痛む處で咬む。立ろに瘥える。【經驗方】「鼻血の止まぬもの」鶏矢の白色
の半截あるものを取つて灰に焼いて吹く。【唐氏經驗方】「牙齒の生えぬもの」大人、小
兒に拘らず、雄鶏矢、雌鶏矢十五顆を焙じて研り、麝香少量を入れ、先づ齒根を針
で挑破して血を出して傳ける。老年者も二十日を過ぎず、少年者は十日にして必ず
生える。○普濟では、ただ烏鷄雌雄の糞に舊い麻鞋底を焼いて性を存して等分を入
れ、麝香少量を入れ、三晝夜休まず擦つて熱せしむるが佳し。察院の李亮卿は嘗て
用ゐて奏效した。【耳が聾して聽えぬもの】鶏矢白を炒つて半升、烏豆を炒つて一升
を熱した無灰酒二升到投入して服し、汗を取る。耳が鼓のやうに鳴るが危惧するに及
ばぬ。【外臺】「面目の黃疸」鶏矢白、小豆、秣米各二分を末にし、三回に分けて水で
服す。黃汁が出るものだ。【肘後方】「胎兒死亡」雌鷄糞二十一箇を水二升、五合
で煮て米を入れ、粥にして食ふ。【產寶】「乳妬、乳癰」鶏矢白を炒つて研り、酒で
方寸匕を服す。三服で癒える。【產寶】「乳頭破裂」方は上に同じ。【內難の未だ成らぬ

（自四）戸脚ハ脚ノ踝
（クロアシ）ガ拆ケ破
ルル病。

もの』伏鶏屎を取つて水に和して服すれば瘥える。（千金）【頭瘡白禿】雄鶏屎末を陳
醬、苦酒で和して洗ふ。（千金）【癰痕を消滅する法】豬脂三升で烏鶏一羽を飼ひ、三日
後に矢を取り、白芷、當歸各一兩を共に煎じて十沸し、滓を去つて鷹矢白半兩を入
れて調へて傳ける。（外臺）【耳中の惡瘡】鶏矢白を炒り研つて傳ける。（聖惠）【癰癤瘰
瘡】雄鶏矢を灰に焼き、臘猪脂で和して傳ける。（千金）【金を食つて中毒したもの』
已に死したるには、鶏矢半升を取つて水で淋汁を取り、一升を飲む。一日三回。（肘
後方）【縊死者の未だ絶命せぬもの』鶏矢白を棗の大いさほど酒半盞に和して口、鼻、
から灌ぐ。（肘後）【自四】戸脚で折裂せるもの』冬となく夏となく起るものには、鶏屎を
煮た湯に半日漬け、瘥えたらならば止める。（千金）【射工溪毒】白鶏矢の白きもの二箇
を錫で和して瘡上に塗る。（肘後）【骨疽の合はぬもの』骨が孔中から出るものには、
地坑を口小さく内大きく深さ三尺に掘り、乾鶏屎二升を艾、及び荊葉と共に搗き碎い
てその坑中に入れ、焼いて烟を出し、疽口をそれに就けて熏じ、衣服で擁ふて氣の
洩れぬやうにする。半日にして蟲が出るものだ。甚だ有効である。（千金方）【陰毒腹
痛】鶏糞、烏豆、地膚子各一把、亂髮一團を共に炒つて烟を起て、好き酒一椀に傾

(同)木村(重)曰ク、
鶏子ハ鶏卵、雞蛋(チ
ータン)ト稱ス。卵
子(ランツ)ハ卵ニ非
ズ器丸ナリ(俗稱)

(同)道戸ハ癆瘵ノ一
種。

け入れて浸し、滓を去つて熱服すれば止む。(生生編) 【小兒の心痛】白烏骨鶏屎五錢を晒して研り、松脂五錢と末にし、葱頭汁(そうとうじゅう)で和して梧子大の丸にし、黃丹(わうたん)を衣にかけ、五丸づつを醋湯で服す。生物、冷物、硬物を忌む。三四日にして立るに效がある。(嬰童百問)

(同)鶏子 即ち鶏卵である。黃雌のものを上とし、烏雌のものはこれに次ぐ。

氣味

【甘し、平にして毒なし】思邈(しひやく)曰く、微寒なり、醇醋(じゆんさく)を畏る。鼎(てい)曰く、

多く食ふと人の腹中に聲あらしめ、風氣を動ぜしめるものだ。葱(そう)、蒜(さん)と和して食へば氣短となり、韭子(きうし)と共に食へば風痛を成し、鼈肉(べつにく)と共に食へば人體を損じ、獺肉(たうにく)と共に食へば(同)道戸(どうと)と成り、兎肉と共に食へば洩痢となり、妊婦が鶏子、鯉魚と共に食へば生兒に瘡を生ぜしめ、糯米と共に食へば生兒をして蟲を生ぜしめる。時珍(じしん)曰く、小兒が痘疹(たうしん)を患つたときは鶏子を食ふことを忌む。また煎食する臭氣を聞けば翳膜(えいまく)を生ぜしめる。

主治

【熱火灼爛瘡、癰瘻(かんし)を除く。虎魄(こはく)に作り、神物を作り得る】(別錄) 弘景曰く、これを作るに用ゐるには、曬(あび)した鶏子で黃と白が混雜したものが適當であつ

て、煮て作るものだ。極めてよく似たものになるが、ただ芥を吸ひ付けぬだけである。又、煮た白を銀と合せて口に含めば須臾にして金のやうな色になる。『心を鎮め、五臓を安じ、驚を止め、胎を安じ、妊婦の天行熱疾で狂走するもの、男子の陰囊濕痒を治し、また喉聲失音を聞く。醋で煮て食へば赤白久痢、及び産後の虚痢を治す。

（白セ）光粉ハ粉錫、即
オシロイ。

（白セ）光粉と共に炒り乾したものは疳痢、及び婦人の陰瘡を治す。豆淋酒に和して服すれば賊風、麻痺を治す。醋に浸して壊れしめて疵野に傳ける。酒にして用ゐれば産後の血運を止め、水臓を暖め、小便を縮め、耳鳴を止める。蠟に和して炒つて用ゐれば耳鳴聲、及び疳痢を治す。〔日華〕『氣を益す。濁水で一箇を煮て水共に服すれば産後の痢を治す。蠟に和して煎じて用ゐれば小兒の痢を止める。』〔藏器〕『小兒の發熱には、白蜜一合に三顆を和して攪きまぜて服すれば立ろに瘥える。』〔孟詵〕太平御覽に『正月元日の朝、烏鷄子一箇を吞んでその身形を練る』とあり、崎嶇神書に『八月晦日の夜半、北に面して烏鷄子一箇を吞めば、何事かあつた場合に形を隠し得る』とある。

發明

時珍曰く、卵白は天に象り、その氣は清み、その性は微寒である。卵

黄は地に象り、その氣は渾り、その性は温である。卵といへばその黄と白を兼ねたものであつて、これを用ゐればその性は平である。精不足のものはこれを補するに氣を以てするものだ。故に卵白は能く氣を清し、伏熱、目赤、咽痛の諸疾を治するのである。形不足のものはこれを補するに味を以てするものだ。故に卵黄は能く血を補し、下痢、胎産の諸疾を治するのである。卵全體としては氣と血とを兼理するものだから上記の諸疾を治するのである。

附方

舊八、新二十三

【天行の解せぬもの】已に汗したるものには、生んだばかりの鶏子五箇を盞中に傾け入れ、水を鶏子一箇の量ほど入れて攪渾し、水一升を煮沸した中に投じ、少量の醬を入れて吸り、汗を出さすれば癒える。(許仁則方) 【天行嘔逆】食物が入れば直ちに吐くには、鶏子一箇を水で煮て三五沸し、冷水に浸して少頃して吞む。(外臺) 【傷寒發狂】煩燥し、熱の極端なるには、生鶏子一箇を吞めば效がある。(食鹽) 【三十六黃】急救方では、鶏子一顆を殻のまま灰に焼いて研り、酢一合で和して温服する。鼻中から蟲が出て奏效する。身體の極めて黄なるものも三箇に過ぎずして神效がある。(外臺秘要) 【白虎風病】藏器曰く、鶏子を取つて病處に

摺り、咒文を唱へて糞を頭上うづかみに堆つく積む。三回に過ぎずして瘥える。白虎とは糞神のことであつて、好んで鷄子を喫ふものだ。【身體、面部の腫滿】鷄子の黄と白を相和して腫れた部分へ塗り、乾けば再び塗る。(肘後方) 【年月久しき哮喘わづぜん】鷄子を少し敲たたいて損し、三四日間尿缸ぬちうぎやう中に浸して煮て食ふ。能く風痰を去る。(集成) 【心氣痛】鷄子一箇を打ち破り、醋二合で調へて服す。(肘後) 【小兒の疳痢】肚脹するには、鷄子一箇に孔を開けて巴豆一粒、輕粉一錢を入れ、紙で五十重に裹つつんで飯の上で三回蒸し、放し冷して殻を去り、研つて麝香少量を入れ、糊で和して米粒大の丸にし、二丸乃至三丸を食後に溫湯で服す。(經驗方) 【痘毒の預解よげ】保和方では、鷄卵一箇を用ゐ、活きた地龍一條をその卵の中へ入れて飯の上で蒸し熟し、地龍を去つて卵を小兒に與へて食はせる。立春の日に一箇を食へば終身痘が出ない。○李氏の方では、鷄卵一箇を七日間童尿に浸し、水で煮て食ふ。永く痘が出ない。○李捷は、頭生の鷄子三五箇を厠坑しやく内に五七日間浸して取出し、煮熟して與へて食はせ、數日後に再び一箇を食はせた。永く痘が出ない。徐都司が浙地方の人から傳へた方である。【痘瘡赤癰】鷄子一箇を酒醅びやくそうざんに七日間浸し、赤く揩つて

塗る。甚だ有效だ。(聖惠)「雀卵面炮」じやくらんめんほう 鶏卵を醋に浸し、壞して取出して傅ける。

(聖惠)「妊娠時疾」冷胎で動せぬには、鶏子七箇を井中に入れて冷し、取出して打ち破つて吞む。(子母秘錄)「母體病氣の場合の墮胎法」鶏子一箇に鹽三指撮を入れて服す。(張文仲方)

「胎動下血」藏器曰く、鶏子二箇を打破り、白粉を和稀して食ふ。「胎

兒死亡」三戸の家の鶏卵各一箇、三戸の家の鹽各一撮、三戸の家の水各一升を共に煮て、その妊婦をして東に向つて飲ませる。(千金方)「産後に血の多きもの」止まぬ

には、烏鶏子三箇、醋半升、酒二升を攪さませ、一升到煮取つて四回に分服する。(拾遺)「産後の心痛」鶏子を酒で煮て食ふ。直ちに安らかになる。(備急方)「産後の口

乾」舌の縮まるには、鶏子一箇を打破り、水一盞と攪拌して服す。(同八(經驗方))「婦人

の白帶」酒、及び艾葉を用ゐて鶏卵を煮て日毎に食ふ。(袖珍方)「頭風白屑」づふうはくせつ 生みた

ての鶏子三箇を沸湯五升に攪和し、三回に分けて沐するが甚だ良し。(集驗)「腋下胡臭」しう 鶏子二箇を煮熟し、殻を去つて熱きまゝ夾み、冷えるを待つて三叉路に棄てる。(金匱要略)

回顧してはならぬ。三回試みれば效がある。(肘後方)「乳石の發渴」鶏子を水に浸し

て清を取り、生で服す。甚だ良し。(總錄)「野葛の毒を解す」已に死したる場合には、

(同前、大觀ニ方上ニ後
字アリ)

（因丸血ハ油ノ誤ナラ
シ。）

物で口を開けて後に鷄子三箇を灌ぐ。須臾にして野葛を吐出して甦る。（肘後方）【胡蔓野毒】これは斷腸草のことであつて、葉一枚口に入ればあらゆる身竅から血を流すものである。ただ急に鳳凰胎——即ち鷄が抱いてまだ雛にならぬもの、已に雛となつたものは用ゐない——を研り爛らし、麻血で和して灌ぐ。毒物を吐出して復活する。少し手遅れれば死ぬ。（嶺南衛生方）【癰疽發背】發生の初期、及び十日以上を經過して赤腫し熾熱し、晝夜疼痛し、あらゆる藥も效なきには、鷄子一箇を新狗屎を鷄子の大きいさほどと攪き勻ぜ、微火で蒸つて適度に稀糊し、捻つて餅にして腫の頭に貼り、帛で包抹し、時時に看視してその餅が熱するを覺えたときは易へる。動かし、又は藥の氣を歇めてはならぬ。一夜を経れば定まるものだ。もし日數多くかかる場合には、三日これを貼つて一日に一回易へる。瘡をたならば止める。この方は實行上甚だ穢惡なものだから高貴の人には用ゐかねるが、あらゆる方法でいづれも奏效しなかつた場合のために備へて置く必要がある。（千金方）【蛛、蠍、蛇傷】鷄子一箇を軽く敲いて小孔を開け、それを傷に合せれば立ろに瘡える。（兵部手集）【蠅螋尿瘡】上記の法に同じ。【身體の發熱】大人、小兒に拘らず、鷄卵三箇、白蜜

一合を和して服すれば立ろに瘥える。(普濟方)

卵白

氣味

【甘し、微寒にして毒なし】

主治

【目熱赤痛。心下の伏熱

を除き、煩滿、欬逆、小兒の下泄を止める。婦人の難産で胞衣の出ぬもの。いづれも生で吞む。醋に一夜浸して用ゐれば、黃疸わうだんの破れて大いに煩熱するを療ず】(別錄)

(五)大觀ニ一半ヲ如
白之半ノ四字ニ作ル。

【産後の血閉で下らぬには、白一箇を取つて醋五一半に入れ、攪きまぜて服す】(藏器) 【赤小豆末を和して一切の熱毒、丹腫、癰痛さいつうに塗るが神效がある。冬期の生みたてのものを酒に漬けて七日間密封し、取り出して毎夜顔に塗れば野驢かんろう、鼈鮑さばうを去り、顔色を悅澤えつぞくならしめる】(時珍)

發明

宗奭曰く、産後の血運で身體が瘧直けいちちくし、口、目が上に向ひて牽急し、

人事不省なるには、鷄子一箇を殻を去つて清を分け、荊芥末二錢を調へて服す。直ちに平安を得ること甚だ敏捷びんせふなものだ。烏鷄子が就中善し。

附方

舊四、新六。

【時行發黃】醋、酒に鷄子を一夜浸し、その白數箇を吞む。

(肘後方) 【下痢赤白】生鷄子一箇の白を取つて紙上に攤し連ねて日光で乾し、摺すつて四重にして肥えた烏梅十箇を包み、熨斗中に置いて白炭で焼いて性を存し、取出し

て碗で覆ひ、よく冷めてから研末し、水銀粉少量を入れ、大人には二服に分け、小兒には三服に分けて空心に井華水で調へて服す。もし微し利するを覺えたならば再服するに及ばぬ。(類證) 【蛇蟲の攻心】口に清水を吐くには、鷄子一箇を黃を去り、好き漆を納れ、鷄子殼中に入れて和合し、頭を仰いで吞む。蟲は直ちに出るものだ。(古今錄驗) 【五種の通戸】その状態は、腹脹し、氣急して心に冲し、或は礫磈が涌起し、或は腰脊に牽くものである。鷄卵白七箇を頓に吞むが良し。(千金) 【咽喉鼻瘡】及び乾嘔し、頭痛し、食物の下らぬには、鷄子一箇に一竅を開け、黃を去つて白を留め、米酢を著けて燂火で頓に沸して取下し、更に頓に同様に三回繰返し、熱に乗じて飲む。一二回に過ぎずして癒える。(普濟方) 【顔面の皰瘡】鷄子を三歳の苦酒に三晝夜浸し、軟くなるを待つて白を取つて塗る。(肘後) 【湯火燒灼】鷄子清に酒を和して調へて洗ふ。勤めて洗へば肌を生じ易い。發動する食物を忌む。或は主としてこれを傳けるもよし。(經驗秘方) 【頭髮の垢腫】鷄子白を塗つて少頃して洗ひ去る。光澤が出て燥かない。(類淵) 【顔色の黒きを白くする】鷄子三箇を酒に浸して四週間密封し、毎夜その白を顔に傅ければ雪のやうに白くなる。(普濟) 【塗つて顔色の老衰を

禦ぐ】鷄子一箇に孔を開けて黄を去り白を留め、金華胭脂きんくわあざし、及び礪砂たうしや少量を入れて紙で封じ、それを鷄に與へて抱かせ、他の卵が雛になつて出るを俟ち、それを取つて顔に塗る。洗つても落ちず、半年経つても紅顔を持続する。(善瀉)

卵黄

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【醋で煮て用ゐれば産後の

虚痢、小兒の發熱を治す。煎じて食へば煩熱を除く。鍊つて用ゐれば嘔逆おうぎやくを治す。常山末を和して丸にし、竹葉湯で服すれば久瘧を治す(藥性) 【炒つて油を取り、粉に和して頭瘡に傳ける】(日華) 【卒にかの乾嘔には、生で數箇を吞むが良し。小便不通にもやはり生で吞む。數回試みれば效がある。陰血を補し、熱毒を解し、下痢を治し、甚だ效驗がある】(時珍)

發明

時珍曰く、鷄子黄は氣、味俱に厚い。陰中の陰である。故に能く形體

を補するのだ。昔の人がこれを阿膠あけうと同功だと考へたのは正にその關係を見たのであつた。その嘔逆、諸瘡を治するは、熱を除き、蟲を引く效果だけを取るのである。

頤曰く、鷄子は最も多く藥に入れて用ゐるが、髮煎はっせんの方が特に奇效のあるものだ。

劉禹錫の傳信方に『亂髮鷄子膏はこがし孩子の熱瘡を治す。鷄子五箇を煮熟して白を去つて黄を取り、亂髮を鷄子の大きいほどを相和し、鐵銚てつちように入れて炭火で煮る。初め甚だ乾くが、少頃して髪が焦げると液が出る。それをやがて枕中に取り、その液の盡きるまでを度として取つて瘡に塗り、苦參末を粉す。近頃武陵にゐて産まれた子が、まだ産蓐中さんじよくに在つて熱瘡があり、諸種の藥を塗つたが奏效せず、日にますます劇しくなつて半身に蔓延し、晝夜號啼がうていして乳も飲ますることも睡ることも出来なかつたが、その折、本草の髮髮はつぱつの條を見ると「鷄子黄に合せて煎じ、消かして水にしたものは小兒の驚熱、下痢を療ず」とあり、註に「俗中の嫗母おやほは小兒のために鷄子煎を作り、髮を雞へて熬つて良久して出る汁を小兒に與へて服ませると痰熱を去り、病あるを治す」とあり、又、鷄子の條に「火瘡を療ず」とあつたので、それに因つてこの方を用ゐて見ると果して神の如き效を奏した』とある。

附方

舊三、新十一。

【赤白下痢】鷄卵一箇の黄を取つて白を去り、胡粉こふんをその殼に満てて焼いて性を存し、一錢匕を酒で服す。（葛氏方）

【妊娠下痢】絞痛きうつうするには、烏鷄子一箇に孔を開けて白を去り黄を留め、黄丹一錢を入れ厚紙で裹つつんで泥で固め、

煨き乾して末にし、三錢づつを米飲で服す。一服で瘥えるときは胎兒が男である。

二服で瘥えるときは女である。(三因方) 【胎兒死亡】 鷄子黃一箇を薑汁一合に和して

服すれば下るものだ。【小腸疝氣】 鷄子黃を溫水に攪きまぜて服す。三服で效があ

る。【小兒の癰疾】 鷄子黃を乳汁に和して攪せて服す。二三箇に過ぎずして自ら定ま

る。(普濟) 【小兒の頭瘡】 煮熟した鷄子の黃を炒つて油を取り、麻油、膩粉じふんを搽る。

(事林廣記) 【鼠瘻の已に潰れたもの】 鷄卵一箇を米に入れて半日蒸し、黃を取つて熬

つて黒くし、先づ瘡を拭ひ乾してからその藥を孔中に納れる。三回にして瘥える。

(千金方) 【脚上の臭瘡】 熟鷄子黃一箇、黃蠟一錢を煎じてその油を塗る。【湯火傷瘡】

熟鷄子(五)一箇の黃を取つて炒り、その油を取つて膩粉十文を入れて攪きか勻まぜ、三五

日間それを瘡上に(五)搽く。永く癰瘻を除く。(集驗方) 【杖瘡の已に潰れたるもの】 鷄

子黃を熬つてその油を搽る。甚だ效がある。(唐瑞經驗方) 【天泡水瘡】 方は上に同じ。

【癰瘻を消滅する法】 鷄子五七箇を煮熟し、黃を取つて黒く炒り、一日三回づつ拭ひ

塗れば久しくして自ら滅する。(聖惠方) 【妊娠胎滿】 血が下つて止まず、血が盡され

ば胎兒の死ぬものである。鷄子黃十四箇を好き酒二升で館のやうに煮て服す。なほ

金二大觀二十ニ作ル。

金二大觀ニ婦上ノ二
字ヲ用鷄卵掃瘡上ノ
六字ニ作ル。

瘡えぬときは再び試み、瘡えるを度とする。(普濟方) 【汁の出る耳瘡】鷄子黃を炒り、その油を塗る。甚だ妙である。(談禁翁方)

抱出卵殻 時珍曰く、俗に混沌池鳳風蛻と名ける。抱いて雛の出たものを用ゐる

はその蛻脱の意味を取つたものだ。李石の續博物志には『鷄子殻を踏めば白癜風が生ずる』とある。 【主治】 【研末して用ゐれば障翳を磨す】(日華) 【傷寒勞復には、

炒つて黃黑にして末にし、熱湯に和して一合を服す。汗を取り出して瘡える】(蘇頌) 記載は深師方にある。 【灰に燒き油で調へて癬、及び小兒の頭部、身體の諸瘡に塗る。酒で二錢を服すれば反胃を治す】(時珍)

附方

舊二、新七。

【小便不通】鷄子殻、海蛤、滑石等分を末にし、一日三回、

半錢づつを米飲で服す。(聖惠方) 【小兒の煩滿】死せんとするには、鷄子殻を燒いて

末にし、方寸匕を酒で服す。(子母秘錄) 【癰瘡の目に入りたるもの】鷄子殻を燒いて

研り、片腦少量を入れて點ける。(鴻飛集) 【頭瘡白禿】鷄子殻七箇を炒つて研り、油

で和して傳ける。(秘錄) 【頭の軟癰】抱出鷄卵殻を燒いて性を存して研末し、輕粉少

量を入れて清油で調へて傳ける。(危氏方) 【耳瘡で膿の出るもの】抱出鷄卵殻を黃に

（五三）風池ノ穴ハ耳ノ
後ノ髮際ニアリ。
（五四）木村（重）曰ク、
卵殻中白皮ハ外殻膜
ヲ謂フ。

炒つて末にし、油で調へて灌げば疼が止む。（杏林摘要）【玉莖の下疳】鶏卵殻を炒つ

て研り、油で調へて傳ける。（同上）【外腎の癰瘡】抱出鶏卵殻、黃連、輕粉等分を細末

にし、鍊つた香油で調へて塗る。（醫林正宗）【痘瘡の惡證】痘瘡が倒陷し、毒氣が裏

に壅遏するところから便血となり、昏睡して意識回復せず、その證甚だしきものに

は、抱出鶏子殻を膜を去つて新瓦で焙じて研り、半錢づつを熱湯で調へて服す。嬰

兒には、酒で調へて唇舌上に抹し、并に（五五）風池、胸、背に塗る。神效がある。

（五五）卵殻中の白皮 主治 【久効氣結には、麻黃、紫菀と配合して服すれば立ち

に效がある】（別録）

發明

時珍曰く、按ずるに、仙傳外科に『ある者がたまたま口に刀を含んで

舌を割き、已に斷ち落ちぬばかりとなつたが、ある人が鶏子白皮を袋にして用ひ、

舌根に止血藥を摻つて血を止めてから、臘に化した蜜で沖和膏を調へてその鶏子皮

上に敷き、それで三日の間接住して置いてから、その皮を去つてただ蜜臘で勒敷し

たが、七日にして全く平安を得た。若し速效のないときは金鎗藥を摻へて治療する』

とある。此に鶏子白皮を用ゐたのは他に理由があるのではない。ただその柔軟にし

て薄く、舌を護つて藥を透らしめる點を利用したものだ。

附方

新二

【欬嗽の日久しきもの】 鷄子白皮を炒つて十四枚、麻黃三兩を

焙じて末にし、一日二回、方寸匕つづを飲で服す。(必效方) 【風眼腫痛】 鷄子白皮、

枸杞白皮等分を末にし、一日三回、鼻中に吹く。(聖濟總錄)

雞白蠶肥脂(本經)

弘景曰く、これは何物なるや判明せぬ。恐らく別の一種のものだらう。

藏器曰く、現に鷄にはやはり白臺といふものがある。卵のやうで硬く、白があつて黄のないものだ。これは牡鷄が生むもので、父公臺と名けるものだといふ。臺の字は臺の字に似てゐるから、そのためにかく誤り傳はつたものではないかと思ふ。

機曰く、この物は、本經の文には黑雌鷄の條下に列してある。雌鷄の肥脂で蠶蟲の肥白のやうなものを指したらしい。その物が似てゐるところからかく名けたのだ。

時珍曰く、蠶は音妬(ト)である。而るに藏器がこれを臺としたのは何のことか判らない。現に牡鷄の生む子にやはり時とするとかやうな物があるが、しかしそれには肥脂なる文字を當てるいはれはない。これは機の説が事實に近いやうに思はれ

(五五)天絲ハ微細粉末
ノコトナラン。

(五六)燂鷄湯ハ沸湯ニ
鷄ヲ浸シ出來タル湯。

(五七)鷄眼ハウチノメ。

(七)木村(重)曰ク、
支那ニ雉多種アル如
キモ調査完カラズ、
ココニ北支那産ノ雉
ヲ代表トシテ出ス。
野雉(ヤーチー)雉鷄

る。さもなくば雌鷄の生腸を指したものに相違ない。本經にその物名を掲げてあつて、その功を列記してないが、蓋し文中に脱簡があつたのだ。

寔中の草

主治

【頭瘡白禿には、白頭翁草と和して灰に焼き、猪脂で調へて傅ける】(日華) 【(五五)天絲の眼に入りたるには、灰に焼いて清汁を淋し取り、それで洗ふが良し】(時珍) 記載は不自祕方にある。

附方

舊一、新一。【小兒の夜啼】鷄窠草を母の氣付かぬやうに席下に置く。

(日華本草)

【産後の遺尿】鷄窠草を焼いて末にし、一錢ヒを酒で服す。(聖惠方)

燂鷄湯

主治

【消渴で度なく水を飲むには、燂雄鷄水を濾し澄して服す、鷄二羽の水に過ぎずして癒える。神效がある】(楊氏經驗方)

附方

新一。【(五七)鷄眼で痛むもの】皮を剥ぎ去り、燂鷄湯で洗ふ。(簡便方)

雉

(別錄中品)

和名 かうらいきじ
學名 *Phasianus colchicus*, *Karpowii Buturlin*.
科名 きじ(雉科)

釋名

野雞

宗奭曰く、雉の飛ぶ有様は矢のやうで、一飛び前方へ飛ぶと墮

(ズウキ)ノ名ニテ
知ラル。

るものだ。故にその文字は矢に従ふのである。今世間でその尾を取つて舟や車に著けて置くのは、その快速なるにあやからうといふのである。漢の呂太后の名は雉といつたので、高祖が鳥の雉の名を改めて野鷄と呼んだのだといふが、その實は鷄類のものである。

時珍曰く、黃氏の韻會に『雉は理であつて、雉とは文理のある鳥といふことだ。

故に尙書にはこれを華蟲といひ、曲禮にはこれを疏趾といつてある。雉には種類が甚だ多いが、やはりそれぞれ形狀、色彩に因つて區別しただけのものだ』とある。

禽經には『雉は介鳥であつて、質素くして五彩備はるものを鸛雉といひ、質青くして五彩備はるものを鷩雉といひ、朱黄なるを鷮雉といひ、白きを鶡——音は罩(トウ)である。——雉といひ、玄きを海雉といふ』とある。爾雅には『鷩雉、青質にして

五采、鷩雉、黃色にして自ら呼ぶ。翟雉、山雉である。尾長きは鷮雉。長尾くして走り且つ秩秩と鳴くは海雉』とある。楚書には雉を迦頻閣雉といつてある。

集解

時珍曰く、雉は南方、北方いづれにもある。形體は、大いさは鷄ほどで斑色があり、翼は繡いたやうなもので、雉は文彩が明かで尾が長く、雌は文彩が

暗くして尾が短い。その性^{たにかい}を好み、その名を鷺^さといふ。鷺の音は脊^{ハカ}である。

その交尾は再せず、その卵は褐色だ。産卵せんとするときは雌が雄を避^さけて潛伏する。雄にその卵を食はれて了^{しま}ふからだ。月令に「仲冬、雉始めて雄^おく、所謂陽動け



〔雌〕

ば雉鳴いてその頸を勾^かげる。孟冬、雉大水に入つて蜃^{しん}となる。蜃とは大蛤のことだ」とある。陸伯の埤雅には「蛇が雉と交れば蜃を生ず」とある。蜃は蛟^{かうらわ}類である。類書には「蛇が雉と交つて生んだ子を蛟^{かう}といふ」とある。蛟は水蟲である。

陸禪の續水經には「蛇、雉は卵を地に遺^{のこ}し、千年にして蛟となる。龍の屬であつて、蛇に似て四足あり、能く人を害す」とある。魯至剛の倭靈機要には「正月、蛇と雉と交つて卵を生む。それが雷に遇ふと數丈の土中に入つて蛇形となり、二三百年を経て蛟となつて飛騰^{ひとう}する。若しその卵が土中に入らぬときはかだの雉となるだけで

ある』とある。又、任昉の述異記には『江淮中に能——音は耐(タイ)——といふ獸がある。これは蛇精の化したもので、冬になると雉になり、春にはまた蛇になる。晉の時に、武庫ぶこに雉がゐたことがあつて、張華はそれを蛇の化したものに相違ないといつたが、よく注意して見ると果して蛇蛻じやていがあつた』とある。これ等はいづれも類を異にし情を同じうする造化の變化であつて、臆測すべからざるものだ。

肉**氣味**

【酸し、微寒にして毒なし】恭こう曰く、溫なり。日華にっけ曰く、平にし

て微毒あり。秋、冬は益あり、春、夏は毒あり。痢疾のある人は食つてはならぬ。

頤い曰く、周禮に『庖人ほうじんは六禽を供す』とあつて、雉はその一に擧げられてある。

やはり食品としての高貴なものだが、しかし小毒があるから常食はされない。損するところ多く、益するところ少いものだ。

説せ曰く、久しく食へば人をして瘦せしめる。九月から十一月まではやや補するところがあるが、その他の月に食へば五痔、諸瘡疥を發する。胡桃ごたうと食ひ合せば頭風眩運ふうげんうん、及び心痛を發するから食つてはならぬ。菌きん、蕈じん、木耳もくじと食ひ合せば五痔を發して立るに下血する。蕎麥せうばくと共に食へば肥蟲を生じ、卵と葱と共に食へば寸白

蟲を生ずる。自死して爪甲そうかふの伸びぬものは人を殺す。

正誤

思邈しゐく曰く、黄帝の書に『丙午の日には鶏、雉の肉を食つてはならぬ。

男子は焼死し、目盲する。婦人は血死し、妄みだりに性あやしきものを見る。野鶏肉と家鶏子とを共に食へば遁戸さんしとなつて尸鬼が身に纏ふ』とある。

弘景こうけい曰く、雉は辰の屬ではなくして正に離の禽である。丙午の日に食つてならぬといふは、火に主たるものだといふことを明示したものだ。

時珍ししん曰く、雉は離火りくわに屬し、鶏は巽木さんぼくに屬する。故に鶏は煮れば冠が變じ、雉は煮れば冠が赤い。明かに火に屬することを示してゐる。春、夏は食つてならぬといふは、蟲、蟻を食ひ、及び蛇と交り、變化を生じて有毒であるからである。能く痔、及び瘡疥を發し、人をして瘦病さうびやうせしめるといふは、能く蟲を生ずることが鶏肉と同様なものだからである。黄帝の名に假托して出所不明な性しい者が作つた書だから、丙午の日に食つてはならぬとか、遁戸さんしとなるとかいふ不經の謬談びうだんを書いてあるのだが、その説に陶氏が和し、孫氏が採用したのは。いづれも誤である。此にその誤を正して置く。

主治

『中を補し、氣力を益し、洩痢を止め、蟻瘻を除く』(別錄)

發明

時珍曰く、雉肉に就いて、諸家は『痔を發するものだ。下痢の人は食

つてはならぬ』といつてゐる。然るに別錄にこれを用ゐて痢、瘻を治すとあるは問題だが、蓋し雉は禽に在つては上に胃土に應ずるものだ。故に能く中を補するのである。又、蟲蟻を食ふものだ。故に能く蟻瘻を治するのであつて、それは制伏の關係を利用するわけである。しかし久しく食ひ、またはその適當ならぬ時期に食つては、蟲を生じて有毒だから宜しくない。

附方

舊三、新一。『脾虛の下痢』晝夜止まぬには、野鷄一羽を普通の料理の場

合のやうに作り、橘皮、葱、椒、五味を入れて和し、餽飧にして煮て空心に食ふ。

(食醫心鏡)

『産後の下痢』野鷄一羽を餽飧にして食ふ。(同上) 『消渴飲水』小便頻數な

るには、野鷄一羽を五味で煮て三升ほどの汁を取り、それを飲み肉をも食ふ。甚だ

效がある。(同上) 『心腹脹滿』野鷄一羽を雄雌に拘らず、茴香を炒り、馬芹子を炒り、

川椒を炒り、陳皮、生薑と等分を用ゐ、醋で一夜蒸した餅とで雉肉に和して餽料に

し、外部を麪皮で包んで餽飧にし、煮熟して食ふ。かくして早朝に嘉禾散を服して

午前八時頃にこれを服し、正午に尊氣枳殼丸だうききこくわのんを服す。(朱氏集驗方)

腦 主治 【凍瘡に塗る】(時珍)

嘴 主治 【蟻瘻】(孫思邈)

尾 主治 【灰に燒き、麻油で和して天火丹毒に傳ける】(時珍)

尿 主治 【久瘧】(時珍)

附方 新一。【久瘧の止まぬもの】雄野鷄尿いづなん、熊膽、五靈脂、恒山こうざん等分を末に

し、醋糊で黒豆大の丸にし、發作時はつさじに一丸を冷水で服す。(聖惠)

鷄 雄 雌 音は狄(アキ)にある。(食療)

和名 やまどり
學名 *Phasianus scintillus* (Gould)?
科名 きし(雉)科

釋名 鷄鷄(禽經) 山鷄 同上 山雉 時珍曰く、翟てきとは美しい羽の形容で

ある。雉は原野に居り、鷄は山林に居るところから山をつけた名稱があるのだ。大
なものをば鷄けうといふ。

集解 頌曰く、三伊洛いらく、江淮かうわい地方では、一種の雉で小さくして尾の長いもの

(一) 本村(重)曰く、日本ニ普通ノやまどり (Graphophasianus sp.) ト同屬ノモノ産スルガ如ケレドモ、今觀ニ一種ト定メテ移改セ候ゾ。
(二) 伊洛ハ草部鷄草類大綱附論問荊ノ註ニ見ヨ。江淮ハ安徽、江蘇地方。

を山鶏といひ、一般にこれを籠に入れて飼つてゐる。即ち爾雅に所謂『鷓、山鶏なり』とあるそのものだ。

時珍曰く、山鶏と呼ぶものに四種あつて、名は同じだが物は異ふ。雉に似て尾の



〔雄 鷓〕
—— 山 ——

長さ三四尺のものは鷓雉である。鷓に似て尾の長さ五六尺、能く走り且つ鳴くものは鷓雉である。これを俗に通じて鷓と呼んでゐる。その他の二種は鷓雉、錦鷄である。鷓と鷓とはいづれも勇健なもので、自らその尾を愛し、叢林に入らない。雨や雪のときは岩に隠れ、木に栖み、敢て下りて來て物を食はぬので往往にして餓死

する。故に師曠は『雪枯林を封じて文禽多く死す』といつたのだ。南方の賤民間では多くその尾を冠に挿んでゐる。その肉はいづれも雉より美味なもので、傳に『四足の美なるものに鹿あり、兩足の美なるものに鷓あり』といつてある。

肉 氣味

【甘し、平にして小毒あり】 詵曰く、五痔を發し、久しく食すれ

(一) 大觀ニ麥下ニ麴字アリ。

(二) 本村(重)曰ク、支那及中央亞細亞ニ原産ス。金鷄、錦鷄(共ニチンチー)ノ名ニテ知ラル、愛玩用トシテ飼養サル。

(三) 慙慙、慙ハ惡ナリ。即チ性急惡ナルチイフ。

(四) 耿介トハ志節アツテ苟合セザルノ意ナリ。

ば身體が瘦せる。蕎麥^(一)と和して食へば肥蟲を生ずる。政^(二)と共に食へば人を害す。卵を葱と共に食へば寸白蟲を生ずる。その他いづれも雉と同じ。【主治】【五臟^(三)氣喘^(四)して呼吸困難なるには、羹^(五)、臠^(六)にして食ふ】(孟詵)【炙いて食へば中を補し、氣を益す】(時珍)

鷩

雉

敵^(セウ)、敵^(ベツ)の二種の發音がある。(拾遺)

和名 きんけい、
學名 *Chrysolophus pictus* (Linne)
科名 きじ(雉科)

釋名

山鷩 禽經

錦鷩 同上

金鷩 (綱目)

采鷩 (周書)

鷩鷩

音は峻儀

(シユンギ)である。時珍曰く、鷩は性の慙^(ベツ)急^(キウ)耿^(キョウ)介^(カ)なものである。故にかく名けたのである。鷩鷩とはその儀容が俊秀だといふ意味である。周時代の鷩鷩^(ベツベツ)といった冠、漢時代の鷩鷩^(ベツベツ)といった冠は、いづれもこの鳥の文が明にして形の俊秀なる意味を取つたものだ。鷩と鷩とは同じく山鷩なる名があるが、鷩は大きくして鷩は小さい。鷩と鷩とは同じく錦鷩なる名があるが、鷩は文が綬にあつて鷩は文が身にあるだけの相異がある。大體に於ていづれも雉の屬である。按ずるに、禽經に『首に采毛ある

を山鷄といひ、腹に采色あるを錦鷄といひ、頸に采囊あるを避株（へきしら）といふとあつて、かく見ても山鷄と錦鷄との區別はややつくのであるが、俗には一樣に通稱してゐる。蓋し一類の物であつて甚だ懸隔のあるものではない。

集解

藏器曰く、鷄は雉に似て五色がある。山海經に『（号）小華の山、赤鷄多し。これを養へば火災を禳（はら）ふ』とあるがこの物だ。

（号）小華之山、即チ今ノ少華山ナリ。陝西省華州ノ南十支里ニアリ。
（三）南越ハ今ノ廣東廣西兩省ノ地ナリ。

時珍曰く、山鷄は、南越の諸山中に産し、湖南、湖北にもゐる。形状は小さい鷄ほどで冠も小さく、背に黄、赤の文があり、項は緑で腹は紅く、嘴が紅く、距が利く、善く闘ふもので、家鷄に馴はせてこれを捕獲し得る。これは爾雅に所謂『鷄、山鷄なり』とあるそのもので、逸周書にはこれを采鷄といつてある。錦鷄と呼ぶものは鷄よりも小さく、背に文があつて赤色が浮き出で、膺（うで）の前は五色炫耀（げんこう）して孔雀の羽のやうだ。これは爾雅に所謂『鷄、大鷄なり』とあるそのもので、逸周書にはこれを文鷄といつてある。鷄の音は汗（カン）である。この二種は大體に於て同類だが、錦鷄の文が尤も炫耀（さんらん）たるもので錦のやうだ。或は錦鷄といふはその鳥の雄をいふのだともいふが、それでも通じる。劉敬叔の異苑に『山鷄はその羽毛を愛するもので、

(六) 吐綬鶏

和名 しちめんて

う

學名

Macgregalis
illinoensis

Linn.

科名

キジ(雄)科

木村(重)曰ク、七面

鳥ノ野生ヲ云フ。現

在七面鳥ハ火鶏(ホ

アチー)ト稱セラ

ル。(註ハ愛州)

七面鳥ハ今ノ湖北

省巴東縣ノ西二十里

里、楊子江ヲ越山ヨ

リ巴東ニ入ル地點ナ

リ。關、廣ハ福建、

廣東



〔雄 鷄〕
—— 雌 ——

水に照せば舞ひ、目眩して多く死
ぬ。鏡に照してもその通りだ」と
ある。鸚鵡が尾を愛するために餓
死すると同一轍で、いづれもその
美しい文がその身に累するのであ
る。

附 錄

(七) 吐綬鶏

時珍曰く、

七面鳥、及バ關、廣の山中に産し、一般に愛翫用としてこれを飼ふ。大いさは家鶏
ほど、小さいものは、鵪鶉ほどで、頭、頬は雉のやう、羽の色は多くは黒で、黄、白色
が雜り、眞珠のやうな圓點の斑がある。項に腺囊があり、その内部に肉綬があつて
平常は外から見えないが、春、夏のよく晴れた日には、太陽に向けてそれを出して
搖す。先づ頂上から二寸ばかりの二本の翠の角を出して、それから徐ろにその領下
の綬を舒べるのだが、長く關くして一尺に近く、紅、碧相間つて采色燦爛たるもの
だ。しばらくの間搖してゐてやがて悉く斂め、また全然見えなくなる。剖いて視て

(ハ) 反哺ハ、鳥ニ反哺ノ孝アリト云フ如ク、此鳥モ親鳥ニ食物ヲ供給スル行爲アルナリ。

も一向にその物を斂めてある部分を發見し得ない。この鳥も生れるとやはり(ハ)反哺の行動には草木を避ける。故に禽經にはこれを避林といひ、食物本草には吐錦鶏といひ、古今注には錦囊といひ、蔡氏の詩話には眞珠鶏といひ、倦游錄には孝鳥といひ、そつてあるのだ。詩經に鵲——音は厄(ヤク)——といひ、『邛に旨鵲あり』とあるはこの鳥だ。

肉 氣味

【甘し、溫にして微毒あり】 主治

【これを食へば人をして聰

慧ならしめる】(汪頤) 【これを養へば火災を禳ふ】(藏器)

鵲

鷦

鷦(アツ)湯(カツ) (拾遺) 和名 缺二種の發音がある。

學名 (Common Larksfieldii, Gray, 科名 きー(雉)科

釋名

時珍曰く、その羽の色が黒黄にして褐色だ。故に鵲と名けたのであつて、青黒色なるものをば鵲——音は介(カイ)——と名ける。性の耿介なるものだからだ。青鳳も鵲といふが、それはこの鳥に似てゐるからである。

集解

藏器曰く、鵲鷦は、(三)上黨に産する。魏の武帝の賦に『鵲鷦猛氣、その

(二) 本村 重曰ク、支那南方及印度高山地方ニ分布ス。體雄ハ黒色ニシテ、ヤヤ濕氣アル深林中ニ棲ム、假ニ定メテ後攻ヲ俟ツ。又しやも(軍鷦)ノ野生ヲ謂フトノ説アリ。

(三) 上黨ハ草部山草類入參ノ註ヲ見ヨ。

(三) 潞州ハ草部山草
類人參ノ註ヲ見ヨ。



〔雞 鶉〕
——雉——

聞ふや必死を期す』とある。今世人が鶉を以て冠とするはこの意味を取つたものだ。

時珍曰く、鶉は、状態は雉に類して大きく、黄黒色で首に冠のやうな毛角があり、性その同類のものを愛し、侵害を受けると直ちに往つて戦闘を開始

し、死ぬとも屈しない。故に古の虎賁こほんと稱した猛勇の武士の一隊は鶉冠を戴くことになつてゐたのである。禽經に『鶉は毅鳥なり、毅たけくして死を知らず』とあるはことだ。性質の甚だ粗暴なもので、攫つかんだ物は忽ち之を折り擡たくものだ。上黨とは今の（潞州ろしゅう）の地である。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【炙いて食へば人をして勇健

ならしめる】（藏器）【炙いて食へば人をして肥潤ならしめる】（汪頌）

(二) 白鵲 (圖經)

和名 はくかん
學名 *Gemmaus nychthemus*, Linne.
科名 きじ(雉)科

校正

もとは雉の條に附録となつてゐたが、本書には一條を分けて掲出した。

(一) 本村(重)曰ク、雄ハ背白ク黒紋アリ尾ハ純白、顔ハ紅、嘴ハ淡青ナリ。南支那ニ産ス。白鵲(パイクン)(北支)バハイ(南支)ノ名ニテ呼バル、きんけいニ似タリ。

釋名

白鷺

音は寒(カン)である。閑客

時珍曰く、按ずるに、張華は『行止

閑暇なるが故に鵲かんといふ』といひ、李昉はこれに閑客と命名し、薛氏はこれを雉類とし、汪氏はこれを白雉としたが、按ずるに、爾雅には白雉の名を鷺としてある。南方人は閑の字を讀んで寒の字のやうに發音するから、鷺は雉の音の轉訛てんきのやうだ。白鷺と書くが正しいやうに思ふ。錦鷄を文鷺といふやうなもので、鷺とは羽の美しいことの形容である。又、西京雜記に『三南粵王が白鵲、黑鵲各一羽を獻じた』とある。蓋し雉にも黒色のもので鵲みちと呼ぶものがあるから、彼の地ではそれをも通じて鷺と呼んだものであらう。

集解

頌曰く、白鵲は江南かうなんに産する。雉の類であつて、白色にして背に細か

(三) 南粵ハ南越ニ同シ。今ノ廣東、廣西ノ地ナリ。

李太白は『この鳥の卵は雞に抱かせて生ませ得るものだ』といつた。やはり黑鷗といふもある。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主 治

【中を補し、毒を解す】（汪穎）



白鷗 雄

な黒文がある。飼養し得るものだ。彼の地ではやはりこれを食べふ。

穎曰く、即ち白雉のことだ。

時珍曰く、鷗は山鷄に似て

色白く、さざ波のやうな黒文

があり、尾の長さは三四尺、

體に冠と距とを備へ、紅頰、

赤嘴、丹爪でその性が耿介だ。

二 鷓鴣 (唐本草)

和名 きんけい、
學名 *Macropodus*,
科名 きじ(雉)科

釋名

越雉 時珍曰く、按ずるに、禽經に『隨陽は越雉と云ふものであつて、

飛ぶには必ず南に翥る』晉安では懷南といひ、江左では逐影といふ』とあり、張華の註に『鷓鴣はその名を自ら呼ぶ。飛ぶには必ず南に向ひ、東、西に回つて翔ける場合でも、先づ翅を開いた始めには必ず南に翥る。その志に南を懷ふところがあるので北に征かぬのだ』とある。

集解

孔志約曰く、鷓鴣は江南に生ずる。形が母鷄に似て『鈞輜格磔』と鳴くものがそれである。これに似た鳥はあるが、かく鳴かぬものはこの鳥でない。

頌曰く、今は江西、閩廣、蜀夔の州郡にいづれもある。形は母鷄に似て頭は鶉の如く、臆の前に眞珠のやうな白い圓點があり、背の毛には紫赤の浪の文がある。

時珍曰く、鷓鴣はその性霜露を畏れるもので、早朝と夕方に出ることは稀なものだ。夜は木の葉で身體を蔽ふて栖む。多くは對して鳴くものだ。今俗間では『行不

(一) 木柯(重)曰く、しやこニ非ズ、北支ニテハうづらヲ鷓鴣(チエークー)ト稱ス、今假ニ定ム。又てつけいノ一種ナリト謂フ説アリ。江南省ノ山地ニ多産スト云フ。しやこハ石鷄(シーチー(滿洲)ト稱ス。
(二) 晉安ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(三) 江西ハ今ノ江西省地方、閩ハ建寧ハ、東、蜀ハ今ノ四川省西半部、夔ハ四川省ノ東部、湖北省ニ接近セル夔州地方ナイフ。



〔鵪 鶉〕

得哥』といつて鳴くのだといふ。その性潔を好む。獵人はそれで藕竿ちんざなを以て粘ねんして取り、或はなごり図を用ゐて誘ふて取る。南方では専ら炙いて料理するが、肉は白くして脆く、味は雞、雉に勝るといふことだ。

肉

氣味

【甘し、溫にして毒なし】 日

華曰く、微毒あり。説曰く、竹筴ちくせつふんと食合せては

ならぬ。人をして小腹を脹らしめるものだ。自死したものは食つてはならぬ。或はこの鳥は、天地の神が毎月一羽づつを取つて至尊神に饗するので自死するのだから、それで食はれないのだといふ。

主治

【嶺南の野葛菌やかつきんし子の毒、生金の毒、及び溫瘧や久病で死せんとするに

は、毛共に熬つて酒に漬けて服す。或は生で搗いて汁を服するが最も良し】〔唐本〕

【酒で服すれば蠱氣こきで死せんとするを治す】〔日華〕 【能く五臓を利し、心力を益して聰明ならしめる】〔孟詵〕

發明

時珍曰く、按ずるに、南唐書に『丞相馮延巳が腦病を病んで已まなかつたとき、太醫吳廷紹が「あなたは山雞、鸚鵡を多食したから、その毒が發したのだ」といつて、甘草湯を與へるとそれで癒えた。この物は鳥頭、半夏の苗を多く食ふので其毒が發するのだから、それで甘草でその毒を解したので』とある。又、類説には『通判楊玄之が廣州から楚州へ歸り、その時多食した鸚鵡のために遂に咽喉の間に癰の生ずる病を發し、癰が潰れて膿血が已まず、寢食俱に廢するありさまで、醫師も手を束ねるばかりであつたが、たまたま楊吉老がその地へ往つたので迎へて診療を請ふと、楊吉老は「これは先づただ生薑一斤を啖つてから藥を投ずるがよい」といつた。初め一回生薑を食つて見ると甘く香しく覺えたが、半斤まで食ふとやや寛なるを覺え、一斤を食ひ盡すと辛辣さをそのままに覺えて、粥を食つて口に入つても少しも變調を認めなくなつた。この鳥は好んで半夏を食ふものだから、その毒が發したので。故に薑を以てその毒を利したのである』とある。この二説に就いて觀ると、鸚鵡は多く食へばやはり微毒があるが、その功用にはまた毒を解し、毒を解する能があつて、功過共に沒却出來ない。凡そ鳥獸の自死したものは皆有毒

(鳥) 廣州ハ土部伏龍肝、金部金ノ註ヲ見ヨ。
(毛) 楚州ハ石部南石類食鹽ノ註ヲ見ヨ。

だから食つてはならぬ。それはその死に至つた毒惡の氣を受けるがためである。何れも鷓鴣だけ神が取つて至尊神に饗するからだといふわけがあらうか。馬鹿なことをいつたものだ。

脂膏

主治

【手の皸瘰に塗れば皸裂しなくなる】蘇頌

竹鷄

（拾遺）

和名 してつけい

學名 Bambusiochelytus, Aud. zoon.
科名 きい（雞）科

（一）本村（重）曰ク、揚子江南方、殊ニ雲南四川省ニ多シ。山林、竹林等サ好ミテ棲所トス。竹鷄（チエキ）ト稱サル、異種臺灣ニ産ス。

釋名

山菌子（藏器）

雞頭鵝（蘇東坡集）

泥滑滑

穎曰く、山菌子とは竹鷄

のことだ。時珍曰く、菌子とは味が菌子の如く美味なるをいつたものだ。蜀地方では雞頭鵝と呼び、南方では泥滑滑と呼ぶ。それはその鳴聲に因んだのだ。

集解

藏器曰く、山菌子は江東の山林中に生ずる。形狀は小さい鷄のやうで

尾のないものだ。

時珍曰く、竹鷄は今は江南、川、廣の處處にゐる。多く竹林にゐるもので、形は鷓鴣に比すればやや小さく、褐色で斑亦文が多い。その性よく啼き、その同類を見

(三) 杉雞

和名 やけい

學名 *Gallus ban-**kia Robinsoni,*

Rottschill?

科名 きじ(雉)科

本村(重)曰ク、南方

支那ヨリ印度ニ分布

シ、叢中ニ棲ム。假ニ

定メテ後放チ候ツ。

附 録

(三) 杉雞

時珍曰く、按ずるに、臨海異物志に「閩越に杉雞といふがゐ

る。常に杉樹の上にゐるもので、頭上に長い黄色の毛冠があり、頬は正青色で垂縷のやうだ。やはり食へる。竹雞のやうなものだ」とある。

肉 氣 味

【甘し、平にして毒なし】時珍曰く、按ずるに唐小説に「崔魏公

が暴かに死んだとき、太醫梁新が診察して「これは食物の中毒だ」といふと、公の従僕が「公は好んで竹雞を食つた」といふ。新は「竹雞は多く半夏の苗を食ふからだ」といつて、薑を搗いて汁を取らせ、齒を押し開けて灌ぎ込むと遂に甦つた」と



〔雞 竹〕

ると必ず闘ふ。それでこれを捕るものはその闘の相手となる鳥を閩に使つて綱にかける。諺に『家に竹雞がゐて啼けば白蟻が化して泥になる』といふが、蓋し好んで蟻を食ふものだからだ。また壁虱を辟ける。

ある。これは吳廷紹、楊吉老が鷓鴣の中毒を治した方法を踏襲したものだ。

主治

【野雞病に用ゐて蟲を殺す。煮、炙いて食ふ】（藏器）

英鷄（拾遺）

和名 缺
學名 *Phasianus elegans*, Elliott.
科名 きじ（雉）科

集解

藏器曰く、英鷄は澤州の石英の產地に出る。常に碎けた石英を食ふ

もので、形狀は鷄のやうで尾は雉のやうだ。體は熱にして毛がなく、腹下に赤い毛があり、飛んでも遠くは翔けれない。腸中に常に石英がある。人間がそれを取つて食ふは石英の功力を取るのだ。現に世間で石英末で鷄を飼ひ、その産んだ卵を取つて食ふが、到底この鳥には及ばない。

肉氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【陽道を益し、虛損を補し、

人をして肥健、悅澤ならしめ、能く食へば冷を患はなくなり、常に實氣はあるが發せない】（藏器）

（一）木村（重）曰ク、四川雲南、西藏方面ニ分布シ、西藏語ニテトウカト稱ス。山岳等ノ小叢ニ棲ミ、石雉トモ云ハル。英雉ナリヤ疑ハシケレドモココニ出ス。
（二）澤州ハ石部不灰木ノ註ヲ見ヨ。

(二) 秧 鷄 (食物)

和名 くひな
學名 *Galus aquaticus indicus, Bp.*
科名 くひな(秧鷄)科

集 解

時珍曰く、秧鷄あうげは大きい小さい鷄ほどのもので、頬白く、嘴長く、尾

(一) 木村(重)曰ク、蒙古、北支那、日本、棲ミ、夏ハ南支那、印度ニ分布ス。此屬ツルク、ヒナモ産ス。其他支那ニハ多産ス。Linnæus, Ordyeps, Temminckus 等ノ屬ヲ産スルモ、スベテ秧鷄(アンチー)(北支)ヤンキー(南支)ト呼バル。



秧 鷄

短く、背に白斑がある。多く田澤の畔にゐて、夏至せうじ後には夜から曉方まで鳴き、秋後になると止む。鵓雞——鵓の音は鄧(トウ)である

——といふも秧鷄の一種で、大いさは鷄ほどで脚が長く、冠があか紅く、雄は大きくして褐色、雌はやや小さくして斑色だ。秋期にはゐなくなる。その聲の甚だ大なるものだ。一般にいづれも食ふ。

肉

氣 味

【甘し、溫にして毒なし】

主 治

【蟻瘻】(注願)

(一) 木村(重)曰ク、東南西北利強蒙古、支那、日本、朝鮮ニ棲ム。鶉チユン(北支)シヨン(南支)ニト稱シ、食用ニ賣ラレ、殊ニ滿洲ニ多産ス。所ニヨリテハ鶉鵲トモ稱ス。此外やまうづら(沙鶉シヤチー)屬アリ。

(二) 醇ハ和厚ナリ。

鶉 (嘉 祐)

和名 うづら
學名 *Coturnix japonica*, Temm. et Schlæg.
科名 きじ(雉)科

釋名

時珍曰く、鶉は性の醇なるもので、浅い草の中にもぐつてゐる。一定の居處はないが一定の配偶があつて、その地に随つて安んじてゐる。莊子に所謂『聖人は鶉居す』とはこの意味をいつたのだ。

歩行いてゐて小草に遭ふと遠廻りにそれを避ける。やはり醇なる性質といふべきだ。その子を鶉といふ。

宗奭曰く、その卵から生れたばかりのものをば羅鶉といふ、秋初にはこれを早秋といひ、中秋已後にはこれを白唐といふ。一



〔 鶉 〕

物にして四種の名稱がある。

○三 大觀ニ正ナ至ニ
作ル。

夏、秋、（○）汴ハ草部芳草類
香薷ノ汴洛ノ註參
照。

集解

禹錫（○）曰く、鶉は蝦蟇（○）の變化したものだ。楊億の談苑に『（○）正道二年の夏、秋、汴地方の鶉を賣る商人が車に積載して市場へ出したが、それはみな蛙の變化したものだつた。その中にはまだ完全に變化しきらぬものも交つてゐた。列子に所謂「蛙化して鶉となる」の事實である』とある。

宗奭（○）曰く、鶉には雌雄があつて、常に田野に於て屢その卵を得ることがある。變化したものはいひ得ない。

時珍（○）曰く、鶉は大いさ雞の雛（○）ほどのもので、頭が細くして尾がなく、毛に斑點があり、甚だ肥えたものだ。雌は足が高く、雌は足が低い。その性差を畏れるものだ。田野に在つても夜は群（○）り飛ぶが、晝は草にもぐつてゐる。世間では能くその鳴聲をまねて呼び寄せて捕へ、飼養して鬭争を行はせる。萬畢術には「蝦蟇が瓜を食ふと鶉になる」とあり、交州記には『南海のある黃魚は九月に變化して鶉になる。鹽で炙いて食ふと甚だ肥美だ』とある。蓋し鶉なるものの發生の初には化成したもので、それが後に卵から生れるやうになつたのであらう。故に四季を通じてこの物がゐるのだ。鶉（○）といふものならば、始め鼠から變じて終にまた鼠となるものだから、夏は

ゐるが冬はゐない。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】禹錫曰く、四月以前にはまだ食ふわけに行かぬ。猪肝ちまかんと食合せると黒子を生じ、菌子と食合せると痔を發すものだから食合せてはならぬ。

主治

【五臟を補し、中を益し、氣を續け、筋骨を實し、寒暑に耐へ、結熱を消す。小豆、生薑と和して煮て食へば洩痢を止める。酥そで煎じて食へば下焦ふそを肥らせる】（嘉祐）【小兒の疳、及び下痢五色を患ふものは、毎朝これを食ふが有效だ】（寇

宗奭）

發明

時珍曰く、按ずるに、董炳の集驗方に「魏秀才の妻が腹大を病んで鼓のやうになり、四肢骨立して床に身を横へることも出来ぬほどになり、ただ衣服や寢具を吊つてそれに臥し、穀物の食事が通らぬこと數日に及んだが、ふと鶉うしを食はせて見ようと思ひつき、法則の通りに調ととのへて進めると、やがて運劇して少頃すると雨のやうに汗を出し、言語も不能になつたが、ただ衣服を替へたいやうな様子があるので、扶たすけ起して便通をさせると、小便から突然鶉脂うしじのやうに凝つた白液を出し

た。同様に數回下してそれから大いに元氣ついたのであつた。これは蓋し中焦の濕熱が久しい間鬱積して發つたもので、本草に、鶉は熱結を解し、小兒の疳を療ずとある意味を詳に考へれば、やはり當然の理だ』とある。董氏はかやうに説いたが、時珍が謹んで按ずる所に據れば、鶉なるものは蛙の化氣であつて性の相同じきものだ。蛙と蝦蟇とはいづれも熱を解し、疳を治し、水を利し、腫を消するものであつて見れば、鶉が鼓脹を消するといふも、蓋しその功力が同一だからである。

(二) 鶉 (拾遺)

和名 みふうづら
學名 *Iruka tanki blanfordi*, Blyth.
科名 きじ(雉)科

釋名

鶉 あるひは鶉と書く。鶉 音は寧(ネイ)である。鶉 音は如(ジョ)で

(一) 木村(重)曰ク、うづらニ似テ體ヤヤ小ナリ、頸黒色ニシテ羽根ニ斑點アリ。一般ニ鶉ノ名ニテ呼バル。印度、ビルマ、支那、滿洲、東南西北利亞ニ分布ス。鶉鶉(アンチユン)トモ云ハル。

(二) 青州ハ水部井泉水ノ註ヲ見ヨ。

ある。鶉 時珍曰く、鶉は木の上に棲まぬ。安寧自如たるものといふべきだ。莊子に所謂『騰躍すれども數仞に過ぎず、蓬蒿の間に下り翔る』のそれである。張華の禽經の註に籬鶉といつたのはこの鳥だ。鶉とは鶉の音轉である。(三) 青州ではこれを鶉母といひ、また鶉雀ともいふ。又、鴈と呼ぶ鳥に九種あつて、これもその内の一

種である。

集解

藏器曰く、鶉は小さい鳥で、鶉の類だ。一名鶉じよといふ。鄭玄の禮記の註には、雉兎鶉鶉とあり、鶉を鶉としてある。一般に多くこれを食べる。



〔鶉〕

—— 鶉 ——

時珍曰く、鶉は候鳥と云つて渡り鳥である、鶉のやうに常に早朝に鳴いて農民に麥の收穫を促うながすので、麥を耕作するものはこの鳥の聲で適當な時期を測る。春秋運斗樞に『立春、雨水、鶉鶉鳴く』とあるはこれである。鶉と鶉との二種は形狀はよく似てゐて俱に黒色だが、ただ斑のないものが鶉である。今は一般に總てを鶉鶉すべなる名の下

に通稱してゐるが、按ずるに、夏小正に『三月、田鼠化して鶉となり、八月、鶉化して田鼠となる』とあり、その註に『鶉のことだ』とある。爾雅には『鶉の子は鶉あひ、鶉の子は鶉ねい』とあり、註に『鶉は鶉の属だ』とある。禮記には『鶉を羹にし、鶉を

釀すに蓼りょうを以てす』とあり、註に『鴛は小さくして羹にならない。酒、蓼で釀して蒸煮して食ふのだ』とある。この數説に據れば、鶉と鶉との二種別のものなること明である。兩者俱に田野に在つて形狀も彷彿ほうふつたるところから區別がつかなかつただけで、鶉なるものは始は蝦蟇、海魚から變化し、それが終に卵から生まれるやうになつたのだから斑があり、四季を通じて常にあるのだ。鶉なるものは始は鼠から變化して終にまた鼠に復かへる。それで斑もなく、夏にはぬるが冬にはぬないのだ。本來の質に既にそれだけの相異があるのだから、療病上の藥性にも當然差異があるべきわけで、混同すべきものではないと思ふ。

肉 氣味 【甘し、平にして毒なし】 主治 【諸瘡、陰腫いんちゆうに、煮て食へば熱を去る】(時珍)

(一) 鶉

音は逃(ジュッ)である。

(拾遺)

和名 たしぎ
學名 *Capella gallinago rufes*, (Butcherin)
科名 しぎ(鶉)科



集解

藏器曰く、鶉は鶉のやうで色が蒼あさく、嘴が長く、泥塗中にゐる鶉鶉と

(二) 木村(重)曰く、冬期ニ支那、日本等ニ渡ル。水鶉兒(シユイチール)水鶉(スイチャ)鶉鶉(アンチエンチャ)ト稱セラ

ル。鵓トハ一般ニシ
ギ科 (Chalcididae)
ノ總稱ニシテたけり
(水鷄、澤子 Vanellus)
其他支那産約四十二
屬ヲ包含ス、今代表
的ノモノヲ掲グ。

(一) 木村(重)曰ク、
かはらばと(Colum-
ba livia intermedia,
Strickland.) ヨリ家



〔鵓〕

いふ鳴聲を出す。村落の人民はこれを田鷄
の變化したものだといふ。やはり鵓、鶉の
類である。蘇秦が『鵓蚌相持す』といつた
のはこの物だ。

時珍曰く、説文に『鵓は天候を知り、雨
が降らんとするときは鳴く。故に天文の學
者が鵓を冠にするのだ』とある。現に田野

中にゐる小鳥で、まだ雨の降らぬ前に鳴くものがこの鳥だ。翡翠と同じ名を呼ばれ
るが實物は異ふ。

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【虚を補し、甚だ人體を暖め

る】(藏器)

(一) 鵓

(宋嘉祐)

和名 どばと(いへばと)
英名 Dove
科名 はと(鳩)科

禽化サレタルモノニ
テ、鴿子（ハアツ）
（北支）ケツ（南支）
ト呼バル。藥用トス
ルハ殆ンド白鴿ナリ
「鳩」ハきじバとチ云
フ。

釋名

鵓カウ（食療）

飛奴


時珍曰く、鴿は性淫にしてよく交合する。故にか

く名けたのだ。鴿とはその鳴聲だ。張九齡は鴿を書信傳達に使をするところから飛
奴と呼んだのだ。梵書には迦布德迦カフデキヤと名けてある。

集解

宗奭曰く、鴿の毛色は禽類中でも最も品級の多いものだが、白鴿だけ

を藥に入れる。凡そ鳥はみな雄が雌に乘ずるもの
だが、この鳥だけは雌が雄に乘ずる。故にその性
が最も淫だ。



〔鴿〕

は大小はあるが黄、赤、綠色だけだ。やはり鳩と配偶する。
時珍曰く、處處の人家で飼養し、また野鴿とい
ふものもあつて、品種は多くあるが大體の毛羽の
色は青、白、黒、緑、鵓斑ジャクはんの數種に過ぎない。日

白鴿肉

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

詵曰く、暖なり。

主治

【諸藥

毒を解す。また人、馬の疥の久患には、これを食へば立ろに癒える】（嘉祐）【精を調
へ、氣を益す。惡瘡、疥癬、風三瘡、白癩、癰瘍風を治するには、炒熟して酒で服

（二）大觀ニ瘡ヲ瘥ニ
作ル。

(三)上蘇、百病主治
二土蘇二作ル。

す。人體に益あるものではあるが、多く食つては恐らく藥力を減ずる】(孟詵)

附方

舊一、新一。【消渴飲水】際限なく水を飲んで止まぬには、白花鴿一羽を

小片に切り、(三)上蘇で煎じて含み咽む。(心鏡) 【痘毒の預解】毎年十二月末日の夜、

白鴿を煮炙して小兒に食はせ、同時に毛の煎湯で浴すれば痘が出ても少して済む。

血主

治 【諸藥、百蠱の毒を解す】(時珍) 記載は事林廣記にある。

卵主

治 【瘡毒、痘毒を解す】(時珍)

附方

新一。

【痘毒の預解】小兒がこれを食へば永く痘が出ない。或は出て

も少して済む。白鴿卵一對を竹筒に入れ、半月間廁中に入れて取出し、その卵白で

辰砂三錢を和して菴豆大の丸にし、三十丸づつを三豆飲で服す。毒は大、小便と共に

排出する。(澠江方)

屎 【左盤龍と名ける】

時珍曰く、野鴿のものが就中良し。この鳥の尿はいづれ

も左に卷くものだ。故に宣明方にこれを左盤龍といつてある。

氣味

【辛し、溫

にして微毒あり】

主治

【人、馬の疥瘡には、炒り研つて傳ける。驢、馬をば草

にこれを和して飼ふ】(嘉祐)

【腫、及び腹中の痞塊を消す】(汪頌)

【瘰癧、諸瘡を消し、

破傷風、及び陰毒で死に垂たるものを療じ、蟲を殺す。(時珍)

附方

舊四、新六。【帶下に膿を排す】

宗奭曰く、野鴿糞一兩を炒つて微し焦し、

白朮、麝香各一分、赤芍藥、青木香各半兩、延胡索を赤く炒つて一兩、柴胡三分と末

にし、温めた無灰酒で一錢を調へて空心に服し、膿の盡くるを候つて止め、後に子

臟を補する藥を服す。【破傷中風】病が裏に傳入したるには、左蟠龍、即ち野鴿糞、

江鰮、白殭蠶を各、炒つて半錢、雄黃一錢を末にし、蒸餅で梧子大の丸にし、十

五丸づつを温酒で服して效を取る。(保命集)

【陰症腹痛】顔色の甚しく青きには、鴿

子糞一大抄を研末し、極熱した酒一鍾で和勻し、澄清して頓服すれば癒える。(劉氏)

【蚯蟲腹痛】白鴿尿を焼いて研り、飲で和して服す。(外臺)

【冷氣心痛】鴿尿を焼いて性を存し、一錢を酒で服すれば止まる。【項上の瘰癧】左盤龍を炒つて研末し、

飯で和して梧桐子大の丸にし、三五十丸づつを米飲で服す。(張子和方)

【頭瘡白禿】鴿糞を研末して傳ける。豫め醋阿汁で洗淨する。また燒き研つて

摻るもよし。(同上)

【反花瘡毒】初期には米粒ほどの惡肉があつて、破れば血が出て

(四)大觀ニ計上ニ米

字アリ。

肉が随つて生じ、外部に反出するものである。鶉鴒屎はつかにし三兩を黄に炒つて末にし、温漿水で瘡を洗つて後に傅ける。(聖惠方) 【鶉掌風】ぎしやうふう 鶉屎、白雄鶉屎を炒つて研り、水で煎じて日毎に洗ふ。

突厥雀 (拾遺)

和名 さけい
學名 *Syniaptus pectoratus*, Tullis.
科名 さけい(沙鶉)科

釋名

鶉鴒

鶉の音は奪(ダツ)である。寇雉

藏器曰く、この雀が北方から來

ると、賊亂があつて國境の蠻族が中國を候うかがふものだ。故にかく名けたのである。

時珍曰く、按ずるに、唐書に『高宗の時、突厥ぶつげつが塞を犯した際に、鳴鶉が羣飛

(一) 木村(重)曰ク、體ハ暗灰色ニ背ニ斑アリ。脚ハ三趾ニテ毛生ズ。大イサ鶉大、北部支那ヨリバイカル湖ニ分布ス。突厥雀(トウチエーチヤナ)冠雉(コウチー)ト呼ベル。
(二) 突厥ハ長城以北ノ蒙古地方。即チ匈奴ノ地方ナリ。
(三) 塞ハ長城。

して塞に入つた。その時國境の住民は驚いて「この鳥は一名突厥雀といふもので、

南へ飛ぶときは必ず突厥が入寇するさうだ」といつた。やがて果して入寇したのであつた』とあるが、これは爾雅に『鶉鴒だつぎは寇雉なり』とあるところから見ると、奪掠りやく、寇賊に結びつけたわけはやはり此から出たものだ。

集解

藏器曰く、突厥雀は塞北に生ずる。形状は雀のやうで身が赤い。

時珍曰く、按ずるに、郭璞は『鵲鳩は北方の沙漠地に生ずる。大いさは鵲ほど、形は雌雉に似たもので、脚は鼠のやうで後趾がなく、尾が岐れてゐる。性質の慇懃なもので、羣り飛ぶ』といひ、張華は『鵲は關西に生ずる。飛ぶには雌が前に雄が後になり、相隨つて行動する』といひ、莊周は『青鵲はその子を愛するがその母を忘れる』といった。

肉 氣味

【甘し、熱にして毒なし】

主治

【虚を補し、中を暖める】（藏器）

（一）雀 （別録中品）

和名 すずめ
學名 *Tasser montanus saturatus*, St. Jeger.
科名 すずめ（雀）科

（一）木村（重）曰く、顔ニ黒斑アリ。此亞種たいわんすずめ、てうせんすずめ、及び顔ニ聖斑ナキにうないすずめ〔*Tasser rufinus* (Temm.)〕等ヲ産ス。雀（チヤナ）瓦雀（ワーチャナ）麻雀兒（マチャナル）家雀（チヤチャナ）ト呼バル。

釋名

瓦雀 賓雀

時珍曰く、雀は尾の短い小鳥だ。故にその文字は小に従

ひ佳に従ふのであつて、佳は錐（スサ）と發音し、尾の短いことだ。簷の瓦の間に宿り栖んで、馴れ近いて庭先や階段まで来る。その様子が賓客のやうだといふところから瓦雀、賓雀などといひ、また嘉賓とも呼ぶのである。俗に老いて斑あるものを麻雀と呼び、小さくして口の黄なるものを黄雀といふ。

集解

時珍曰く、雀は處處にゐる。羽毛は斑褐で顔と背とはみな黒く、頭は蒜さんの顆のやう、目は椒を擘さいたやう、尾の長さは二寸ばかり、爪と距とは黄白色で、躍つて行くが歩まない。物を視る様子は驚いたやうに見え、その目は夜は盲する。



〔雀〕

その卵には斑がある。その性の最も淫なるものだ。小なるものをば黄雀と名け、八九月に田の中に羣飛する。體は非常に肥えてゐて、背には綿を被きたやうに脂があるものだ。性味はいづれも同一で、炙いて食ひ、鮮さきにして食ふと甚だ美味だ。按ずるに、逸周書に『秋の季に雀が大水に入つて蛤かとなる。雀が水に入らねば國に淫佚いんいつの事が多い』とあり、又、臨海異物志には『南海には黄雀魚といふがあつて、常に六月に變化して

黄雀となり、十月に海に入つて魚となる』とある。して見ると、所謂雀が蛤かに化す

とは蓋しこの類のものをいふのだ。人家に近くゐる雀では未だ嘗て變化したものを見たことがない。又、白雀といふがあつて、緯書にはこれを瑞應すいおうの所感としてある。

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】弘景曰く、雀肉は李と食合せてはならぬ。

諸種の動物の肝と食合せてはならぬ。妊婦が雀肉を食つて酒を飲めば多淫の子を生み、雀肉と豆醬を食へば生れる子に面黥めんかんが生ずる。凡そ白朮びやくじゆつを服する人はこれを忌む。

主治

【冬三ヶ月間これを食へば陽道を起し、人をして子あらしめる】（藏器）

【陽を壯にし、氣を益し、腰膝を暖め、小便を縮め、血崩たいげ、帶下を治す】（日華） 【精、髓を益し、五臓の不足の氣を三縮める。常にこれを間斷なく食ふがよし】（孟詵）

發明

宗奭曰く、正月以前、十月以後に食ふがよい。それはその陰陽靜定してまだ泄もれないものを用ゐる意味だ。故に卵も一産卵期の第一番目に生んだものを取る。

頤曰く、現に一般に雀肉に蛇牀子じやじやうしを和して熬膏ぎやうかうし、それで藥を和して服するが、下部を補すのに有効だ。これを驛馬丸と呼ぶ。この法は唐時代に始めて行はれたも

（二）大觀ニ縮ヲ續ニ作ル。

ので、玄宗皇帝がこれを服して效驗あつたといふ。

時珍曰く、聖濟總錄の虛寒を治する雀附丸に、肥雀肉三四十箇を附子と共に熬膏して丸藥にするところあるは、やはり右の意味を祖述したものだ。

附方

新八。【老人の補益】老人の臟腑の虚損で羸瘦し、陽氣の乏弱せるを治す。

雀五羽を普通の料理の場合のやうに作り、粟米一合、葱白三本を用ゐ、先づ雀を炒り熟して酒一合に入れて煮てから、少時して水二盞を入れ、葱、米を入れて粥にして食ふ。(食治方) 【心氣勞傷】朱雀湯——心氣勞傷から諸種の疾に變じたるには、

雄雀一羽の肉を取つて炙き、赤小豆一合、人參、赤茯苓、大棗肉、紫石英、小麥各一兩、紫菀、遠志肉、丹參各半兩、甘草を炙いて二錢半を細かに剉んでよく拌ぜ合せ、三錢づつを水一盞で六分に煎じて滓を去り、食事と時間を隔てて温服する(奇效方)

【腎冷偏墜】疝氣である。生雀三羽を毛を燎き腸を去り——洗つてはならぬ——舶來の茴香三錢、胡椒一錢、縮砂、桂肉各二錢をその雀の肚中に入れ、濕紙で裹んで煨熟し、空心に酒で服するが良し。(直指方) 【小腸疝氣】毛のついたままの雀一羽を腸を去り、金絲礬末五錢を入れて縫合し、桑柴火で煨いて炭にして末にし、空心に

無灰酒で服す。發病以來年久しきものも二服で癒える。(瑞竹堂方) 【赤白痢下】臘月

に取つか雀を腸肚、皮毛を去り、巴豆仁一箇をその肚中に入れ、餅へいに入れ固濟して

煨わいいて性を存して研末し、好き酒で黄蠟を煮て百沸し、その蠟を用ゐて梧子大の丸

にし、一二十丸づつを、赤痢には甘草湯で服し、白痢には乾薑湯で服す。(普濟方) 【内

外目障】視力乏しく、醫いを生じ、遠くを視ると黒花があるやうに覺えるもの、及び

内障で物の見えぬものを治す。雀十羽を翹、足、胷むねを去り、腸、胃、骨、肉の付い

たまま研いたり爛たらし、磁石を煨わいいて醋に淬ひたすこと七回して水飛し、神麴しんきくを炒り、青鹽、

肉蓯蓉にくしやうきやうを酒に浸し炙あいて各一兩、兔絲子を酒に三日浸ひたして晒さらして三兩を末にし、酒

二升に少し煉蜜を入れたもので雀、鹽と共に膏に研り、それで諸藥を和して梧子大

の丸にし、一日二回、二十丸づつを溫酒で服す。(聖惠方)

雀卵

氣味

【酸し、溫にして毒なし。五月に取る】

主治

【氣を下す。

男子の陰痿で起たたざるものを強くし、熱せしめ、精多くし、子あらしめる。(別錄)

【天雄、兔絲子末を和して丸にし、空心に五丸を酒で服すれば、男子の陰痿不起、

女子の帶下、大小便不利を治し、疝瘕せんかを除く。(孟詵)

發明

弘景曰く、雀は陰陽を利するものだから卵も同様なのだ。術に『雀卵で天雄を和して服すれば陰莖を衰へざらしめる』とある。

頤曰く、按ずるに、素問に『胸脇肢滿するもので、食事に妨があり、病が發して來ると先づ臊臭を感じて清液を出し、先づ唾血して四肢清し、目眩し、時時に前後する血病を血枯と名ける。これは年少の頃に大いに脱血したことがあるか、若くは酔ふて房事を行ひ、氣が竭き、肝が傷んだことに原因するものである。故に月經が衰少となつて潮來せぬものだ。これを治するには、烏鰂魚骨、蘆茹の二物を合せて雀卵で小豆大の丸にし、五丸を後飯として用ゐ、鰯骨汁を飲んで腸中、及び腸、肝を和するのである。飯を後にし藥を先にするを後飯といふ』とある。本草には右の三藥いづれも血枯を治すとはないが、經方には用ゐてあるのであつて、これは病の發生する根本に向つて藥の作用を加へたものである。

時珍曰く、今は一般に、雀卵の能く男子の陽虛に益することを知つてゐるが、能く女子の血枯を治することを知らない。蓋し雀卵は精血を益するものなのである。

肝 主 治

【腎虛陽弱】（聖惠） 四雄丸に用ゐてある。

頭血

主 治

【雀盲】

別錄

弘景曰く、雀盲とは人が黃昏時に物の見えなくな

り、雀の目が夜間盲するやうなものだ。一日二回血を取つて點ける。

腦

氣 味

【平なり】

主 治

【綿で裹んで耳を塞げば聾を治す。又、凍瘡

に塗る】

孟詵

時珍曰く、按ずるに、張子和の方に、臘月の雀腦を灰に焼き、油で

調へて塗るもよしとある。

喙 及び 脚脛骨

主 治

【小兒の乳癰には、一羽づつを煮て汁を服す。或は

灰に焼いて米飲で調へて服す】

時珍

雄雀屎

一名 白丁香

俗名

青丹

拾遺

雀蘇

炮炙論

修 治

日華曰く、

凡そ鳥は、左翼が右を掩ふものは雄である。その屎は頭が尖つて挺直だ。

數曰く、凡そこれを使用する場合には雀兒の糞を用ゐてはならぬ。雀兒とは口が

黃でまだ淫行の經驗なきものである。ここに雀蘇といふは底が坐つて尖が上にある

もので、雄の糞である。兩頭の圓いものは雌の糞だ。陰人には雄を使用し、陽人に

は雌を使用する。臘月に採つて兩畔の附著物を去り、鉢に入れて研細し、甘草水に

一夜浸し、水を去つて焙じ乾して用ゐる。

（一）乳癰、詳ナラズ、
吐乳ヲ指スカ。

〔瘡〕疽、大觀ニ癰ニ
作ル。

〔大觀〕ニ子下ニ上
ノ字アリ。
〔大觀〕ニ諸ニ冷ニ
作ル。

時珍曰く、別錄にはただ雄雀屎を用うとあるだけで、雌、雄それぞれの用途を區
別したのは雷氏からである。

氣味

【苦し、温にして微毒あり】

主治

【目痛を療じ、癰疽を決する。

婦人の帶下、小便不利。疳瘕を除く】

〔別錄〕

【齒齕を療ず】

〔陶弘景〕

【初めて男子を生
んだ母の乳に和して目中の贅肉、赤脈の腫子（ま）を貫きたるに點ける。直ちに消する
神效がある。室で丸にして服すれば癰瘕久癰の諸病を治す。少量の乾薑に和して

服すれば大いに身體を肥えしめ、悅澤にする】

〔蘇恭〕

【癰瘕の潰れぬものに點塗すれ
ば直ちに潰れる。急黄で死せんとするものには、湯に溶化して服すれば立ちに甦る。
腹中の瘕瘕、諸塊、伏梁には、乾薑、桂心、艾葉（かいよう）と和して丸にして服す。能く消爛

せしめる】

〔天雄、乾薑に和して丸にして服すれば、能く陰を強くする〕

〔積を消し、脹を除き、咽塞（いんざん）、口噤（こうしん）を通ずる。婦人の乳腫、瘡瘍、中風、風蟲牙痛】

發明 時珍曰く、雀は諸種の穀物を食つて容易に消化するものだ。故に疳瘕、
積脹、瘕瘕、及び目瞤、贅肉、癰疽、瘡癰、咽塞、齒齕の諸症を治するは、みなそ
の能く消爛する意味を取るのである。

附方

舊六、新八。

【霍亂不通】脹悶して死せんとするものであつて、飽食し

傷めて涼を取つたことが原因である。雄雀糞二十一粒を研末し、溫酒で服す。なほ

奏效せぬときは再服する。(總錄)【目中の瞖膜】目熱で赤白膜を生じたるを治するには、雄雀尿を人乳に和して點ければ自ら爛れる。(肘後方)【風蟲牙痛】雄雀尿を綿で裏んで孔中を塞ぎ、一日二回易へれば效がある。(外臺)【咽喉噤塞】雄雀尿末半錢を溫水で灌ぐ。(外臺)【小兒の口噤】風に中つたものには、雀尿を水で麻子大の丸に(七) 大觀ニ子母秘錄ニ作ル。し、二丸を飲服すれば癒える。(七(千金方))【小兒の乳を飲まぬもの】雀尿四箇を抹して吮はす。(總錄)【小兒の痘瘰】白丁香末に麝香少量を入れ、一錢を米飲で服す。(保(八) 大觀ニ簡要濟衆ニ作ル。幼大全) 【婦人の吹乳】白丁香半兩を末にし、一錢を溫酒で服す。(八(聖惠))【破傷風瘡】

白痴が生じて血なきものは死に至る、最も危急なものだ。黃雀糞の直きものを研末

し、半錢を熱酒で服す。(華濟)【癰癤の破決】諸癰が已に十分化膿したにも拘はらず、患者が鍼を懼れるには、雀尿を取つて瘡頭に塗れば決し易い。(梅師方)【療瘡の痛むもの】雀尿、燕窠土を研つて傅ける。(直指)【浸淫瘡癰】洗淨し、雀尿、醬、鱗を和(を) 鱗ハ、瓜實ノ鱗ヲ包ム外部ノ肉ヲ云フ、醬鱗ハ漬物ノ瓜して研り、日毎に塗る。(千金翼)【喉痺乳蛾】白丁香二十箇に沙糖を和して三丸にし、

ノ中子ヲ去リタルモ
ノ。

(一) 本村(重)曰ク、
日本産―あなじニ類
スルモ喉ハ帶綠色ヲ
呈ス。からのじこ
(E. sulphata, Tr.
み) 共ニ蒿雀、青頭
兒(チンタオル)ト稱
セラル。北滿ヨリ南
支那ニ分布ス。
(二) 塞外トハ長城以
北ノ蠻地ヲ指ス。

(一) 本村(重)曰ク、
黃肚(鵲)雀(カウシ
トウチヤチ)ト呼バ
ル。北支那産ノモノ
ヲ掲ケ。

一丸づつを綿に裹んで含み嚙む。即時に癒える。甚しきものも一丸に過ぎずして極
めて奇效がある。(普濟方) 【顔面 鼻の酒鼓しゆさ】白丁香十二粒、蜜半兩を朝、夕點けれ
ば久しくして自ら除去する。(聖惠方)

(二) 蒿 雀 (拾 遺)

和名 からあなじ
學名 *Emberiza spodiophaea*, Pallus.
科名 すずめ(雀)科

集 解

藏器曰く、蒿雀かうじやくは雀に似た青黒色のもので、蒿の中にある。(三) 塞外へ
行くほど多くゐる。食つては諸種の雀より美味なものである。

肉 氣 味

【甘し、溫にして毒なし】 ― 主 治 ― 【これを食へば陽道を益し、

精、髓を補す】(藏器)

腦 主 治

【凍瘡に塗る。手足が皸裂くんれつしない】(藏器)

(一) 巧 婦 鳥 (拾 遺)

和名 みそあやこ
學名 *Troglodytes peninsularis*, (Sharpe)
科名 みそあやこ(鵲鴝)科

釋名

鷦鷯（詩疏）

桃蟲（詩經）

蒙鳩（荀子）

女匠（方言）

黃胆雀（俗）

時

（一）關トハ面谷關ヲ指ス、蟲部卵生類
（二）註參照
（三）燕ハ草部燕草類
燕脂ノ註ヲ見ヨ。

珍曰く、按ずるに、爾雅に「桃蟲は鷦鷯なり。その雌を鷦鷯といふ」とあり、揚雄の方言には「關より東ではこれを巧雀といひ、或は女匠といふ。關より西ではこれを機雀といひ、或は巧女といふ。」燕地方ではこれを巧婦といふ。江東ではこれを桃雀といひ、また有呼ともいふ」とある。また鳩は性が拙であり、鷦鷯は性が巧だからかく呼ぶのだといふ。かかる意味から諸種の名稱が起つたのだ。

集解

藏器曰く、巧婦

〔鳥 婦 巧〕

——鷦 鷯——

は雀より小さく、林や藪の中に窠を作る。窠は小さい袋のやうなものだ。

時珍曰く、鷦鷯は處處に

るもので、蒿木の中で生れて柴や竹の垣の上にある。形状



(目) 毛毳、毳ハ獸類ノ細毛、及ビ鳥類ノ腹部ノ毛チイフ。此ニハソレ等ノ細毛ノ如キ茅、葦ノ毛ナリ。

(五) 爾雅ニ鴈ニ作ル。

(六) 鵒ノ誤字。

は黃雀に似て小さく、灰色で斑があり、聲は口笛のやう、喙は利い錐のやうだ。茅や葦の毛毳を取つて雞卵ほどの大きいさの窠を作り、麻や髮毛などで樹上に繋ぎ懸けるのだが、極めて精巧なもので、或は房の一箇あるものもあり、房の二箇あるものもある。故に『林に巢ふて一枝に過ぎず、毎食數粒に過ぎず』といふのだ。卑賤な者にはこの鳥を飼ひ馴して戲藝をさせるものもある。又、爾雅には剖葦といつてある一種の鵒鵒がある。それは雀に似て青灰色の斑があり、尾は長く、好んで葦蠹を食ふものだ。やはり鵒の類である。

肉 氣 味

【甘し、溫にして毒なし】

主 治

【炙いて食へば甚だ美味だ。

人をして聰明ならしめる】(汪類)

主 治

【烟に焼いて手を熏ずれば婦人をして養蠶を巧ならしめる】(藏器)

【膈氣、嘔疾を治す。一箇を灰に焼いて酒で服す。或は一回に三錢を服すれば神驗がある】(時珍) 記載は衛生易簡方にある。

(一) 燕 (別錄中品)

和名 つばめ
學名 Hirundo rustica gutturalis, (Scopoli)
科名 つばめ(燕)科

(二) 木村(重)曰ク、
亞細亞北部ニテ蕃殖
スル普通ノつばめナ
リ。此他あかはらつ
ばめ、とつくりつば
め、あじあつはめチ
見ル。燕(エエ)ト稱
ス。

釋名

乙鳥(說文)

玄鳥(禮記)

鶯鳥(古今注)

鷦鷯(莊子)

游波(炮炙論)

天女(易占)

時珍曰く、燕の字の篆文はその姿態の象形だ。

乙とはその自ら呼ぶ鳴

聲。玄とはその色である。

鷹、鷦はこれを食へば死ぬ。

能く海東の青鷺を制する。

故に鷽鳥なる名稱がある。

能く波を興し、雨を祈るところから游波なる稱呼がある。

雷毀が『海竭さ、江枯るも、游波を投じて立ちに汎る』といったのはこれである。

京房は『人が白燕を見れば貴女を生むしるしだ』といった。それで燕を天女と呼ぶのである。

のである。

集解

別錄に曰く、燕は高山、平谷に生ずる。

弘景曰く、燕に二種ある。

胸が紫で軽小なものは越燕といふもので、薬用には入

れない。斑黒があつて聲の大きいものは胡燕といふもので、薬用に入れるものだ。

胡燕の作る窠は能く二疋の絹を容れ得るほど長いもので、人の家を富ましめる。窠

字アリ。

(三) 大觀ニ燕字下ニ

俗呼胡燕爲夏候ノ七

字アリ。

(三) 大觀ニ屈チ僞求
 竊ニ作ル、何ノ義ナ
 ルヲ知ラズ

の入口が北に向き、尾が屈して色の白いものは數百歳のものであつて、仙經ではこれを肉芝(にくし)といひ、これを食へば天年を延べるとしてある。

時珍曰く、燕は大いさ雀ほどで身が長く、脣口(しんこう)、豐頤(ほうぎ)で翅を布き、尾が岐れ、背

で飛び、向つて宿る。巢を作るには戊

巳の日を避け、春社に来て秋社に去る。

この鳥は、來ると泥を啣(くは)んで屋根の下

に巢を作り、去れば氣を伏して窺穴中

に蟄居(ちつき)するのである。或は海を渡つて

去來するといふが、それは、でたらめだ。


玄鳥が來たとき高禰(かうみ)といふ縁結びの神

に祈ると世嗣の子が授かるとか、或は

燕の卵を吞めば子が生れるとかいふも無根のことだ。或は燕は井底(せいぞ)に蟄するものだ

といふ。燕は屋内には入らぬけれども、井戸は空いてゐるものだからだ。燕は巢に

艾があるとそれに柄まぬ。凡そ狐、貉(ろく)の皮毛は燕に觸れると毛が脱ける。これはそ



燕

の物に何等かの關係があつて起る現象だ。

肉 氣味

【酸し、平にして毒あり】弘景曰く、燕肉を食へば人の神氣を損

じ、水に入ると蛟龍に吞まれるから食つてはならぬ。また殺することも宜しくない。

時珍曰く、淮南子に『燕は水に入つて蜃蛤じんかとなる』それで高誘の註に『蛟龍は燕

を嗜む。人が燕を食つたときは水に入つてならぬ』といつたのであつて、祈禱家は

燕を用ゐて龍を召ぶ。しかし深く考へて見るに、燕は蟄するもので變化はせぬもの

だ。蛤に變化するといふ説は、その眞否のほど信用の限でない。但し燕肉は有毒な

ものだから、それで食はれぬとなつてゐるのだ。

主 治

【痔蟲、(白)瘡蟲を出す】(別錄)

胡燕卵黃

主 治

【卒水浮腫には十箇づつを吞む】(別錄)

秦燕毛

主 治

【諸藥毒を解す。十四本を取つて灰に燒き、水で服す】(時珍)

屎 氣味

【辛し、平にして毒あり】

主 治

【蠱毒、鬼症、不祥の邪氣を

逐ひ、五癰を破り、小便を利す。香しく熬つて用ゐる】(別錄) 頤曰く、胡洽の疰病

を治する青羊脂丸の中に用ゐてある。【痔を療じ、蟲を殺し、目瞤を去る】(蘇恭) 【口

(四)大觀ニ燕蟲ノ二字ナシ。

(五)木村(重)曰ク、胡燕ハ前掲ノつばめヲ云フカ。

(六)此處ニ木經ノ二字ヲ註スベシ。

瘡、瘧疾を治す【孫思邈】 【湯にして小兒の驚癇きやうかんを溶す】（弘景）

【附 方】

舊三、新三。【蠱毒を解す】 藏器（蔵器）曰く、燕屎三合を取つて炒り、獨蒜（獨蒜）を

皮を去つて十箇と和して梧子大の丸にし、三丸づつを服す。蠱は利するに随つて出るものである。【瘧疾の禁厭】 藏器（蔵器）曰く、燕屎方寸匕を、發作の日の早朝に酒一升に和し、患者に兩手で捧げてその氣を吸はせる。口に入れぬやうに注意を要する。

人を害するものだ。【石淋を下す】 燕屎末五錢を冷水で服す。早朝服すれば食事時

（七）大觀ニ此處ニ葛氏方ノ三字アリ。

刻には尿中に石水が下るものだ（七） 【小便を通ずる】 燕屎、豆豉（豆豉）各一合を糊で梧子

大の丸にし、一日三回、三丸づつを白湯で服す。（千金） 【牙痛を止める】 燕子尿を梧

桐子大の丸にし、疼く部分で咬む。丸が溶化すれば疼が止まる。（袖珍） 【小兒の卒

驚】 痛む處があるやうで明に判らぬものである。燕巢中の糞を湯に煎じて洗浴す

る。（救急方）

窠中土 土部に記載してある。

燕屎草 卽ち窠草である。草部の九に記載してある。

石燕 (日華)

和名 いはつばめ
學名 Delichon urbica sp.
科名 つばめ(燕)科

(一) 木村(重)曰ク、
北支那ニハ羽毛白き
しつぱめ[D.
white(Swin.)]
ヲ産ス。滿洲ニテ土
燕(トモエ)ト稱スル
モノハつばめちどり
ナリ。

釋名

土燕(綱目)

集解

詵曰く、石燕は鍾乳穴の石洞中にゐるものだ。冬期に採れば食へるが、その他の月ではただ治病に用ゐ得るだけである。

炳曰く、石燕は蝙蝠(へんぷく)に似て口の四角なものだ。石乳汁を食物とする。

時珍曰く、これは石部中にある石燕とは異ふ。廣志に『燕に三種あつて、これは土燕といつて巖穴に乳するものだ』とあるそのものだ。

肉 氣味

【甘し、暖にして毒なし】

主治

【陽を壯にし、腰膝を暖め、

精を添へ、髓を補し、氣を益し、皮膚を潤ほし、小便を縮め、風寒、嵐瘴、溫疫の氣を禦(ふせ)く】(日華) 詵曰く、治法は、石燕十四羽に五味を和して炒熟し、酒一斗に三日間浸し、毎夜就寢時に一二盞を飲む。甚だ能く補益し、體力を強健にし、健啖(けんたん)ならしめる。

(二) 伏翼 (本經(三)上品)

和名 だうべんかにはり
學名 *Myotis daubentonii* (Teinseel)
科名 かにはり科

校正

時珍曰く、本經には、上品の部に伏翼の條があり、また天鼠屎の條があるが、此には李當之の本草に依つて一條に併合した。

釋名

蝙蝠

音は編福(ヘンフク)である。

天鼠(本經)

仙鼠(唐本)

飛鼠(宋)

本)

夜燕

恭曰く、伏翼とは晝は伏して翼のあるものといふ意味だ。

時珍曰く、伏翼は、爾雅には服翼と書いてある。(三)齊地方では仙鼠と呼ぶ。仙經には肉芝なるものの中に列してある。

集解

別錄に曰く、伏翼は太山の川谷、及び人家の屋間に生ずる。立夏の後に採つて陰乾する。天鼠屎は合浦の山谷に生ずる。十一月、十二月に採る。

弘景曰く、伏翼は白色にして倒に懸るもの以外は服されぬ。

恭曰く、伏翼、即ち仙鼠であつて、山孔中にゐて諸乳石の精汁を食物とする。いづ

(一) 本材(重)曰ク、人家ニ潛ムかはり(あぶらむし)ハ、鱗蝙蝠科ニ屬スルいへかはり *Tiphyscus abramus* (Tomlin) ニシテ、日本、支那ニ分布ス。共ニ蝙蝠(ペンフー)(北支)ヒンフオ(南支)ト呼バル。

(二) 上、本經ニ下ニ作ル。大觀ニ中ニ作

(三) 齊ハ水部阿井泉ノ註ヲ見ヨ。

(四) 合浦ハ草部山草類吉利草ノ註ヲ見ヨ。

れも千歳に達し、純白雪の如く、頭上に冠があり、大いさ鳩や鵲ほどのものだ。陰乾して服すれば肥健ならしめ、長生して千歳の壽を得せしめる。大いさ鵲ほどで、まだ白くならぬものは百歳のものだ。いづれも倒に懸り、その腦の重いものである。その尿はいづれも白色だ。薬に入るにはこの尿を用うべきものである。

頤曰く、蘇恭の説は仙經に所謂肉芝なるもののことをいつてゐるのだ。現に蝙蝠は古屋根の中に生ずる。白くして大なるものは蓋し稀だ。その尿もやはり白色のものもあるが、想ふに乳石孔中に産したものが右のやうなものになるのであらう。

宗奭曰く、伏翼は日中にもやはり飛べるのだが、ただ鷙鳥を畏れるので出ないだけだ。この物は善く氣を服するところから能く長壽を保つのであつて、それは冬期に食物を食はぬを見ても判る。

時珍曰く、伏翼は形が鼠に似て灰黒色だ。薄い肉翅があり、四足、及び尾を連合して一のやうになつてゐる。夏は出て冬は蟄し、日中は伏して夜間に飛び、蚊、蚋を食物とし、自ら能く發生し成育する。或は、鼯鼠が變化して蝠となり、鼠も化して蝠となり、蝠がまた化して鼯鼠となるといふが、恐らく全然さうではない。乳穴

に生ずるものは甚だ大きいものだ。或は、燕は戊巳の日を避け、蝠は庚申の日に伏すといふが、これは理解し能はぬ事實である。かの白色のものといふは、自らさうい

伏蝠

翼蝠



ふ種類があるのだ。仙經に、千百歳のものを服すれば人をして不死ならしめるなどいつてあるは方士の馱法螺だほらといふものだ。陶氏、蘇氏がそれを信じたのは馬鹿げたことである。按ずるに、李石の續博物志に『唐の陳子真は大いさ鴉あほどの白蝙蝠を得て服したところ、一夕にして大いに泄せうして死亡した』とある。

又、宋の劉亮は白蝙蝠、白蟾はくせん、蛤かの仙丹を得

(五) 蛤ハ蟾ノ誤。

(六) 吐番ハ種族名、今ノ西藏ノ地ニ據ル。此ニ吐番トハ西藏ノ地ヲ指スナリ。

て服し、立ろに死亡したといふ。これを記載して置いたならば愚なる迷を破るに十分であらう。この不死の説は抱朴子の書の記載に始つたものだが、その著者葛洪が世を誤るの罪、滿天下に及ぶといふべきだ。又、唐書には『吐番に天鼠といふがある。形狀は雀のやうで大いさ猫べうほどあり、皮は裘きうに作り得る』とあるが、これは

別の一種の鼠であつて、ここにいふ天鼠ではない。

伏翼 修治 穀曰く、凡そこれを使用するには重量一斤のものを要する。先

づ肉上の毛を拭ひ去り、また爪、腸を去り、肉翅、并に嘴、脚を留め、好き酒に一夜浸して取出し、黄精の自然汁五兩を塗つて炙き、汁が盡きるまで炙いて乾して用ゐる。

時珍曰く、近世ではこれを用ゐるに多くは煨いて性を存するだけだ。

氣味 鹹し、平にして毒なし 日華曰く、微熱にして毒あり。之才曰く、

莧實、雲實が使となる。

主治

【日暝癢痛】目を明にし、夜間物を視るに精光あらしめる。久しく服す

れば人をして熹樂し、媚好し、憂無からしめる 本經 日華曰く、久しく服すれば愁

を解く。【五淋を療じ、水道を利す】別錄 【婦人出産の餘疾、帶下の病で子無きに

主效がある】蘇恭 【久欬上氣、久瘧、癰癰、金瘡内漏、小兒の驚病、驚風を治す】

昨珍 藏器曰く、五月五日に倒に懸つたものを取つて晒し乾し、桂心、薰陸香を和

して烟に焼けば蚊を避ける。夜明砂、鼈甲を末にして烟に焼いても蚊を辟ける。

發明

時珍曰く、蝙蝠は性能く人を瀉す。故に陳子真等はこれを服していづれも死んだのである。後文に掲ぐる金瘡を治する方を觀るに、いづれも下利を發することになつてゐるのだから、その毒なることが推知されるのである。本經に、この物を毒なし、久しく服すれば烹樂して憂をなくすといひ、日華が、久しく服すれば愁を解くといつたのは、いづれも後世を誤ることだ。適、憂を増し愁を益すにはよいであらう。病を治するに用ゐるは兎も角、服食することはよろしくない。

附方

舊三、新八。

【仙乳丸】上焦が熱し、晝間常に好んで瞑するものを治す。

伏翼の重量二兩のもの一箇を腸、骨のあるまゝ炙き燥し、雲實を炒つて五兩、威靈仙三兩、牽牛けんじを炒り、芎實と各二兩、丹砂、鉛丹各一兩、膩粉じふん半兩を末にし、蜜で綠豆大の丸にし、七丸づつを木通湯で服し、知あるを度とする（普濟）【久欬上氣】十年二十年の長きに及び、諸藥の効果なきには、蝙蝠を翅、足を除いて燒き焦して研末し、米飲で服す（百一方）【久瘧の止まぬもの】范汪の方では、蝙蝠七個を頭、翅、足を去り、千杵搗いて梧子大の丸にし、一丸づつを清湯で服す。鷄鳴時に一九、正午前に一丸を服するのである。【久瘧の止まぬもの】伏翼丸——蝙蝠一箇を炙き、

蛇蛻皮一條を燒き、蜘蛛一箇を足を去つて炙き、鼈甲一枚を醋で炙き、麝香半錢を入れて末にし、五月五日の正午に研り勻ぜ、煉蜜を入れて和して麻子大の丸にし、五丸づつを溫酒で服す。(聖惠方)

【小兒の驚癇】蟄に入つた蝙蝠一箇の腹中に塊になつた硃砂三錢を入れ、新瓦合に入れて煨いて性を存し、冷えるを候つて末にし、空心に四回に分服する。小兒のまだ小さきものには五回に分けて白湯で服ます。(醫學集成)

【小兒の慢驚】返魂丹

小兒の慢驚、及び天弔夜啼を治す。蝙蝠一箇を腸、

翅を去つて黃に炙き焦し、人中白を乾し、蠟を焙じ、麝香と各一分を入れて末にし、煉蜜で綠豆大の丸にし、三丸づつを乳汁で服す。(聖惠方)

【多年の癰癰】癰えぬもの

に神效の方である。蝙蝠一箇、猫頭一箇を俱に黑豆の上に撒いて骨が炭になるまで燒き、末にして摻り、乾けるときは油で調へて傅け、連翹湯を内服する。(集要)

【金瘡出血】止まずして内漏となりたるには、蝙蝠二箇を焼いて末にし、方寸匕を水で服す。水を下して血が消くものである。(鬼遺方)

【腋下胡臭】蝙蝠一箇に赤石脂末半兩を全面に塗り、黃泥で包み固めて晒し乾し、煨いて性を存し、田螺水で調へて腋下に塗り、毒氣の上冲するを待つて急に下藥を服す。一二回通じがあつて妙效がある。

〔乾坤龍龜〕〔乾血氣痛〕蝙蝠一箇を焼いて性を存し、一錢づつを酒で服すれば直ちに

癒える。(生生編) 〔婦人斷産〕蝙蝠一箇を焼いて研り、五朝酒酢で調へて服す。(摘玄方)

腦

主治

〔顔に塗れば婦人の面皰を去る。これを服すれば人をして忘れざ

らしめる〕(藏器)

血及び膽

主治

〔目に滴せば人をして睡らざらしめ、夜中物を見得る〕(藏

器) 弘景曰く、伏翼の日、及び膽は、術家で洞視の法に用ゐる。

天鼠屎(本經)

釋名

鼠法(本經)

石肝(同上)

夜明砂(日華)

黑砂星(弘

景曰く、方家では用ゐない。俗間でも識らない。李當之曰く、即ち伏翼の屎だ。方言に天鼠と呼ぶものだ。

修治

時珍曰く、凡そこれを採取したならば、水で灰土、惡氣を淘り去り、

細砂を取つて晒し乾して焙じて用ゐる。その砂は乃ち蚊蚋の眼である。

氣味

〔辛し、寒にして毒なし〕之才曰く、白斂、白微を惡む。

主治

〔顔面の瘰癧で皮膚が(七)洗洗として時に痛むもの、腹中の血氣。寒熱積聚を破り、驚悸を際く〕(本經) 〔顔面の黒肝を去る〕(別錄) 〔灰に焼いて方寸匕を酒で服すれば死

(七) 洗洗ハ皮毛淒淒
藥家ノ貌ヲ云フ。

胎を下す』蘇恭【炒つて服すれば癰癰を治す】日華【馬撲損痛を治す。三箇を熱酒一升に投じ、その清を取つて服すれば立るに止み、數服にして瘥える】蘇頌、記載は續傳信方にある。【擣き熬つて末にし、飯に拌せて三歳の小兒に與へて食はせれば無辜病を治するに甚だ效驗がある】（備徵）【疳を治するに效がある】（宋龜）【目盲、障瞽を治し、目を明にし、瘡を除く】（時珍）

發明

時珍曰く、夜明砂、及び蝙蝠はいづれも厥陰、肝經の血分の藥であつて、能く血を治し、積を消す。故にその治するところの目瞽、盲障、瘡、癰、疳、驚、淋、帶、癰癰、癰腫はいづれも厥陰の病である。按ずるに、類説に『定海の徐道亨は赤眼を患ひ、蟹を食つて遂に内障となつて五年の間苦んだが、ふと夢に、ある僧が藥水で洗つて羊肝丸といふを服ませてくれた。その處方を求めると、僧は「洗淨した夜明砂、當歸、蟬蛻、木賊を節を去り、各一兩を末にし、黑羊肝四兩を水で煮爛してその末を和し、梧子大の丸にして食後に熱水で五十丸を服するのだ」といつた。覺めてからその法の通りにして服すると、遂に視力が完全に回復した』とある。

（○）定海、五代ノ吳越ノ時、今ノ浙江省鎮海縣ノ地ニ望海縣ヲ置き、宋ニ定海ト改ム。又明ノ時、今ノ舟山ニ定海衛ヲ置ク、即チ今ノ浙江省會稽道ノ定海縣ナリ。

〔九〕批ハ托ノ誤。

附方

舊一、新十一。

【內外障翳】夜明砂末を豬肝中にちよかんろう、批入して煮て食ひ、

汁を飲むが有效だ、〔直指方〕

【青盲で見えぬもの】夜明砂を糯米で黄に炒つて一兩、

柏葉を炙つて一兩を末にし、牛膽汁で和して梧子大の丸にし、毎夜就寢時に竹葉湯

で二十丸を服し、五更に米飲で二十丸を服す。瘥えれば止める。〔聖惠〕【小兒の雀目】

夜明砂を炒つて研り、猪膽汁で和して綠豆大の丸にし、五丸づつを米飲で服す。あ

る方では、黄芩等分を加へて末にし、猪肝を米泔で煮て取つた汁で半錢を調へて服

す。【五瘡の止まぬもの】〔二〕聖惠では、夜明砂末一錢づつを冷茶で服す。立ろに效

がある。○又ある方では、瘡が不定時に發作し、久しく經過して瘥えぬには、蝙蝠

糞五十粒、硃砂半兩、麝香一錢を末にし、糯米飯で小豆大の丸にし、發作前に十丸

を白湯で服す。【産前の瘡疾】夜明砂末三錢を空心に溫酒で服す。〔經驗秘方〕【欬嗽

の止まぬもの】蝙蝠を翅、足を去り、酒をつけて焼いて末にし、一錢を食後に白湯

で服す。〔壽域神方〕【小兒の魅病】紅紗袋に夜明砂を盛つて佩おびる。〔直指方〕【一切の

疳毒】夜明砂五錢を瓦瓶中に入れ、精猪肉三兩を薄く切つてその瓶に入れ、水で煮

熟し、先づその肉を病兒に與へて食はせ、その汁を飲ませて腹中の胎毒を取り下し、

一〇大觀ニ簡要濟衆
ニ作ル。

(一) 風蛭ハ齒紐。

(一) 木村(重)曰ク、
他ニ Schiropterus
ナル屬アリ、ももん
ガ (Pteromys) 屬又
アリ、共ニ鼯鼠(ウー
シユ)又ハ耳鼠(ルー
シユ)ト呼バル。

次に生薑四兩を皮共に切つて炒り、黃連末一兩と共に糊で黍米大の丸にし、一日三回、米飲で服す。(全幼心鑑) 【聾耳の汁の出るもの】夜明砂二錢、麝香一字を末にし、拭淨してから摻る。(聖惠) 【潰腫の排膿】夜明砂一兩、桂半兩、乳香一分を末にし、乾砂糖半兩を入れて井水で調へて傳ける。(直指方) 【腋下の胡臭】夜明砂末を敗汁で調へて用ゐる。【(二) 風蛭牙痛】夜明砂を炒り、吳茱萸を湯に泡けて炒り、等分を末にし、蟾酥で和して麻子大の丸にし、綿で二丸を裹んで含み、涎を吐く。(普濟方)

鼯鼠

鼯(ルキ) 鼠(ルキ)の二種の發音がある。

(本經下品)

和名 からむぎ
學名 Ictantia leucogenys, Temm.
科名 リス(果鼠)科

校正

鼯鼠はもとは獸部に掲げられてあつたが、今此には爾雅、説文に據つて禽部に移し入れることにした。

釋名

鼯鼠(本經)

鼯鼠(爾雅)

耳鼠(山海經)

夷田(爾雅)

鷯(禽經)

飛

生鳥(弘景)

時珍曰く、按ずるに、

許慎の説文に『鼯は、飛走し、且つ哺乳する鳥である。故に文字は鳥に従ふ。又、飛生と名ける』とある。本經に鼠に従つて書い

(三) 山都ハ秦ノ縣名、北周ニ廢ス。故城ハ今ノ湖北省襄陽縣ノ西北ニ在リ。

(二) 湖嶺トハ湖南、廣東、廣西地方ヲイフ。

(一) 關西ハ水禽類鶴ノ註ヲ見ヨ。

たのは形が似てゐるからである。この物は肉翅が尾に連り、飛んでも上に上れぬもので、ともすると礮^{てうが}り墜ちる。故にこれを鼯^こ鼠^そといふ。俗に癡なる物と呼んで鼯^こ鼠^そといふはこの意味から來たものだ。また螻蛄^{ろうこ}と同名の鼯鼠^{こそ}とも呼ぶ。

集解

別錄に曰く、鼯鼠^{こそ}ハ三山都の平谷に生ずる。

弘景曰く、この鼠は即ち鼯鼠である。飛生

鳥のことだ。形狀は蝙蝠のやうで、大いさは鷗^し、鳶^{えん}ほどあり、毛は紫色で暗夜に行飛する。

鼯^こ飛^そ——
世間ではその皮毛を取つて産婦に持たせ、それで出産を容易にする。

頌曰く、今は湖、嶺の山中に多い。南方

ではこれを多く妖怪視してゐる。

宗奭曰く、關西^{くわんせい}の山中によくゐる。毛の極めて密なものだ。いづれも下に向つ

て飛ぶもので、遠くは飛べない。その地では捕獲して皮を取り、それで防寒用の帽子を作る。



時珍曰く、按ずるに、郭氏の爾雅註に『鼯鼠は、形狀は小さい狐ほどで、蝙蝠に似た肉翅と四足があり、翅、尾、項、脇の毛はみな紫赤色、背は蒼白色、腹下は黄色、喙は難白色だ。脚は短く、爪が長く、尾は長さ三尺ほどあり、飛ぶものだ。子には哺乳し、子はその母の後に随ふ。聲は人の呼ぶ聲のやうだ。火烟を食ふ。高い處から下に飛ぶが、下から高くは飛び上がれない。性よく夜鳴く』とある。山海經に『耳鼠は、形狀は鼠のやうで、首は兎のやう、耳は麋のやうだ。その尾を以て飛ぶ。これを食へば昧せない。百毒を禦ぐ』とあるがこのものだ。その形狀は翅が四足、及び尾に聯つて蝠と同じである。故に『尾を以て飛ぶ』といつたのだ。嶺南に産するものは好く龍眼を食ふ。

氣味

【微温にして毒あり】

主治

【墮胎。出産を容易にする】（本經）

發明

頌曰く、世間ではその皮毛を取り、臨産にこれを持たせれば分娩が容易になるとして産婦に與へるが、小品方では服藥に入れ、飛生一箇、槐子、故弩箭羽各十四箇を合せ搗いて梧子大の丸にし、酒で二丸を服すれば産し易しとある。時珍曰く、鸛は能く飛ぶもので且つ出産する。故にその皮に寢、その爪を懷にす

(二) 木村(重)曰ク、大蠅蠅(ダアベンフ)ト稱セラル。寒號蟲ニ當ルヤハ疑ハシケレド、五靈脂(ツイリンシユ)ト稱セラルルハ蠅蠅類ノ糞ナリ。

(三) 周ハ草部山草類升麻ノ註、鶴ハ草部

ればいづれもよく分婉を催すといふ。それはその性が相感するのだ。濟生方の難産を治する金液丸には、その腹下の毛を丸にして服すとしてある。

寒號蟲 (宋開寶)

和名 しなおほかはほり?
學名 *Pteropus sp.*
科名 おほかはほり科

校正

蟲部より此に入る。

釋名

鵲鴟 獨毒

尿を五靈脂と名ける。時珍曰く、楊氏の丹鉛錄に、寒



〔蟲號寒〕
—脂靈五—

號蟲、即ち鵲鴟としてある。ここにはそれに従つた。鵲鴟は、詩には壺旦とし、禮には曷旦とし、説文には鵲鴟とし、廣志には侃旦とし、唐詩には曷旦としてあつて、いづれも意義に随つて假借した名稱だ。揚雄の方言に『關より西ではこれを鵲鴟といひ、關より東ではこれを城旦といひ、また倒懸ともいふ。』周、魏、宋、楚ではこれを獨春といふとあり、郭璞は『鵲鴟は

臨草類紅藍花ノ註ヲ
見ヨ。宋ハ草部山草
類防風ノ註參照。楚
ハ石部石炭ノ註ヲ見
ヨ。

(三)河東ハ草部山草
類甘草ノ註ヲ見ヨ。

(四)五臺ハ石部菩薩
石ノ註ヲ見ヨ。

夜鳴いて早く朝になるを待つ鳥だ。夏期には毛が生を盛つてゐるが冬期には裸體となり、晝夜鳴叫するところから寒號といひ、鷓旦といつたのであつて、古代に城旦春といふ晝夜米を舂かせる刑があつたところから、また城旦、獨春などいふ名稱を呼ばれたのだ』といつた。月令には『仲冬、鷓旦鳴かず』とある。蓋し冬至には陽が生じて漸く暖になるからだ、その尿を五靈脂と名けたのは、凝こほつた脂のやうな状態で五行の靈氣を受けたものといふ意味だ。

集解

志曰く、五靈脂は北地に産する寒號蟲の糞である。

禹錫曰く、寒號蟲は四足にして肉翅がある。遠くは飛べないものだ。

頤曰く、今は(三)河東かとうの州郡だけにゐる。五靈脂は鐵のやうに色の黒いものだ。採收に一定の時期はない。

時珍曰く、鷓旦は時刻を候うかがひ知る鳥であつて、(四)五臺の諸山に甚だ多い。その形狀は小さい鷄のやうで、四足に肉翅があり、夏期には毛に五色いふかりの彩があつて、その鳴聲は『鳳凰不如我』といふ。冬には毛が落ちて鳥の雛のやうになり、寒さを忍んで『得過且過』と鳴き叫ぶ。その尿は常に一處に集り、臭氣は甚だ臊惡さうあくで、粒の大

いさ豆ほどのものだ。糊のやうなものもあり、糖のやうな粘塊ねんくわいのものもある。世間ではやはり沙石を混入して賣つて居る。凡そ使用するには心が糖のやうになつてゐて潤澤なものを眞物とする。

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治 【食へば人體を補益する】（注調）

五靈脂

修治

頤曰く、この物は多く沙石が夾雜けふざつしてあつて、非常に修治の

六カ敷いものだ。凡そ用ゐるには、研つて細末にし、酒で飛過して沙石を去り、晒さらし乾して貯藏して用ゐる。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】人參を惡み、人を損ずる。

主治

【心腹

冷氣、小兒の五疳。疫しんぞを辟け、腸風を治し、氣脈、婦人の血閉を通利する】（開寶）

【傷冷

積を療ず】（蘇頌）

【凡そ血崩の過多なるには、半炒半生にして酒で服す。能

く血を行やり、血を止め、血氣刺痛を治するに甚だ效がある】（養心）

【婦人の經水過多、

赤帶の絶えぬもの、産前、産後の血氣諸痛。男、女一切の心腹、脇肋、少腹の諸痛、

疝痛、血痢、腸風の腹痛、身體の血痺刺痛、肝寒で寒熱を發するもの、反胃、消渴、

及び痰涎たんげつに血を挾はさんで塞を成すもの、血の腫子を貫くもの、血が凝つて齒痛するも

（五）大觀ニ積下ニ案
字アリ。

の、重舌、小兒の驚風、五疳、癰疾を止める。蟲を殺し、藥毒、及び蛇、蠍、蜈蚣、傷を解す」〔昨珍〕

〔六〕大綱ニ此二字行經穴ノ三字ニ作ル。

發明

宗奭曰く、五靈脂は、引經には有功だが、血を生ずることは不能である。この物は肝に入ることの最も速なものだ。嘗てある者が目中醫を病み、往來不定であつたが、これは血に病があつたので、肝に血を受ければ視力が明になる。目の病は血を治せねば合理的でない。そこで五靈脂の藥を用ゐると、それで癒えた。又、ある者は毒蛇の咬傷で良久して昏倒したが、一老僧が酒で藥二錢を調へて灌ぐと遂に甦つた。そこで萍を咬傷の患部に傅け、少頃してまた二錢を灌ぐとその苦痛が皆去つた。その方を尋ねて見ると、それは五靈脂一兩、雄黃半兩を共に末にするだけであつた。その後も蛇毒に中つたものに用ゐて悉く奏效した。

時珍曰く、五靈脂は足の厥陰、肝の經の藥であつて、氣、味俱に厚い。陰中の陰である。故に血分に入るのである。肝は血を主り、諸痛はみな木に屬し、諸蟲はみな風に生ずる。故にこの藥は能く血病を治し、血を散じ、血を和して諸痛を止め、驚癇を治し、瘰癧を除き、積を消し、痰を化し、疳を療じ、蟲を殺し、血痺、血眼

の諸症を治するのだ。いづれも肝經に屬する病である。失笑散は獨り婦人の心痛、血痛を治するのみではなく、凡そ男女、老幼、一切の心痛、脇肋、少腹痛、疝氣、并に産前、産後の血氣で痛むもの、及び血崩、經溢けいじつであらゆる藥の效を擧げぬものにいづれも能く奏功する。屢々實驗上效果を收めた。眞に近世の神方である。又、按ずるに、李仲南は『五靈脂は崩中を治す。ただ血を治するだけの藥ではなく、風を去るの劑である。風は動くものだ。衝任の經が虚して風に傷められ、營血を襲はれると、ために崩中暴下となるのであつて、荊芥けいはい、防風の崩を治すると同じ意味である。この點でも古人の識見の深奥なることが肯うけとかれる』といつた。これも一説であるが、しかし肝血の虚滯もやはり自ら風を生ずるといふ關係には想到してゐなかつたやうだ。

附方

舊六、新三十一。

【失笑散】男女、老少の心痛、腹痛、少腹痛、小腸疝氣

で諸藥の效を奏せぬものを治し、能く行やり、能く止め、婦人妊娠の心痛、及び産後の心痛、小腹痛、血氣痛に就中妙である。五靈脂、蒲黃ぼわう等分を研末し、先づ醋二盃で末を調へて熬つて膏にし、水一盞に入れて七分に煎じ、その藥の入つたまゝ熱服

する。なほ止まぬときは再服する。ある方では、醋の代りに酒を用ゐる。ある方では、醋糊で和して丸にし、童尿酒で服す。（和劑局方）【紫金丸】産後の惡露がさつぱりせず、腰痛して小腹が刺すやうに覺え、時に寒熱を作し、頭痛し、食思なきを治

し、又、久しく瘀血があり、月經不順にして黃瘦し、食思なきを治し、また心痛を療ず。功は失笑散と同じ。五靈脂を水で淘淨し、炒つて末にして一兩を好き米醋で

調稀し、慢火で熬膏し、眞蒲黃末を入れて和して龍眼大の丸にし、一丸づつを、水と童尿と各半盞を七分に煎じたもので溫服し、少頃して再服する。惡露は直ちに下る。血塊、經閉には酒に磨つて服す。（楊氏產乳）【靈脂散】男子の脾積氣痛、婦人の血

崩諸痛を治す。飛過した五靈脂を烟が盡きるまで炒つて研末し、一錢づつを溫酒で調へて服す。この藥は惡臭氣があつて服し惜いが、焼いて性を存すれば妙である。

或は酒、水、童尿で煎じて服す。これは抽刀散と名け、産後の心腹、脇肋、腰膀痛を治し、能く惡血を散ずる。心煩し、口渴するには、炒つた蒲黃半減を加へ、霹靂酒で服す。（金匱要略）腸風下血には、烏梅、柏葉の煎湯で服す。中風麻痺痛には、草烏半錢を加へ、童尿、水、酒を共に煎じて服す。（永類鈴方）【産後の血運】産後の血運で

人事不省となるを治す。五靈脂二兩を半生半炒にして末にし、一錢づつを白水で調へて服す。口噤こうきんするときは押し開けて灌ぐ。喉に入れば癒える。(圖經) 【産後の腹痛】五靈脂、香附、桃仁等分を研末し、醋糊で丸にして一百丸を服す。或は五靈脂末を神麴糊しんきくこで丸にし、白朮陳皮湯びやくじくちんぴたうで服す。(丹溪方) 【兒枕で痛むもの】五靈脂を慢に炒つて研末し、二錢を酒で服す。(產寶) 【血氣刺痛】五靈脂を生で研つて三錢を、酒一盞を煎沸して熱服する。(靈苑方) 【卒はたかの暴はつしき心痛】五靈脂を炒つて一錢半、乾薑を炮やいて三分を末にし、熱酒で服すれば立ちに癒える。(事林廣記) 【心、脾の蟲痛】男女に拘らず、五靈脂、檳榔びんらう等分を末にし、石菖蒲を煎じた水で三錢を調へて餅にして服す。猪肉一二片。(海上仙方) 【小兒の蚘くわい痛】五靈脂末二錢、靈礬を火飛して半錢を用ゐ、一錢づつを水一盞で五分に煎じて溫服する。蟲を吐出して癒えるものだ。(圖孝忠集效方) 【經血の止まぬもの】五靈脂を烟が盡さるまで炒つて研り、每服二錢、當歸二片、酒一盞を六分に煎じて熱服し、三五回で效を取る。(經效方) 【血崩の止まぬもの】頤い曰く、五靈脂十兩を研末し、水五盞で三盞に煎じて滓しを去り、澄清ちやうせいして再び煎じて膏にし、神麴末二兩を入れて和して梧子大の丸にし、二十丸づつを空心に

溫酒で服すれば止む。極めて效がある。○集要では、五靈脂を焼いて研り、鐵秤錘てつしやうすゐを紅く焼いて酒に淬ひたし、その酒で調へて服す。效があるまでを度とする。【胞衣の下らぬもの】惡血が心に冲するには、五靈脂を半生半炒にして研末し、二錢づつを溫酒で服す。(產寶) 【子腸脫出】五靈脂を烟に焼いて薰あらかじする。豫め鹽湯で洗淨する。

(危氏) 【吐血、嘔血】五靈脂一兩、盧會三錢を研末し、水を滴たろして芡子大けんしだいの丸にし、二九づつを漿水に溶化して服す。○又、血が妄行して胃に入り、吐して止まぬを治するには、五靈脂一兩、黃芪半兩わうぎを末にし、新汲水で二錢を服す。【吐逆の止まぬもの】男女に拘らず、連日に互つて嘔も、七飲も、湯藥も咽を下らぬものに即效がある。五靈脂を治淨して末にし、狗膽汁で和して芡子大の丸にし、一丸づつを生薑を煎じた酒に磨り溶かし、勢込んで一口に熱吞する。口を漱そくいではならぬ。急に溫粥少量を食つて壓する。(經驗) 【食物を消化し、氣を消す】五靈脂一兩、木香半兩、巴豆四十箇を煨熟して油を去り、末にして糊で菉豆大ろくづだいの丸にし、五九づつを白湯で服す。(普濟方) 【久瘧の止まぬもの】或は一日に一回、二三回、或は二三日に一回發作するには、五靈脂・頭垢各一錢、古城石灰二錢を研末し、八餅へいで皂子大さうしだいの丸にし、

(七)大觀ニ食ニ作ル。

(八)餅ハ餅ノ誤歟。

一丸づつを五更に無根水で服す。直ちに止む神效の方である。(海上) 【消渴飲水】竹
龍散——五靈脂、黑豆を皮を去つて等分を末にし、三錢づつを冬瓜皮湯で服す。皮
がなければ葉を用ゐてもよし。一日に二服する。更に熱藥を服してはならないが、
八味丸から附子ぶしを去つて五味子を加へたものは宜し、少し渴するものは二三服で止
める。(保命集) 【中風癱緩なんくわん】追魂散——五靈脂を研末し、水飛して上に浮く黒濁と下
に沈む沙石とを去つて研末し、二錢づつを熱酒で調へて一日一回服し、小續命湯を
少しづつ服す。(奇效方) 【手足の冷麻】寇こ曰く、風冷で氣血閉し、手足身體が疼痛し、
冷麻するには、五靈脂二兩、沒藥もつやく一兩、乳香半兩、川烏頭せんうづ一兩半を炮やいて皮を去り、
末にして水を滴らして彈子大の丸にし、一丸づつを生薑を溫酒に磨つたもので服す。
(本草衍義) 【骨折腫痛】五靈脂、白及はくきふ各一兩、乳香、沒藥各三錢を末にし、熱水と香
油とで調へて患部に塗る。(乾坤秘鑑) 【損傷接骨】五靈脂一兩、茴香うゐきやう一錢を末にし、先
づ乳香末を極痛處に傳けて小黃米粥をそれに塗り、それから右の二末をその粥上に
摻かつて帛で裹み、木牌子で夾んで縛る。三五日で效がある。(儒門事親) 【五疳潮熱】肚
脹し、髮焦げるには大黃、黃芩わうこんを用ゐてはならぬ。胃氣を損傷して別の病症を生ず

る恐がある。五靈脂を水飛して一兩、胡黃連五錢を末にし、雄猪膽汁で黍米大の丸にし、一二十丸づつを米飲で服す。(金幼心鑑) 【欬肺脹】がいそう 鰾肺丸すうはいがん——五靈脂二兩、胡桃仁八箇、柏子仁半兩を研り勻ぜ、水を滴し和して小豆大の丸にし、二十丸づつを甘草湯で服す。(普濟) 【痰血凝結】紫芝丸——五靈脂を水飛し、半夏はんげを湯に泡け、等分を末にし、薑汁に浸した蒸餅で梧子大の丸にし、飲で二十丸づつを服す。(百一方) 【酒積黃腫】五靈脂末一兩に麝香少量を入れ、飯で小豆大の丸にし、一丸づつを米飲で服す。(普濟方) 【目に浮翳を生じたもの】五靈脂、海螵蛸かいほうせう各等分を細末にし、熟猪肝に蘸つけて日毎に食ふ。(明目經驗方) 【重舌脹痛】五靈脂一兩を淘淨して末にし、米醋で煎じて漱ぐ。(經驗良方) 【惡血齒痛】五靈脂末を米醋で煎じた汁を含み咽む。(直指方) 【血瘰の潰血くわいけつ】一患者が、もとあつた一瘰をたまたま抓破さして一筋の出血が止まず、七日に及んで死せんとしたが、或人が五靈脂末を上じに摻つてやると直ちに止んだ。(楊拱醫方選要) 【血潰怪病】凡そ人の目の白珠が黒く渾にごり、物は平常のやうに視え、毛髪が堅直して鐵條のやうになり、飲食は十分に攝とれるが、物を言はず、酔へるが如き状態のものを血潰と名ける。五靈脂を末にし、二錢を湯で服すれば癒える。

(夏子益奇疾方) 【大風瘡癩】五靈脂末を油で調へて塗る。(摘玄方) 【蟲、虺きの螫せき蟲】凡そ蜈蚣、蛇、蠍、毒蟲の傷には、五靈脂末を塗れば立ろに癒える。(金匱鈞玄) 【赤蛇の螫傷】上に同じ。

本草綱目禽部第四十八卷 終

本草綱目禽部

第四十九卷

本草綱目禽部目錄第四十九卷

禽の三 林禽類十七種

斑鳩 嘉祐

青鸕 拾遺 卽ち黃褐侯。

鳴鳩 拾遺 卽ち布穀。

桑扈 食物 卽ち蠟粥。伯勞 嘉祐 鷓鴣か附す。

鸛 唐本

百舌 拾遺

練鵲 嘉祐

鵲 食物

啄木鳥 嘉祐

慈鳥 嘉祐

烏鴉 嘉祐

鵲 別錄

山鵲 食物

鶻嘲 嘉祐

杜鵑 拾遺

鸚鵡 食物 秦吉了、烏鳳か附す。

右附方 舊五、新九。

禽の四 山禽類十一種 附一種

鳳凰 拾遺

孔雀 別錄

駝鳥 拾遺

鷹 別錄

鵬 綱目

鵬 綱目 卽ち魚鷹。

鵬 別錄

鴟鵂 拾遺

鵂 拾遺

鳩 別錄

姑獲鳥 拾遺

治鳥 綱目 木客鳥、獨足

鳥か附す。

鬼車鳥 拾遺

諸鳥有毒 拾遺

右附方 舊四、新九。

禽の三 林禽類十七種

(一) 斑鳩 (宋嘉祐)

和名 しらこばと、一名じゆずかけばと。
 學名 *Streptopelia decaocto* (Erwinsky)
 科名 はと科

(二) 木村(重)曰ク、背面灰褐色、下面ハ灰白色ニ微紅アリ、頭ニ黑色ノ輪アリ、念珠掛ノ名ココニ因ス。印度、支那、朝鮮ニ多シ、斑鳩(パンキウ)ト稱ス、いかるナラズ。桑駕參照。

釋名

斑佳

音は錐(スサ)である。

錦鳩 范汪方)

鶉鳩 左傳註)

祝鳩

時

珍曰く、鳩といひ、鶉ちうといふはその聲である。斑といひ、錦といふはその色である。佳とは尾の短いものをいふ名である。古に

は、庖人は以て戸祝して尊俎そんそに登す。これを祝鳩と謂ふとある。これはいづれも鳩の大にして斑あるものをいつたのだ。その小

にして斑なきものをば佳といひ、鶉——音は葵(キ)——といひ、荆鳩といひ、楚鳩といふ。鳩の子をば鶉鳩ふきうといひ、役鳩といひ、

[斑]

[鳩]



糠鳩といひ、郎阜らうかうといひ、辟阜といふ。揚雄の方言に諸種の鳩を混列してあるが、據るに足らない。

集解

禹錫うゑき曰く、斑鳩は處處地にゐる。春分には化して黃褐侯となり、秋分には化して斑鶻はんこくとなる。黃褐侯とは青鶻のことだ。

宗奭そうせき曰く、斑鳩には、斑あるものと、斑なきものと、灰色のものと、大なるものと、小なるものと、かく數色あるが、その用途は一である。嘗て數年間飼養して見たが、一向に春秋分に變化したものはなかつた。

時珍ときちん曰く、鳩きうは能く鷹に化し、斑鳩は黃褐侯に化すといふ説はその出處が判らない。現に鳩は、小さくして灰色のものと大きくして梨花點のやうな斑あるものがあるが、いづれも善く鳴かない。ただ項下に眞珠のやうな斑のあるものが大きい聲で能く鳴く。それを媒なかだちとして鳩を誘ひ寄せ得るものだ。これだけが藥に入れて就中良い。鳩はその性嚴格で孝行なものだが、巢を作ることが拙だ。纔わづかに數本の枝を掛け渡したけなので、往往にして卵が墮ちる。天候が雨になりさうなときは雌を追ひ、霽はれると反對に呼びかける。故に『鳩せうは巧にして危く、鳩は拙にして安し』といひ、

或は『雄は晴に呼び、雌は雨に呼ぶ』といふ。

鳩肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【目を明にし、多食すれば

氣を益し、陰陽を助ける】

〔嘉祐〕

【久病虚損の人はこれを食へば氣を補す】

〔宗爽〕

【これを食へば人をして噎せざらしめる】

〔時珍〕

發明

時珍曰く、范汪の方に、目を治するものに斑鳩丸といふがあり、總

錄に、目を治するものに錦鳩丸といふがある。倪惟賢氏は、斑鳩は腎を補する。故

に能く目を明にするのだといつたが、竊かに謂ふに、鳩は能く氣を益するものだから

能く目を明にするのだ。獨り腎を補するだけではない。古には、仲春に羅氏が鳩を

獻じて以て國老を養ひ、仲秋に年老の者に授くるに鳩杖を以てした。それは鳩の

性は噎せずして物を食ひ、且つまた氣を助けるからだといふ。

血 主治

【熱飲すれば蠱毒を解するに良し】

〔時珍〕

屎 主治

【聾耳の膿が出て疼痛するもの、及び耳中に聾聾を生じたものを治

す。夜明砂末と共に等分を吹く】

〔時珍〕

(二)本草逢原ニ鵪鶉ヲ
鳩ニ作ル。

(一) 木村(重)曰ク、
頭以下背面ハ濃緑
色、頭ト胸ハ赤シ、き
んばと(indico)lapis
indica sp.)キナンニ
類ス。

(二) 青 鵪

音は雉(ス
キ)である。

(拾遺)

和名 あなばと
學名 *Sphenurus Sieboldii*, Temm
科名 はと科

釋名 黃褐侯 拾遺)

集解

藏器曰く、黃褐侯の形狀は鳩のやうで綠褐色だ。聲は小兒が竿を吹くやうである。

時珍曰く、鳩には白鳩と綠鳩とあるが、現に夏期に出る一種の糠鳩に、微し紅色を帶び、小さくして羣をなすものがある。掌禹錫の所謂、黃褐侯は秋に斑雉に變化するとは、恐らくこれをいつたのだらう。好んで桑椹、及び半夏の苗を食ふ。昔、ある人がこれを過多に食つて喉痺を患ひ、醫師が生姜で解して癒えたことがある。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【蟻瘻、惡瘡には五味で淹け

て炙いて食ふ。極めて美味だ】(藏器) 【五臓を安じ、氣を助け、虛損を補し、膿を排し、血を活す。并に一切の瘡癰、癰瘻】(嘉祐)

(一) 木村(重)曰ク、北滿地方ニ棲息シ、冬期ニ南支ニ至ル。日本ニ普通ニ見ラルルほととぎす、つつどり等モ亦棲ム。郭公(コウクン)最モ知ラレ、布穀(フイク)鳴鳩(ミーチウ)略帖(コーク)等ト呼バル。杜鵑ノ項參照。

(二) 鴈 鳩 (拾遺)

和名 くわくこう
學名 *Cuculus canorus telephonus*, Hume.
科名 とけん(杜鵑)科

釋名

布穀(列子)

鵲鵲

音は憂羽(クワツキク)である。

穫穀(爾雅註)

郭公

藏器曰く、布穀とは鴈鳩のことだ。

江東では獲穀と呼び、また郭公といふ。北方の地では撥穀と呼ぶ。

時珍曰く、布穀には多くの名があるが、みな

それぞれ鳴聲の似たところに因つて呼んだもので、俗に『阿公阿婆』とか、『割麥挿禾』とか、


『脱却破袴』とかいふ類は、いづれもその鳴く

時期が農耕の時期に當るから呼んだものだ。或

は、鴈鳩、即ち月令の鴈鳩であつて、鳴の字は

鴈の字の訛だともいふが、それでも通じる。禽

經、及び方言には、いづれも鴈鳩、即ち戴勝といひ、郭璞はそれを非なりとしてあ



鴈 鳩
——穀 布——

る。

集解

藏器曰く、布穀は鷦さうに似て尾が長く、牝牡飛び鳴いて翼を以て相い拂ひ撃つ。

時珍曰く、按ずるに、毛詩疏義に『鳴鳩は大いさ鳩ほどで黄色を帯び、啼鳴して相呼ぶが相集らぬ。巢をば作れぬもので、多くは樹穴、及び鵲じやくの空巢に栖んで子を哺し、朝には上から下り、暮には下から上る。二月、穀雨の後に始めて鳴き、夏至後に止む』とあり、張華の禽經註には『仲春に鷹が化して鳩となり、仲秋に鳩がまた化して鷹となる。故に鳩の目はやはり鷹の目のやうなのだ。列子に「鷦せんが鷽せんとなり、鷽が布穀となり、布穀が久して復た鷽となる」といふはそのことだ』とあり、禽經には、又『鳩は三子を生じ、一は鷽がくとなる』とある。

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【神を安じ、志を定め、人を

して睡を少からしめる】(注頤)

脚脛骨

主治

【人をして夫妻相愛せしめる。五月五日に取收め、各一本づつ男は左、女は右を帯びる。それを水中に置けば自ら能く寄り添ふものだといふ】(藏器)

(一) 木村(重)曰ク、東部西北利亞ヨリ支那ノ大陸ニ分布ス。蠟嘴(ラーツエ)ノ名が普通ニシテ愛玩用ニ飼育サル。斑鳩ノ項參照。日本ノいかるヨリ嘴強大ナリ。

桑 鷹 (食物)

和名 しないかる、一名はしぶといかる
 學名 *Haploana personata magnirostris*, Linvert.
 科名 すずめ(雀)科

釋名

竊脂(爾雅) 膏雀 郭璞 蠟嘴雀

止である。左傳に、少皞氏は鳥を以て官に名け、九鷹を九農正となすとあつて、それは民を止めて淫するなからしめる職務であつた。桑鷹とは桑の間にゐる鷹の意味である。その嘴が或は淡白にして脂の如く、或は凝黄にして蠟の如くだから、古代に竊脂せつしと名け、俗に蠟嘴らふしと名けたのであつて、淺色を竊といふ。陸機が、この鳥は好んで脂肉を盗んで



〔鷹 桑〕
 嘴 蠟

食ふからだといつたのは當てにならぬ。

集解

時珍曰く、鷹鳥は處處の山林にゐる。大いさは鷓鴣ほど、蒼褐色で黄色の斑點があり、好んで粟、稻を食ふ。詩に『交交桑扈、有鶯其羽』とあるはこの鳥だ。その背喙は微し曲つて厚く、頑丈で光瑩なものだ。或は淺黃、淺白、或は淺青、淺黒、或は淺玄、淺丹色のものがある。鷹の類に九種あるが、いづれも喙の色と聲音で別けたものだ。故に毛の色をいふのではない。爾雅に『春鷹は鷓鴣、夏鷹は鷓玄、秋鷹は鷓藍、冬鷹は鷓黃、桑扈は鷓脂、棘鷹は鷓丹、行鷹は鷓喈、宵鷹は鷓喈、老鷹は鷓鷄』とあるがそれである。現に俗間には多くこの鳥の雛を飼つて戯舞を仕込むものがある。

(注題)

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【肌肉の虛羸に皮膚を益す】

伯勞 (宋嘉祐)

和名 おほからもず
學名 *Lanius sphincopterus, Calanitis*
科名 もず(鷓)科

(一) 木村(重)曰ク、大型ノもずニシテ支那大陸ニ分布ス。もず、ちこもず、かおもず、しまもず、おほもず、共ニ産スル

釋名

伯鷓(夏小正註) 博勞(詩疏) 伯趙(左傳) 鷓(爾詩) 音は梟(フキ)で

モ、代表的ノモノヲ
掲グ。伯勞（ボーロ
ー）鷓（ケウ）雲南青
（ユンナンチン）等ノ
名稱アリ。

ある。鷓（孟子）音は決（ケツ）である。時珍曰く、按ずるに、曹植の惡鳥論に『鷓は鳴
聲が嗅嗅（げきげき）といふ。それで名としたのだ。陰氣に感じて動く殘害の鳥だといふは、そ



〔伯 勞〕
—— 鷓 ——

の聲を惡むためにいつたこ
とで、愚人は信ずるが通士
は問題にしない』とある。

世俗に、尹吉甫は後妻の讒
言（げん）を信じてその子伯奇を殺
した。それが後に化してこ
の鳥となつたので、この鳥
の鳴く家には凶事があると

いひ傳へてゐるが、それは好事家の牽強（けんきやう）傅會（ふうかい）の説である。伯勞とはその聲に象（かたど）つた
もの、伯趙（はくぢやう）とはその色をいつたもので、趙（ちやう）とは皂（さう）の音の訛（かたが）である。

集 解

時珍曰く、伯勞、即ち鷓（けき）である。夏鳴いて冬止む。それで月令に候時
の鳥としたのである。本草にはその形状の説明がなく、後世一般にはこの鳥に關す

る知識がないが、郭璞の爾雅註に『鵒は鵒くわつに似て大きい』といひ、服虔は『鵒くわつは轄クワツアツ』と發音する。項の白い鵒ちだ』といひ、張華の禽經註には『伯勞は形は鵒くわつに似てゐるが、鵒くわつは喙が黄で伯勞は喙が黒い』といひ、許慎の説文には『鵒くわつは鵒くわつに似て鵒くわつがある』といひ、顏師古の漢書註には、鵒くわつを子規とし、王逸の楚詞註には、鵒くわつを巧婦とし、揚雄の方言には、鵒くわつを鵒くわつとし、陳正敏の遯齋閒覽には、鵒くわつを梟けうとし、李肇の國史補には、鵒くわつを布穀とし、楊慎の丹鉛錄には鵒くわつを鵒けりとしてあつて各異つてゐる。しかし竊に謂ふに、鵒くわつは既にその鳥で季節を候うかひ知るといふ以上、必ず見ることの稀なものではないに相違ない。ここにこれ等の諸説を通じてその得失を考へるに、王氏の説は全然謬であつて議論の餘地がない。郭氏の説に據ると今の苦鳥をいふらしい。張、許二氏の説に據ると今の百舌をいふらしく、鵒くわつに似て鵒くわつがあるといふが、しかし鵒くわつは單獨に栖むことを好み、鳴けば蛇が結するものだが、百舌には蛇を制する能力はないのだからその點が同じくない。顏氏の説に據ると、子規を鵒くわつ——音は弟桂(ダイケイ)——と名け、伯勞を鵒くわつ——音は決(ケツ)と名けるといふのであるが、月令には北方に起るとしてある。子規は北方の鳥

(三) 晉地トハ今ノ山西省地方ヲイフ。水部井泉水晉ノ註參照。

(三) 本書ニハ鵲ヲ鵲ニ作ル。

でない。楊氏の説に據ると鵲鳴だといふが、鵲鳴とは寒號蟲のことで、ただ(三)晉地方にだけゐるものだ。陳(正敏)氏の説に據ると、目撃したといひ、斷然これを梟なりとしただけで、その形態に就ては何もいつてないが、陳藏器の『鴞、即ち梟なり』といふ説とは合致せぬやうに思はれるし、爾雅に『鵲、一名鵲、一名鵲』とあるから、これとは同物でない。李氏の説に據ると、布穀、一名鵲、といひ、字の發音は相近いが、また月令の鵲、その羽を拂ふとあると矛盾する。楊氏の説に據ると鵲鳴だといふが、鵲鳴とは鵲鳴のことで、鵲鳴ほどの小さいもので三月に鳴くものだ。禮記に、五月鵲始めて鳴くとあり、爾雅に、七月鵲鳴とある文の内容と合致しない。以上八氏の説はかくその一致點を缺いてゐるが、要するに郭氏の説が正しい準據となるやうに思はれる。按ずるに、爾雅に『鵲、鵲の醜はその飛ぶや、鵲』といつてある。鵲とは足を斂めて翅を竦てることだ。既にかやうに鵲、鵲と並稱してあり、今の苦鳥は鳩ほどの大いさで色黒く、四月に鳴き、その鳴聲は苦苦といひ、また姑惡とも名け、一般に多くこれを惡み、俗に嫁が姑に苦められて死んだのが化したものだといひ、尹吉甫が伯奇を殺したといふ説と頗る相近いのであるが、ただその苦鳥が能

く蛇を制するや否やが判らないのである。淮南子には『伯勞の血を金に塗つて置けば人が敢て取らない』とある。

附 録

鷓鴣

時珍曰く、鷓鴣は、爾雅に鷓鴣——音は批及(ヒキウ)——と名

(四) 木村(重)曰く、鷓鴣後攻ヲ要ス。戴

勝ナレバやつがしらナリ、鷓鴣ノ項參照。

(五) 本書ニハ『鷓鴣戴勝』トアリ、郭註

ニ『今亦呼爲戴勝』トアリ。

(六) 滇ハ今ノ雲南省ノ地ナリ。

羽(キク)——といひ、また鴉鳴といふ。鳥より小さくして能く鳥を逐ふ。三月に鳴く』といつてある。今俗にこれを駕犁といひ、農家ではこれで季節を候ふ。五更に『架架格格』と曉方まで鳴き續けて止む。それで滇地方では榨油郎と呼び、また鐵鸚鵡ともいふ。能く鷹、鵠、鳥、鵲を啄むもので、隼の屬である。南方では鳳凰皂隸と呼び、汴地方では夏鷄と呼ぶ。古代に夜明けを催す鳥に喚起と名けるものがあつたといふが、蓋しこの鳥であらう。この鳥は大いさ燕ほどで色黒く、尾は長くして岐があり、頭上に毛勝を戴くもので、巢を作つてある場所にはその類の鳥に再び巢を作らせない。作れば必ず徹底的に闘ふものだ。楊氏はこれを指して伯勞とし、批頬をば鷓鴣としたが、俱に誤だ。月令には『三月戴勝桑に降る』とある。

(七) 勝ハ首飾ナリ。

毛 氣 味

【平にして毒あり】

主 治

【小兒の繼病には、毛を取つて帶び

る。繼病とは母が妊娠してなほその兒に乳を飲ませ、その兒が瘰癧のやうな病になり、他日相繼いで腹大となり、瘡えたり發つたりするもので、他の妊婦がそれに近づいてもやはり能くそれに繼いでその病を發するものだ。北方の地ではまだこの病を識らない】(嘉祐)

發 明

時珍曰く、按ずるに、淮南子に『男子が蘭を種ゑると美く育つが芳し

くない。繼の子は物を食つても肥るが澤がない。それは情が往來せぬからだ』とある。蓋し母親の情がその腹の子の方に在るからだ。繼病は魅病とも書く、魅とは小鬼の名であつて、その病兒が魅鬼のやうに羸瘦するといふ意味だ。大抵これも丁癸疳病である。

踏 枝

主 治

【小兒の發語の遅きには、これで鞭てば速に物言ふやうになる】

(嘉祐)

發 明

時珍曰く、按ずるに、羅氏の爾雅翼に『本草に、伯勞の踏んだ樹の枝で小兒を鞭てば速に物言ふやうになるといふは、萬物の鳴けない時に獨りこの鳥だ

(ハ) 丁癸疳病ハ、小兒ノ腹ノ大キクナル疳病。

けよく鳴くものだから、その類に『あやかるのだ』とある

(一) 鵪 鵪

音は勅欲(ク) (唐本草)

和名 きうくわんてう
學名 *Ichabys intermedia*, (A. Hux.)
科名 むくどり(椋鳥)科

釋名

鵪鵪(周禮)

唼唼鳥(廣韻)

八哥(俗名)

寒臯(萬畢術)

時珍曰く、

(一) 木村(重)曰ク、俗名八哥(バアコウ)ナレバ九官鳥ナリ。舌ニ硬キ莢アリ、脱スレバ人語チ真似スト云フ。南支那ニ見ル。愛玩用トス。和書くろつぐみニ作ル。

(二) 瞿瞿然ハ無守ノ貌、驚遽不審ノ貌。

この鳥は好んで水に浴し、その睛が瞿瞿然たるものだからかく名けたのだ。王氏の字説には、行欲の意味で、尾があつて足が勾つてゐるから鵪鵪といふ。勾に従ひ欲に従ふ省文の文字だといつてあるが、やはりそれでも通じる。唼唼といふはその聲だ。天候が寒くなつて雪が降りさうなとき羣飛する。それが雪を豫告するやうだから寒臯といつたので、臯は告の意味である。

集解

恭曰く、鵪鵪とは鵪に似て幘のあるものことだ。

藏器曰く、五月五日に雛を取り、舌端を剪り去ると能く人間の言葉を真似するものだ。又、火を取らせることの出来るものだ。

時珍曰く、鵪鵪は鵪の巢、樹の穴、及び人家の屋脊中に巢を作るもので、身も首

（三）濟ハ水名、亦タ
 沅水ト稱ス。河南省
 濟源縣ノ西、王屋山
 ニ源ヲ發シ、東南流
 シテ豬龍河トナリ黃
 河ニ入ル。又、山東
 省龍城縣ノ温河モ濟
 ト稱ス。



【鴿 鷺】
 —哥 八—

も俱に黒く、兩翼の下に各、白點があり、その舌は人の舌のやうなもので、剪りつめてやると能く人間のやうに物を言ふ。嫩い（わか）うちは口が黄だが、老いると口が白くなり、頭上には幘のあるものも無いものもある。周禮に『鴿（こ）は三濟を臨（み）えず』とあるが、それは地氣の關係があるからだ。

肉 氣味

【甘し、平にして毒なし】 説曰く、寒なり。主 治 【五痔に血

を止める。炙いて食ひ、或は散にして飲服する】（唐本） 【一羽を炙いて食へば吃噎（きつあ）を

治し、氣を下し、靈に通ずる】（日華） 【老嗽を治す。十二月末日に取つて五味で醃（ひ）け、

炙いて食ひ、或は羹にして食ひ、或は散に搗いて蜜で丸にして服す。十二月末日に

得たものでなければ用ゐてはならぬ】（孟詵）

附 方

（原文缺）

目 睛

主 治

【乳汁に和して研り、目中に滴す。人をして目明にしてよく霄外

の物を見せしめる】(藏器)

百舌 (拾遺)

和名 つぐみ?
學名 *Monticola cinerea* (Temm.)
科名 つぐみ(鶇)科

釋名

反舌 鶇鶇

音は轄軋(クワツアツ)である。時珍曰く、按ずるに、易通

(一)木村(重)曰ク、
分布廣ク、春秋ノ渡
リノ時ハ大群ヲナシ
テ支那大陸ヲ去來
ス。滿洲ニテハ畫眉
(フアメイ)ト稱ス。
今百舌ノ語ナシ、
假ニ定メテ後致テ俟
ツ。つぐみ他ニ數種
ヲ分布ス。



〔舌 百〕

に『能く反復して百鳥の音のやうだ。故に鶇鳥と名ける』とある。やはり聲に象つたものだ。今俗間では牛屎喇哥と呼ぶ。それは形が鶇鶇に似て氣が臭いからだ。梵書には舍羅と名けてある。

〔集解〕

藏器曰く、百舌とは今の鶇のことだ。

時珍曰く、百舌は處處にゐる。樹孔や窟穴中に棲み、形狀は鶇鶇のやうで小さいが身がやや長く、灰黒色で微に斑點があり、喙も尖つて黒く、行くには頭を俯せ、好んで蚯蚓を食ふものだ。春以後に絶えず鳴き囀り、夏至後には聲

を出さなくなり、十月以後には蟄こもりに入る。世間でこれを飼ふものもあるが、冬期には死んで了ふ。月令に『仲夏、反舌に聲なし』とあるがこの鳥だ。蔡邕さいおがこれを蝦が蟄まとしたのは誤だ。陳氏は鶯うだといひ、服虔の通俗文に、鶯う鶯うを白脰はくじう鳥としたのも誤だ。音は似てゐるが毛の色が異ふ。

肉 氣味

缺

主治

【炙いて食へば小兒の久しく物を言はぬを治し、ま

た蟲を殺す】(藏器)

窠及び糞

主治

【諸蟲咬に研末して塗る】(藏器)

練

鵲

(宋嘉祐)

和名 かはりさんくわうてう
學名 *Terpisphona ineri*, (Gould).
科名 さんくわうてう(三光鳥)科

(一)木村(重)曰ク、尾長ク美ナルタメ愛玩用トシテ飼養ス。朝鮮、支那、滿洲ニ棲ミ、冬ハ馬來半島ニ越ス。練鵲(リエンシユ)帶鳥(タイニヤキ)白練(バイリエン)ト稱サル。

集解

禹錫曰く、練鵲ハツトルクは鵲ハツトルに似て小さく、黒褐色である。槐子を食物としたものが佳し。冬、春期間に採る。

時珍曰く、その尾は鵲のやうで長く、練鵲のやうな白毛のあるものがこの鳥である。禽經に『冠鳥は性勇である。練鵲は性樂である。帶鳥は性仁である』とあつて、



〔鵲 練〕

て飲服する】(嘉祐)

(一) 鵲 (食物)

和名 かうらいうぐひす
學名 *Oriolus chinensis indians*, Jerdon.
科名 黄鳥科

釋名

黄鳥(詩經)

黄鵲(說文)

鵲黄(爾雅)

倉度(月令)

爾雅には商庚と

してある。青鳥(左傳)

黄伯勞

時珍曰く、禽經に『鵲は嚶嚶と鳴くからかく名け

たのだ』とある。或は鵲は項に文があるから、その文字は鵲に従ふので、鵲とは項

の飾のことだといふ。或は鵲鳥とも書く、それは羽に文があるからで、詩に『有鵲

(一) 木村(重)曰ク、もず大ノ黄鳥ニテ、日本ノ鶯ノ如ク美聲ヲ張ラズ、滿洲ヨリ支那本土ニ分布ス。南方支那ニ於テハ *Ictornis* 屬ノきばらうぐひす、たいわんうぐひす等ヲ産ス。黄鳥(ホアンニヤチ)青鳥(チンニヤチ)黄鵲(ホアンリ)黄伯

張華は「帶鳥とは練鵲の類をいふのだ」といつてある。今は俗に拖白練と呼ぶ。

氣味

〔甘し、溫、平にして毒な

し〕

主治

〔氣を益し、風痰を治

す。細剉して香しく炒り、袋に盛つて酒中に浸し、毎日その酒を取つて溫め

勞ハホアンボウラウオノ名アリ。

(二) 齊ハ水部阿井泉ノ註、周ハ草部山草類升麻ノ註、幽州ハ同ク人參ノ註、秦、淮ハ金部鐵ノ註ヲ見ヨ。

其羽』とあるがそれだ。その色が黄にして鸛れいを帯びてゐるから黃鸛くわうくわんなどの諸名があるのだ。陸機は『三齊地方ではこれを博黍はくしよといひ、周地方ではこれを楚雀ちせといひ、幽州ではこれを黃鸛くわうくわんといひ、秦地方ではこれを黃鸛くわうくわんといひ、淮わい地方ではこれを黃伯勞くわうはくろうといふ』といつてある。唐の玄宗はこれを金衣公子と呼んだ。或は黃袍くわうほうともいふ。

集解

時珍曰く、鸛くわんは處處にゐる。鸛くわんより大きく、雌雄めいゆう雙さうび飛び、身體の毛は黄色で、羽、及び尾には黒色まじが雜り、眉黒く、嘴尖り、脚青く、立春後に鳴き、



〔鸛〕

麥が黄ばみ、樵せうの熟する時期に尤も甚しく鳴く。その音は圓滑にして機を織る音のやうに聞える。これは節に應じ時に趨おもむく鳥であつて、月令に「仲春、倉庚鳴く」とあり、説文に「倉庚が鳴けば蟄かづが生れる」とある。冬期には蟄かづに藏

れて田塘中に入り、泥で自らを卵のやうに裹み、春になると出る。

肉「氣味」【甘し、溫にして毒なし】「氣味」【陽氣を補益し、脾を助ける】

（汪頴）【これを食へば妬^{ねた}まなくなる】（時珍）

「發明」頴曰く、この鳥は春の陽に感じて先づ鳴くものだ。人體を補するはそ

れがためである。

時珍曰く、按ずるに、山海經に『黃鳥、これを食へば妬^{ねた}せず』とあり、楊夔の止妬論に『梁の武帝の鄴后は嫉妬深い性質だつたが、ある者が、倉庚の料理が妬を療ずるものだといふことを聞き、それを食はせると果して半ば減じた』とある。

二 啄木鳥（宋嘉祐）

和名 たいわんこげら
學名 *Yungipicus pygmaeus Indoenis* (Swinhoe)
科名

（一）木村（重）曰く、南方支那、臺灣等ニ産ス。コレニ類シテ頭部ニ紅色ナキたいわんやまげら（*Picus* 屬）モ産ス。北支那ニテハまんじゅうくまげら（*Dryocopus* 屬）ヲ産ス。共ニ啄木鳥（チヨームーニヤチ）ト

「釋名」斲木（爾雅）鷲 時珍曰く、この鳥は樹木を斲裂^{たくれつ}して蟲^{むし}を取つて食ふ

ものだからかく名けたのだ。禽經に『鷲の志は木にあり、鵲^{てつ}の志は水にあり』とある。

呼バル。山啄木(サン
チヨーム)ハたいわ
んこげらナリ。

集 解

禹錫曰く、異物志に「啄木には大あり、小あり、褐あり、斑あり、褐なるは雌であつて、斑あるは雄である。木を穿つて蠹を食ふので、俗に、雷公といふ採藥吏が化けたのだといふ。山中にゐる一種に、大いさ鵲じやくほどにして青黒色の、頭上に紅毛のあるものを、土人は山啄木と呼ぶ」とある。



〔鳥 木 啄〕

時珍曰く、啄木は、小なるは雀ほど、大なるは鵲ほどあり、面は桃花のやうで喙と足の色はみな青く、爪が剛つよく、喙が利すく、喙は錐のやう、長さ數寸あつて舌は喙くちよりも長く、その端に針刺があつて、蠹ついなを喙み鉤り出して食ふ。博物志に『この鳥は能く喙で字を畫いて蠹を自ら外に出させる』とあり、魯至剛は『現に岡、廣、蜀地方では、巫家ふかがその符字を收めて驚を收め、毒を治療する』といつてある。山啄木なるものは頭上に赤毛があるので、野人は火老鴉くわらあと

呼ぶ。よく火炭を食ふものだ。王元之の詩に『淮南の啄木は大きい鴉の如く、頂は仙鶴に似て丹砂を堆くす』とあるがその鳥だ。やはり薬用に入れるが、その効果は同じものだ。

肉

氣味

【甘く酸し、平にして毒なし】

主治

【痔瘻、及び牙齒の疳齕、

蟲牙には、焼いて性を存して研末し、孔子中に入れる。三回以上は用ゐない】（嘉祐）

【勞蟲を追ひ、風癰を治す】（時珍）

發明

禹錫曰く、淮南子に『啄木は齧を癒す』とあるは、類するところを以

てその効果を収めるのだ。荆楚歲時記には『野人は五月五日に啄木を取つて齒痛を治す』とある。

時珍曰く、勞を追ひ、癰を治し、瘻を治すといふは、いづれも蟲を制する意味を取つたのだ。

附方

舊一、新二。

【瘻瘡膿水】止まずして瘻口のはぬには、啄木一羽――

或は火老鴉もよし――を鹽泥で固濟して煨いて性を存して研末し、二錢匕を酒で服す（姚大夫方）【勞を追ひ、蟲を取る】啄木禽一羽、硃砂四兩、精猪肉四兩を用ゐ、啄

木を一晝夜餌えを與へず置いて、砂と肉との二味を食はせ、全部食ひ盡したとき鹽泥で固濟して一夜煨ゆき、五更に取出して打破らずに泥のまま土中三尺深さに埋め、次の日取り出して破開し、銀、石器に入れて研末し、無灰酒に麝香少量を入れたもので一服し、十分手配をして蟲の出るを監視し、速かに鉗つまみ出して油鍋に入れて煎じ、後に局方の嘉禾散かふんさん一劑を服す。（胡雲翹經驗方）【多年の痼病】臘月に啄木鳥一羽を取り、先づ瓦礫ぐれくわんに荊芥穗を一寸厚さに鋪しいてその上に鳥を置き、再び一寸厚さに穗で蓋ひ、無灰酒三升をそれに傾け入れ、鹽泥で固濟して炭火で煨ゆき、酒が乾くを度としてそのまま置いて冷まし、取出して末にし、石膏二兩、鐵粉一兩、炮やいた附子一兩、硃砂、麝香各一分、龍腦一錢を入れて共に研まり勻よぜ。先づ溫水を二口三口飲んでから、一錢づつを溫酒一盞で調へて服して直ちに臥す。發作するとまた一服し、一日隔てて再服する。十服に過ぎずして癒える。（保幼大全）

舌 主 治

【齩齒の痛むには、綿で尖を裹んで咬む】（梅師）

附 方

新一。

【啄木散】蟲牙を治す。啄木舌一枚、巴豆一箇を研勻し、猪鬃

一莖を用ゐて少量づつを牙根に點ける。立ろに癒える。（聖惠）

血 主 治

【庚の日に西に向つて熱飲すれば、人の顔色を朱の如くにして光彩人を射せしめる】（時珍） 記載は岫巖神書にある。

腦 主 治

魯至剛の俊靈機要に『三月三日に啄木を取り、丹砂、大青を肉に拌ぜて餌とすること一年にして腦を取り、雄黄半錢を和して十丸にし、毎日東に向つて水で一丸づつを服す。久しくして能く形を變じ、怒るときは神鬼の如くなり、喜ぶときは常人そのままだ』とある。

(一) 慈 鳥 (宋嘉祐)

和名 みやまからす
學名 *Trypanocorys fragilegus pascinator* Gould.
科名 からす科

釋 名

慈鴉 (嘉祐)

孝鳥 (說文)

寒鴉

時珍曰く、鳥の字の篆文はその形を

(一) 木村(重)曰ク、全身深黒色ニシテ紫色光澤ヲ帶ブ、東部西比利亞ヨリ支那ニ分布ス。老公(ラオコン)ト稱サル、支那南部ニテハおうちう(秋鳥科 *Bucconga* 屬)及ビかはがらす(河鳥科 *Chalcus* 屬)モ共ニ慈鳥ト稱スルコトアリ。みやまからすハ四川省彭縣城ニテ文字通りニ空闊キ程何萬羽トナク群集ス。

象したものだ。鴉の字は鴉とも書く。禽經には、鴉は啞啞と鳴くから鴉といふとある。この鳥は初生から六十日間母に餌を哺せられ、成長すると反つてその母に六十日間哺する。慈孝なりと謂ふべきだ。北方の地ではこれを寒鴉といふ。冬期に尤も甚しくゐるものだ。

集解

禹錫曰く、慈鳥は北方の土地に極めて多い。烏鴉うかに似て小さく、多く羣飛して鴉鴉といふ鳴聲を出す。糞臭せんしゅうでなく、食へるものだ。

時珍曰く、鳥には四種あつて、

小さくして純黒な、鶩う小さく、反

哺するものは慈鳥である。慈鳥に

似て鶩大きく、腹下が白く、反哺

せぬものは鴉鳥である。鴉鳥に似

て大きく、項の白いものは燕鳥で

ある。鴉鳥に似て小さく、鶩赤く、

穴居するものは山鳥である。山鳥

は一名鶩けきといひ、西方に産する。燕鳥は一名白脰はくじゅう、一名鬼雀、一名鶩鶩——音は軒

軋ハカツツアツ——といふ。禽經には『慈鳥は反哺す。白脰は不祥なり。大鶩は善く

警す。』玄鳥は夜に吟ず』とあり、又『鳥鳥は背ふむいて飛び、向つて啼く』とある。

又、蜀しよく徽けいには火鶩と呼ぶ火を啣くはむものがある。



〔鳥 慈〕

玄ハ哀ノ誤。
蜀徽トハ今ノ四
川省ノ國境地力チイ
ズ。

肉 氣味

【酸く鹹し、平にして毒なし】

主治

【勞を補し、瘦を治し、

氣を助け、咳嗽を止める。骨蒸羸弱ろみじやくのものには、五味を和して淹け、炙いて食ふが良し】（嘉祐） 説曰く、北帝攝鬼錄中にもまた『慈鴉卵を用う』とある。

烏鴉

（宋嘉祐）

和名 たらがらす、一名くまろからす
學名 *Coloeus dauricus*, (Pallus)
科名 からす科

釋名

鴉烏（小爾雅）

老鴉 雅と鴉と同じ。

鸛 音は預（ヨ）である。

鸛鵒

音は匹居（ヒツキヨ）である。

楚烏（詩義疏）

大鸛烏（禽經）

集解

時珍曰く、

烏鴉は觜大きく、性貪さんしで好んで鳴き、善く烏網を避ける。

古代には鴉經といふがあつて、この鳥で吉凶を占つたものだが、北方の地では鴉を喜んで鴉を惡み、南方の地では鴉を喜んで鴉を惡む。しかし師曠が白項のものを不祥なりとしたのが正しいやうだ。

肉 氣味

【酸く澀し、平にして毒なし】

説曰く、肉は澀くさく臭くして食はれ

ない。ただ病を治するだけに用ゐる。藏器曰く、肉、及び卵を食へば人をして昏

（こ）木村（重）曰く、
胸以下ノ下面ハ灰白
色、他ハ黒色ナリ、北
部支那ニ多ク、稀ニ
日本ニ來ル。鸛（ユ）
鸛鵒（ヒーチユ）老鴉
（ウオヤ）小鸛鵒（シアオハンヤール）
ト稱サル。



〔烏〕

忘せしめる。その毛を把つてもさうだ。蓋し昏するほどにはないにして、もその難臭が甚しいのだ。

主治

【瘦病欬嗽、骨蒸勞疾には、臘月に瓦瓶で固濟して焼いて性を存し、末にして一錢づつを飲服する。又、小兒の癇疾、及び鬼魅を治す】

す】（蓋補）

【暗風癇疾、及び五勞七傷の吐血、欬嗽を治し、蟲を殺す】（時珍）

發明

頤曰く、烏鴉は、今は一般に多く急風を治するに用ゐるが、本經には記載がない。臘月に捕取し、翅、羽、髯、足の全きものを泥で固濟して煨いて藥に入るべきものであつて、諸風を治する烏犀丸中に用ゐることが和劑局方に記載してある。

時珍曰く、聖濟總錄に、破傷中風で牙關緊急し、四肢強直するを治するものに金烏散といふがあつて、煨いて藥に入れるとしてある。調合する品目が多くあるが、

ここには記録しなす。

附方

新五

【五勞、七傷】吐血し、欬嗽するには、烏鴉一羽の肚中に、耗

樓種一具、

白礬少量を

入れて縫合し、煮熟して四回に分服する。(壽域神方)

【暗風痼

疾】臘月の烏鴉一羽を瓶に入れて鹽泥で固濟して煨き、放冷して取出して末にし、

硃砂末半兩を入れ、

一日三回、一錢づつを酒で服す。十日に過ぎずして癒える。○

又ある方では、烏鴉一羽全體を瓶で固濟して煨いて研り、胡桃七箇、蒼耳心子七箇

と末にし、一錢づつを空心に熱酒で服す。(いづれも保幼大全)

【疝氣偏墜】右の胡桃、

蒼耳を用ゐる方に新生兒衣一副を煨き研つて入れる。(同上) 【經脈不通】積血の散ぜ

ぬには、烏鴉散を用ゐて治す。烏鴉を皮、毛を去つて炙いて三分、當歸を焙じ、好

き墨と各三分、延胡索を炒り、蒲黃を炒り、水蛭を糯米で炒つて各半兩、芫青を糯

米で炒つて一分を末にし、一錢づつを酒で服す。(總錄) 【虛勞瘵疾】烏鴉一羽を絞殺

して毛、腸を去り、人參片、花椒各五錢を入れて縫合し、水で煮熟して食ひ、その

湯で飲下し、鴉骨、參、椒を焙じ研つて棗肉で丸にして服す。(吳球便民食療)

烏目

氣味

【毒なし】

主治

【吞めば人をして諸魅を見せしめる。或は

研つて汁を目中に注げば夜中よく鬼を見る【藏器】

頭 主治

【土蜂瘻には灰に焼いて傳ける】（聖惠）

心 主治

【卒に發つた欬嗽には炙熟して食ふ】（肘後）

膽 主治

【風眼で紅爛せるものに點ける】（時珍）

翅羽 主治

【高處から墜下して瘀血が心を搶き、顔色青く、呼吸短きには、

右翅七枚を取つて焼き、研つて酒で服す。吐血して癒えるものだ】（蘇頌） 記載は肘後にある。【鍼刺の肉に入りたるには、三五枚を炙き焦して研末し、醋で調へて傳ける。數回にして出て甚だ效がある。又、小兒の痘瘡の出ずして復た入るを治す】

（時珍）

附方

新二。

【痘瘡の復陷】十二月に老鴉の左翅を取り、辰の日に灰に焼き、

獐猪血で和して莢子大の丸にし、獐猪尾血と溫水とに一丸づつを溶化して服す。それで出るものだ。（聞人規痘疹論）

(一) 木村(重)曰ク、
光澤アル黒色ノ地ニ
白斑アリ。支那全土、
臺灣、九州、朝鮮ニ分
布ス。支那大陸、人
家近キ樹木ニ大ナル
集アルハ、總テかさ
さきノ集ニテ群集
ス。鵲(チユエ)喜鵲
(シーチユエ)四喜鵲
(スーシーチユエ)神
女(シエンニユ)ト稱
サル。

(一) 鵲 (別錄下品)

和名 かみどり
學名 Ixon sordida, Gould.
科名 からす科

釋名

飛駁鳥 陶弘景

喜鵲(禽經)

乾鵲(新語)

時珍曰く、鵲の古文は鵲

の象形を描いたものだ。鵲はしやくしやく哨哨と鳴くから鵲といひ、鵲は色が駁雜だから駁といひ、靈にして喜を報ずるものだから喜といひ、性最も濕を惡むものだから乾といつたのである。佛經にはこれをすうに芻尼といひ、小説にはこれを神女といつてある。

集解

時珍曰く、鵲は鳥の屬であつて、大いさは鴉ほどで尾が長く、嘴が尖

り、爪が黒く、背が緑、腹が白で、尾、翮は黑白駁雜である。上下に飛んで鳴き、鳴聲で感じて孕み、卵をば視てか孵へす。冬末に始めて集くひ、巢の入口は太歳を背にし太乙に向ふ。來年風の多いときは、それを豫知して必ず低い場所に巢を作る。

故に『乾鵲は來を知り、猩猩は往を知る』といふのだ。段成式は『鵲は梁のやうになつた木の下に隠して巢を作るものだ。それは鷲鳥に狙はれないやうにするのである。人がもしそれを見れば富貴になる前兆だ。鵲は秋になると毛が正しく生を更り、



【 鵲 】

頭が禿げる』といつてある。淮南子には『鵲が糞を蛭に落すと、蛭は反つてそれを受けて啄む。火が金に勝つ意味だ』とある。

雄鵲肉

氣味

【甘し、寒

にして毒なし】日華曰く、涼な

り。主治 【石淋に結熱を

消す。焼いて灰にした中に石を

投ずると解散するものは雄である【別錄】藏器曰く、焼灰の淋汁を飲めば淋石が自

ら下る。【消渴疾を治し、風、及び大、小腸澀、并に四肢の煩熱、胸膈の痰結を去

る。婦人は食つてはならぬ】蘇頌【冬至に鵲を圍の前に埋めれば時疾溫氣を辟ける】

（時珍）記載は肘後にある。

發明

弘景曰く、凡て鳥の雌雄は區別し難いものだが、その翼の左が右を覆ふものは雄である。右が左を覆ふものは雌である。又、毛を焼いて屑にし、それを

水中に納れて見て、沈むものは雌、浮くものは雄である。ここに石を投ずるとあるが、これは恐らく鵲だけのことで、その他の鳥はさうと限らない。

腦 主治

弘景曰く、五月五日に取つた鵲腦じやくのうは術家で用ゐる。

時珍曰く、按ずるに、淮南萬畢術に『丙寅の鵲腦は人をして相思はしめる』とあり、高誘の註に『鵲腦を雌雄各一箇を道の中で焼き、丙寅の日に酒中に入れて飲めば人をして相思はしめるのだ』とある。又、媚藥びやくの方中にもこれを用ゐてあるところを見ると、陶氏の所謂術家とはやはりそれ等の類をいつたのらしい。

巢 主治

【多年を経たものを焼いて水で服すれば、顛狂、鬼魅、及び蠱毒こどくを療じ、それで巢たなりの物の名を呼ぶものだ。また瘡瘡に傅けるも良し】（日華）【正月元日の朝、灰に焼いて門内に撒けば盜を辟ける。その重巢を柴で焼いて研り、一日三回、方寸匕を飲服すれば、積年の漏下斷えずして困篤こんとくなるものを治し、一个月にして效を取る】（時珍） 記載は洞天錄、及び千金方にある。重巢とは連年重産した巢のことだ。

附方

新二

【小便の禁ぜぬもの】重鵲巢中の草一箇を灰に焼き、一日二回、

二錢匕、つづを薔薇根皮二錢の煎湯で服す （聖惠）

(一) 木村(重)曰ク、
 かささぎニ似テ尾長
 ク嘴赤シ。雲南地方
 ニ一屬(Uroisus)アリ、
 共ニ山鵲(サン
 チユエ)山喜鵲(サン
 シーチユエ)灰喜鵲
 (ウイシチユエ)ト呼
 バル。日本ノななが
 ニ類ス。

山鵲 (食物)

和名 しななが
 學名 *Cyanopica cyanus interposita* Harter.
 科名 からす科

釋名

鶯 渥(アク)學(カク)の二音がある。(爾雅) 鵲 音は汗(カン)である。(同

上) 山鵲(俗名) 赤嘴烏 酉陽雜俎)

集解

時珍曰く、山鵲は處處の山林にゐる。形状は鵲のやうで色黒く、文采(もんさい)があり、嘴赤く、足赤く、尾が長く、遠くは飛べない。これも能く鵲、雀を食ふ。



山鵲

諺に『朝鶯(あさぐさ)は晴に叫び、暮鶯(ゆふぐさ)は雨に叫ぶ』といふ。説文にはこれを未來の事を知る鳥とし、字説には『能く鷹、鷗(せう)の聲を眞似、性惡であつて、その類のものが相値(あ)ふと搏(う)つ』とあるはいづれもこの物を指

(二) 一説ニ戴鶯、戴鶯ハ即鶯鶯チ云フ、疑フラクハ誤ツテ混説セルナリ。

(一) 木村(重)曰ク、頭ニ羽冠アリ。西比利亞、蒙古ニ棲ミ、渡リノ際支那、日本ニ來ル。鶯鶯(クーチヨウ)楊鶯(ピーチ)戴勝(タイシエン)ト呼バル。

したのだ。鄭樵はこれを喜鶯としたが、誤だ。花勝を戴いたやうな文采があるので、またニ戴鶯、戴鶯と呼ぶ。

氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【これを食へば諸果の毒を解す】

(注題)

鶯

嘲

(宋嘉祐)

鶯は骨(コツ)滑(クラツ)の二種の發音がある。

和名 やつがしら
學名 Uppa opops sibirica, Linnberg.
科名 やつがしら(戴勝)科

釋名

鶯鶯(爾雅)

鶯鶯(左傳)

屈鶯(爾雅)

鶯鶯

鶯は渥(アク)學(ガク)の

二音がある。阿鶯(雜俎) 鶯鶯 音は藍呂(フンロ)である。時珍曰く、その目は鶯に、

その形は鶯に似てゐる。鶯とは山鶯のことだ。その聲は嘲嘲たるもので、その尾は

屈促し、その羽は縑縑のやうだ。故にかかる諸種の名稱がある。阿鶯といふは鶯鶯

の訛である。陸佃は『凡そ鳥は、朝鳴くを嘲といひ、夜鳴くを嘔といふ。この鳥は

朝鳴くからだ』といつてある。禽經に『林鳥は朝嘲き、水鳥は夜嘔』とあるはこ

のことだ。

集解

禹錫曰く、鶺鴒は南北の總てにゐる。山鶺鴒に似て小さく、尾が短く、



鶺鴒 山
——鶺鴒——

青毛冠があり、聲多く、青黒色のもので、深林中にゐる。飛翔しても遠くへは行けぬ。北方の地では鶺鴒鳥と呼ぶ。東都賦に『鶺鴒春鳴く』とあるはこの鳥だ。

時珍曰く、この鳥は春來て秋去り、好んで桑椹を食ひ、酔ひ易くして性の淫なるものだ。或は、鶺鴒は戴勝だといふものもあるが、その眞否は審でない。鄭樵がこれを鶺鴒としたのは誤だ。

肉 氣味

【鹹し、平にして毒なし】

主治

【氣を助け、脾、胃を益し、

頭風目眩を治す。煮炙して一回に一羽全部を食へば至つて效驗がある】（嘉祐） ○現に江東の地方人が瘡頭と呼ぶ頭風で、先づ兩項邊から筋起し、直線に上に頭に入つて頭悶し目眩するその病のことである。

(一) 杜鵑 (拾遺)

和名 ほととぎす
學名 *Cuculus poliocephalus*, Latham.
科名 とけん(杜鵑)科

釋名

杜宇(禽經)

子鵲

音は撫(ケイ)である。

子規

また秭歸とも書く。

鷓鴣

音は弟桂(タイケイ)である。また鷓鴣とも書く。

催歸

また思歸とも書く。怨

鳥周燕(說文)

陽雀

時珍曰く、蜀人は鵲を見て古の王杜宇を思ふといふところか

(つつどり。とぐろくわつ、こ) (以上 Cuculus 屬) ばんげん (Centropus 屬) 他二屬ヲ産ス。鴈鳩項參照。

ら杜鵑と呼んだのだ。それを杜宇が化して鵲となつたのだなどいふ説をなすものもあるが、それは誤だ。鵲と子鵲、子規、鷓鴣、催歸などの諸名とは、いづれもその

聲の似てゐるところに因み、それぞれ地方音で呼んだだけのものだ、その鳴聲は『不

如歸去』といふやうに聞える。諺に『陽雀が叫べば鷓鴣が哭する』といふその鳥で

ある。禽經には『江左では子規といひ、(二) 蜀右では杜宇といひ、(三) 甌越では怨鳥と

いふ』とある。服虔の漢書の註に、鷓鴣を伯勞としたのは誤で、名は同じだが物は

異ふ。伯勞は一名鵲といふが、その字は決(ケツ)と發音するのであつて桂(ケイ)と發

音するのではなう。

(二) 蜀右トハ四川省ノ東半部、蜀江以東ノ地ナイフ。
(三) 甌越トハ珠崖、儋耳、即チ瓊州島ノ地ナイフ。

集 解

藏器曰く、杜鵑は鷓鴣たうのやうな小さいもので、鳴き呼んで已まぬものだ。蜀王本紀に「杜宇は蜀に君臨して望帝となり、その臣繁靈べつれいの妻に淫したことから位を禪あづつて亡にげ去つた。その時子規鳥が鳴いてゐたので、蜀人は鷓鴣の鳴くのを聞くと望帝の身の上を思ひ悲しむ」とある。荆楚歲時記には『杜鵑の初聲を眞先に聞けば



〔 鷓 鴣 〕

その人に別離のある前兆だ。その聲を眞似ると血を吐く。厠かみにゐて聞くと不祥だ。その禁厭きんえんの法としては、ただ狗の聲を眞似てそれに應こたへることだ』とある。異苑には『ある者が山に入つて行く時、その一羣を見て退屈たいきつ紛らしに

その眞似をし、嘔血して死んだ』とある。これは世間でこの鳥は血の出るまで啼かねば止まぬものだといふところから、嘔血云々の話が始つたのだ。

時珍曰く、杜鵑は蜀中に産し、現に南方にもゐる。形状は雀、鷓鴣のやうで黧黑色せいろくしやくだ。口が赤く、小さい冠がある。春の末頃に鳴き、夜は曉方まで鳴き徹とほし、鳴くには必

(四) 翠ハ臍ニ同シ尾肉ナリ。

(一) 木村(重)曰ク、孰レモ支那ニ原産セズ、總テ熱帶地方ヨリ舶來サレタルモノナリ。鸚鵡(アーモ)ト云ハル。

ず北に向ふ。夏になると尤も甚しく鳴いて晝夜止まず、その聲の哀切なものだ。農家ではこの鳥の鳴くので時候を見て農事に著手する。ただ蟲、蠹^くだけを食ふもので、巢を作つて居れず、他の鳥の巢に子を産む。冬期には蟄^{かく}し藏れるものだ。

肉

氣味

【甘し、平にして毒なし】

主治

【瘡癰の蟲あるものには、薄

く切つて炙^いき熱して貼る。蟲が出盡きて已む】(時珍)

發明

時珍曰く、按ずるに、呂氏春秋に『肉の美なるものは鶯^{けい}燕^いの翠』と

あるところを見ると、昔は一般にもやはり常に食つたものだ。

(一) 鸚鵡

鸚鵡

(食物)

和名 あうむ、及びいんこ
英名 Parrots and Macaws.
科名 あうむ科、及びいんこ科

釋名

鸚哥(俗名)

乾臍

時珍曰く、按ずるに、字説に『鸚鵡^{あうむ}といふは、嬰^{えい}

兒が母の言葉を學ぶやうだからで、文字は嬰母に従ふ』とある。また鸚鵡^{あうむ}とも書く。

熊太古は『大なるものを鸚鵡^{あうむ}といひ、小なるものを鸚哥^{あうむ}といふ』といつてあるから、

鸚の字の意味はまた此に取つたものだらう。師曠^{かん}はこれを乾臍^{かん}といひ、李昉^{ほう}は隴客^{ろう}

といひ、梵書には臊陀さうだといつてある。


集 解

時珍○曰く、鸚鵡には數種あつて、

緑鸚鵡は○隴、蜀に産し、○滇南、

交廣、近海諸地に尤も多く、大いさは烏鵲ほどで數百羽羣り飛ぶ。その地ではこれを鮮さくにして食ふ。紅鸚鵡は紫赤色で大いさも似たものだ。白鸚鵡は西洋、南番に産

し、大いさは母鸚ほどのものだ。



〔鸚 鵡〕

五色鸚鵡は海外諸國に産し、白よりも大きく、緑よりも小さいもので、性尤も伶俐だ。いづれも味くちが丹あかく、吻くちばしが鉤かぎり、尾が長く、足が赤く、睛が金色で目が深く、上下の喙くちばしはいづれもよく動いてまばたき

(二) 木村(重)曰ク
集解ノ文中
緑鸚鵡ハさとうて
う、全身美シキ緑
色、倒挂子ト云フ。
紅鸚鵡ハづぐろい
んこ、頭ヲ除イテ
ハ總テ紅色。
白鸚鵡ハこぼた
ん、普通ノあうむ
ト稱スルモノ、一
名小白鸚鵡、鳩大
ナリ。
五色鸚鵡ハこしき
せいがいいんこ、
鳴聲鋭シ。
(三) 隴蜀ハ陝西省西
部、及び四川省ノ地
ヲ指ス。
(四) 滇南ハ雲南省、
交廣ハ廣東、廣西、及
ビ交州。

し、舌は嬰兒のやうだ。その趾は前後各二つあつて他の諸鳥と異ふ。その性寒を畏れ、寒さに遭ふと瘡のやうに發頭はつせんして死ぬが、餘甘子を餌にしてやると解するものだ。或はその背を摩あすると瘡あになるといひ、或は雄は喙が丹に變ずるが、雌は喙が

黒くして變じないといふ。張思正の倦游錄に『海中にゐる黃魚は能く鸚鵡に變化する』とあるが、これはまた別の一種に相違ない。秦吉了、鳥鳳といふ皆人言を能くする鳥がある。いづれも左に附録する。

附 録

秦吉了 時珍曰く、即ち了哥のことだ。唐書に結遼鳥と書いてある

〔金〕木村(重)曰ク、
秦吉了
和名 きばたん
學名 *Cuculus
loria* (Latham)
科名 あうむ科
普通ニあうむト稱サ
ルモノノ一種ナ
リ。
〔金〕容管ハ容州、草
部毒草類鈎吻ノ註ヲ
見ヨ。廉州ハ介部蚌
蛤類眞珠ノ註、邕州
ハ金部自然銅ノ註ヲ
見ヨ。
〔七〕曲籍便覽ニ尾ヲ
毛ニ作ル。
〔八〕木村(重)曰ク、
鳥鳳ハ和名おかめ
いんこ。
學名 *Calophytus*

は外國音のままである。嶺南の〔六〕容管、廉、邕の諸州の峒中に産し、大いさは鸚鵡ほどで紺黒色だ。腦を夾んで黃肉冠があり、人の耳のやうであり、喙は丹く、距は黃で、人のやうな舌と人のやうな目とあり、目の下から頸に連つて深黃の文があり、頂と〔七〕尾とに分縫がある。よく人間の言葉を眞似し、音が頗る雄重だ。熟雞子と飯とを和して飼ふ。白色のものもある。

〔八〕鳥鳳 按ずるに、范成大の虞衡志に『鳥鳳は〔九〕桂海の左右江の峒中に産する。

大いさは喜鵲ほどで紺碧色だ、項の毛は雄雞に似て頭上に冠があり、尾は二本の弱骨を垂れて長さ一尺四五寸の端に始めて毛があり、その形はほぼ鳳に似てゐる。その音聲は笙簫のやうに清越で、能く短い小唄などを節も調子も合はせて唄ひ、また能くあらゆる鳥の聲を眞似する。彼の地でもやはり得難いものとなつてゐる。

novaez, Il n'ie,
Gmaha.

科名 あらむ科

日本ニテ普通ニ見ラ
ル、尾他ノあらむヨ
リ長シ。

(あ) 桂海ノ左右江、
桂海、即チ南海。嶺
南ノ桂林ノ地方、即
チ今ノ廣西省地方ヲ
指ス。左右江トハ廣
西省境ヲ流ルル鬱江
ノ上流、麗江、西洋
江ノ二水チイフ。

鸚鵡肉

を「む」(注願)

氣味

【甘く鹹し、溫にして毒なし】

主治

【これを食へば虚嗽

禽の四 山禽類十三種 附一種

(二) 鳳 凰 (拾遺)

和名 ほうわうじやく
學名 Pavo cristatus, Linne.
科名 きじ(雉)科

(一) 木村(重)曰ク、一名印度孔雀、雄ノ全長七尺ニ達ス。冠毛ハ扇狀ニ開キ、體ハ藍色ニ輝ク。印度、せいらん島ニ産ス。或ハ瑞祥ノ鳥トシテ有名無實力、假ニ定メテ後致チ俟ツ。

釋名

瑞鸞

時珍曰く、禽經に『雄は鳳、雌は凰である。また瑞鸞といふ』

とある。鸞とはあらゆる鳥が偃伏するといふ意味だ。羽蟲三百六十の中で鳳がその

長である。故に鳥に従ひ凡に従ふのであつ

て、凡は總てである。古代には朋と書いた。

象形である。鳳とは美の意味、大の意味で

ある。

集解

時珍曰く、鳳は南方の朱鳥で

ある。韓詩外傳に『鳳の象は、前は鴻に、

後は麟に、頤は燕に、喙は雞に、頸は蛇に、



〔鳳 凰〕

(三) 丹穴之山、所在未詳。

(四) 南恩州ハ石部石蛇ノ註ナ見ヨ。

(五) 木村(重)曰ク、鳳凰臺、未詳。

尾は魚に、類は鶴に、一頭は鴛に、文は龍に、背は龜に似たもので、羽には五采を備へ、高さ四五尺あり、四海に翱翔し、天下に道あれば見はれる。その翼は竿の如く、その聲は簫の如く、生蟲を啄まず、生草を折らず、羣つて居らず、侶に行かず、梧桐以外には棲まず、竹實以外をば食はず、醴泉以外には飲まぬ」とある。山海經には『(二) 丹穴の山。鳥あり、狀鸛の如く、五采にして文あり、飲食自然にして自ら歌ひ自ら舞ふ。見るれば天下安寧なり』とある。蔡衡は『鳳に象たものが四種ある。赤多きものが鳳であつて、青多きものは鸞、黄多きものは鸞、紫多きものは鸞、白多きものは鸞だ』といつてある。又、多くの典籍には種種異つた名稱が掲げられてあるが、繁冗に渉るから載録せぬ。按ずるに、羅存齊の爾雅翼に『(三) 南恩州の北甘山といふ山は、壁立千仞で猿狖も行けない處だが、その頂上には鳳凰が巢つてゐる。食物はただ蟲魚のみだ。大風雨の場合にその雛が吹き墮されることがあるが、小さいうちは鶴のやうで足がやや短い』とある。

鳳凰臺

氣味

【辛し、平にして毒なし】

主治

【勞損積血に血脈を利

し、神を安ずる。驚邪、癰瘤、鷄癰の發熱狂走するを治するに、水に磨つて服す】(藏器)

發明

藏器曰く、鳳凰の脚下の石のやうな白いものを鳳凰臺と名ける。鳳凰は靈鳥ではあるが、時によるとその嚴な姿を現はすことがあつて、その棲止した場所の土を二三尺掘つて取るのである。形狀は圓石のやうで白く、卵に似たものだ。しかし、鳳は梧桐以外には棲まず、竹實以外をば食はずといふのだから、地に下つて地中に臺が出来るといふやうな道理はなさうなものだが、これも物の有する自然の現象で、理解では判らない。現に鳳があてもそこに竹が生えてゐると限らず、竹の生えた處に鳳がゐると限らないのであつて、恐らくこれは麟、鳳には特別の棲息地があるものと思はれる。漢の時代に朝廷に貢納した續絃膠（續）は鳳の髓を煎じて製造したものだといふが、それも怪むに足らないであらう。

（五）大觀ニ膠下ニ即ノ字アリ。
（六）流沙ハ沙漠ノ古稱、此ニハ西北境ノ沙漠地ヲ指ス。丹山未詳。

時珍曰く、按ずるに、呂氏春秋に『流沙の西、丹山の南に鳳鳥の卵がある。沃民の食するものだ』とあるところから見ると、それを産する土地も別段不思議な土地ではあるまい。續絃膠は、洞冥記では鸞血（鸞）で製造するものとなつてゐる。故に雷公の炮炙論に『弦斷え、劍折れたるは、鸞血に遇へば初の如くなる』とあるのだ。陳氏はそれを鳳髓で作るとした。要するに、いづれも妄談であつて、深く問題にす

るほどの價值はない。

孔雀 (別録下品)

和名 くじく
學名 Pavo mutiens, Linne.
科名 きじ(雉)科

(一) 木村(重)曰ク、支那南部、印度等ニ原産ス。しろくじやくハ變種ナリ。

釋名

越鳥 時珍曰く、孔とは大の意味である。李昉は南客と呼んだ。梵書にはこれを摩由邏マユラといつてある。

集解

弘景曰く、(三)廣、益の諸州に産する。方家では用ゐることが稀だ。恭曰く、(三)交、廣に多くゐる。(四)劍南にはもととはゐなかつた。

(二) 廣州ハ土部伏龍肝ノ註、益州ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。
(三) 交、廣ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。
(四) 劍南ハ草部芳草類牡丹ノ註ヲ見ヨ。
(五) 交趾、漢ニ交趾郡ヲ置ク、寧ラ今ノ安南北部東京地方ヲ指ス。雷州ハ石部礬礬ノ註、羅州ハ石部鹵石類鹽藥ノ註ヲ見ヨ。
(六) 本草洞詮、羅チ廉ニ作ル。

時珍曰く、按ずるに、南方異物志に『孔雀は(金)交趾、雷、(六)羅の諸州に甚だ多く、高山の高い木の上にあるもので、大いさは鴈ほど、高さは三四尺、鶴ほど位の高さがあり、頸は細く、背が隆く、頭に長さ一寸ばかりの三本の毛を戴き、數十羽羣つて飛び、岡陸に棲み遊び、朝になると聲を相和して鳴く。その聲は『都護』といふやうに聞える。雌は尾が短くて金翠がなく、雄は三年まではなほ小さいが、五年になると二三尺の長さになり、夏には毛が脱けて春になると復た生え、背から尾まで

圓文があり、錢のやうな五色の金翠が相繞あひたがつてゐる。その鳥自身にその尾を愛し、山に棲んでは必ず先づその尾を置くだけの餘地ある場所を擇んで棲む。雨が降るとその尾が重くなつて高く飛べなくなるので、南方の地の者はその時往つて捕獲し、



〔雀 孔〕

或は暗中にその通るのを狙ねらつてゐて生きたままその尾を切り取り、それを贈物にする。その場合鳥が切るのを顧視するとその金翠が忽ち色が褪さめるものだ。山間の住民はその雛を飼つて四おとりに使ひ、或はその卵を搜し取つて雛ひなに解かさせ、猪腸、生菓などのやうなものを餌にして飼ふ。人間が手を拍つて歌を

唱ふと舞ふ。嫉妬深い性質で、色模様の衣服を著たものを見ると必ず啄くちむ』とある。北戸録には『孔雀は交尾せぬ。聲や影で相接して孕はらむ。或は雌が下風に鳴き、雄が上風に鳴いても孕む』とある。翼越集には『孔雀には雌雄があるが、生殖を行はん

とするとときは木に登つて哀鳴する。すると蛇が来て交尾するものだ。故にその血、膽はやはり人を傷める』とある。禽經に『孔は蛇を見れば宛として躍る』とある。その事實だ。

肉 氣味

【鹹し、涼にして微毒あり】藏器曰く、毒なし。

主治

【藥毒、

蟲毒を解す】(日華)

發明

時珍曰く、按ずるに、紀聞に『山谷に住む蠻人は多く食ふ。或はこれで脯、腊を作るが、味は鷄、鶩のやうなものだ。能くあらゆる毒を解す。その肉を食つたものはその後で藥を服しても效がない。そのものが毒を解するものだからだ』とある。又、續博物志には『李衛公は「鶩は鬼を驚し、孔雀は惡を辟け、鷄鵒は火を厭する」といつた』とある。

血 主治

【生で飲めば蠱毒を解するに良し】(日華)

發明

時珍曰く、熊太古は、孔雀は蛇と交尾するものだから血、膽いづれも人を傷めるといひ、日華、及び博物志には、その血と首とは能く大毒を解すといひ、合致せぬやうであるが、按ずるに、孔雀はその肉が毒を解するものである以上、

血だけが人を傷めるわけはあるまい。蓋しこれも雉と蛇と交尾する時には有毒だが、蛇が蟄に入つた期間は無毒であると同じやうな関係のものであらう。

屎 氣味 【微寒なり】 主治 【婦人の帶下、小便不利】【別錄】 【崩中帶下

を治す。惡瘡に傅けるもよし】【日華】

尾 氣味 【毒あり】 宗奭曰く、目に入れてはならぬ。昏翳こんえいせしめるものだ。

駝鳥 (拾遺)

和名 だてう
學名 *Struthio camellus*, Linno.
科名 だてう科

釋名 駝蹄鷄綱目 (二) 食火鷄(同上) 骨托禽 時珍曰く、駝はその形態が

似てゐるからの形容だ。托といふはやはり駝の字の訛である。

集解 藏器曰く、駝鳥は駱駝らくたのやうなもので、西戎に産する。高宗の永徽年

間、吐火羅とくわらからこれを獻じた。高さ七尺、足は橐駝たくだのやうで、翅を鼓して行くと

一日に三百里走れ、銅鐵を食つたといふ。

時珍曰く、これもやはり鳥であつて、能く他の動物の食へないものを食ふものだ。

(一) 木村(重)曰ク、尾羽ト稱スル尖端ニ眼狀點アルハ眞ノ尾ニ非ズ、上尾筒ノ羽毛ノ延長セルモノナリ。尾ハ短クシテ外部ニ現レズ。
(二) 木村(重)曰ク、現存鳥類中最大ノモノ、北亞弗利加、亞刺比亞等ノ沙漠地ニ産ス。
食火鷄ハひくひどり(Casuarus Casuaris, Linno)ナルベシ。ニウギホア附近ノ島ニ

産ス。火鷄ハ現時七面鳥ノ俗稱ナリ。

(三)吐火羅國ハ今ノ布哈拉、及ビ阿富汗ノ地ナリ。

(四)波斯國ハ金部金ノ註ヲ見ヨ。

(五)安息國ハ古代波斯ノ地ナリ。

(六)富浪ハ佛郎ノ轉音、アラビヤ人佛蘭西ヲ佛郎ト稱スルニ因ルトイフ。丁謙氏ハツノ地埃及海西ニ在ラントイフ。

(七)竹步國、阿丹國共ニアラビヤ西南端地方ヲ指スガ如シ、阿丹、即チアデンノ地ナリ。

(八)河州ハ今ノ甘肅省ノ蘭州、鞏昌兩府

按ずるに、李延壽の後魏書に『ハシ波斯國に駝のやうな形の鳥がある。能く飛ぶけれども高くは上れず、草と肉とを食物とし、また火を噉ふもので、一日に七百里を行く』とある。郭義恭の廣志には『シ安息國から貢納した大雀は、身は鷹のやう、蹄



〔鳥 駝〕
火 雞

だ』とある。費信の星槎錄には『モ竹步國、阿丹國ともに駝蹄鷄を産する。高いものは六七尺あり、その蹄が駝のやうなものだ』とある。彭乗の墨客揮犀には『コウダク骨托禽は、ハ河州に産し、形狀は鵬のやうで高さ三尺餘、その名を自ら呼び、能く鐵石を食ふ』とある。宋祁の唐書には『開元の初年に、モ康國から駝鳥の卵を貢納した』

は、駝のやうで色蒼く、頭を挙げると高さは七八尺あり、翅を張ると丈餘あつて、大麥を食物とし、その卵はウ瓊ほどあつた。その名を駝鳥といふ』とある。劉郁の西域記には『ハ富浪に、蹄が駝のやうで高さ一丈餘の大鳥がある。火炭を食ひ、卵は一升ほどの大いさのもの

ノ地ナリ。州治ハ民
國ノ導河縣地ナリ。
(九)康國ハ今ノ撒馬
爾罕ノ地ナリ。康居
國ト混ズルハ誤ナ
リ。
(一〇)三佛隣ハ石部婆
娑石ノ註ヲ見ヨ。

(一)木村(重)曰ク、
鷹及ビ鴈ハ裸出ス。
歐洲南部、小亞細亞、
印度、支那、朝鮮ニ
分布ス。鷹(ユン)鴈
頭鴈(クートウチャ
ク)ノ稱アリ。一屬
(Bubo)ハ苦鷹(ホア
ンエン)ト稱サル。

とある。鄭曉の吾學編には『洪武の初年に、三佛隣國から火鷄を貢納した。鶴よりも大きく、長さ三四尺あり、頸、足はやはり鶴にも似てゐるが、嘴が鋭くして軟く、紅い冠があり、毛の色は青羊のやう、足の指は二本で爪が鋭く、能く人の腹を傷けて殺すことがある。火炭を食ふものだ』とある。諸書の記載にはやや異ふ點もあるが、實はみな一物である。

屎 氣味 【毒なし】 主治

れを食へば立ろに消ける【藏】

(二)鷹 (本經中品)

和名 はげわし
學名 *Aegypius monachus* (Tinné)
科名 はげわし科

釋名 角鷹 綱目) 鵠鳩 時珍曰く、鷹は鷹で撃つものだ。故に鷹といふ。

その頂に毛角があるから角鷹といひ、その性が爽猛だから鵠鳩といふ。昔、少皞氏は鳥を以て官名とし、祝鳩、鳩鳩、鵠鳩、鵠鳩、鵠鳩、鵠鳩の五氏を置いた。蓋し鷹と鳩とは氣を同うし、交代に變化するものだから鳩なる名稱が起つたのだ。禽經に『小

にして鷲しうするものはみな隼とんといふ。大にして鷲するものはみな鳩とといふ』とあるはこの意味だ。爾雅翼には「北に在ては鷹やうといひ、南に在ては鷦やうといふ」とあり、あるひは、大なるを鷹とし、小なるを鷦とする。梵書には、嘶し那な夜やといつてある。

集解

時珍曰く、鷹は遼海に産するものを上とし、北地、及び東北胡のものがこれに次ぐ。北方の地では多く雛を取つて飼養し、南方の地では八九月に囿みづりを使用して取る。この鳥は鳥の中の疏暴なもので、雉鷹、兎鷹といふもある。その類の鳥は夏の末期に撃つことを習ひ、秋の中期に鳥を祭する。隋の魏彦深の鷹賦に頗る詳叙してあるから、左にその概要を掲げる。

『金方の猛氣を資とし、火徳の炎精を擅はじにす。指は十字を重んじ、尾は合盧を貴び、觜は鈎利に同じく、脚は枯荊に等し。或は白くして散花の如く、或は黒くして點漆の如く、大文は錦の如く、細斑は縝けつに似たり。身は重くして金の如く、爪は剛くして鐵の如し。毛衣屢る改つてその色常なく、寅に生じて酉なに就り、總號して黃と云ふ。二周にして鷦やうとなり、三歳にして蒼となり、雌は體大に、雄は形小なり。これを察するは易しとなせども、これを調とぶるは實に難し。薑は以て熱を取り、酒は

(二) 遼海ハ鱗部無鱗魚類鱧魚ノ註チ見ヨ。

(三) 東北胡、滿洲以北ノ異種族地チ指ス。

(四) 本書ニ鷦チ鷦ニ作ル。



〔鷹〕

以て寒を排す。窟に生ずるものは好く眠り、木に巢ふものは常に立つ。幾さうかう骸がい長さものは起つこと遅く、六翻ろくへん短きものは飛ぶこと急なり』

肉 氣味 缺 主治 【これ

を食へば野狐の邪魅を治す】〔藏器〕

頭 主治 【五痔には灰に焼いて飲服する】〔藥性〕 【痔瘻を治するには、灰に

焼いて麝香少量を入れ、酥そ、酒で服す。頭風眩運を治するには、一箇を灰に焼いて酒で服す】〔時珍〕 記載は王右軍の法帖、及び溫隱居の海上方にある。

附 方 新 一。 【頭目の虛運】 車風一箇——即ち鷹頭である——を毛を去つて

焙じ、川芎せんきう一兩と末にし、三錢を酒で服す。〔選奇〕

腎及び爪 主治 【五痔、狐魅には、灰に焼いて水で服す】〔藏器〕

睛 主治 【乳汁に和して研り、一日三回づつ眼中に注ぐ。三日にして（五）碧霄へきせう

中の物を見得る。烟で薰くもすることを忌む】〔藥性〕

（五）碧霄トハ高遠ナル大空サイフ。

骨

主 治

【傷損の接骨には、灰に焼いて二錢づつを酒で服す。患部の上下に

随つて食前、食後を分つ】（時珍）

毛

主 治

【酒を斷つ。水で煮て汁を飲めば直ちに酒を止めるやうになる】

（千金）

屎白

氣 味

【微寒にして小毒あり】

主 治

【打撲傷の痕を減す】（六〇）（本經）

（六〇）本經マサニ別錄ニ作ルベシ。

（七〇）邪惡、大觀ニ惡酒ニ作ル。

（八〇）大觀ニ木ヲ飲ニ作ル。

【灰に焼いて酒で服すれば中惡を治す】（藥性）【灰に焼いて酒で方寸匕を服すれば（七〇）邪惡を治す。（八〇）本人にそれと知らしめてはならぬ】（蘇恭）【虛積を消し、勞蟲を殺し、面皰、野黚を去る】（時珍）

發 明

弘景曰く、單用しては癰を減する效能がない。殭蠶、衣魚の屬を合せ

て膏にして用ゐれば效がある。

附 方

舊一、新四。【奶癰】寇曰く、凡そ小兒の脇下に何物か硬いものがある

やうなものは、俗に奶癰と名けるものだ。ただ脾を溫め積を化する丸藥を服す。轉瀉してはならない。黃鷹屎一錢、密陀僧一兩、舶來の硫黃一分、丁香二十一箇を末にし、一字づつ——三歳以上は半錢——を、乳汁、或は白麪湯で調へて服す。いづ

（九六）大觀ニ脇ニ作ル。

(一〇) 復ハ伏ニ通ズ、一伏時、一晝夜ニ同シ。
(一一) 錢、大觀ニ字ニ作ル。
(一二) 大觀ニ薄字上溫字アリ。

(一) 木村(重)曰ク、海東鵬(ハイトンチヤチ)ト呼ブ。いわし(紅頭鵬)(ホントウチヤチ)(aquila屬)あかあしちやうけんぼう(青鳶)(チヤンエン) Vespertum屬)等アリ、其代表者ヲ取ル。
(二) 膺ハ胸ニテ搏撃スルコト。猾ハソノ

れも轉瀉せずして(一〇) 復時にして青黒の物を取下す。後に捕藥を服し、醋石榴皮さくせきりうひを黒く炙いて半兩、蜘蛛いしき一分、木香一分、麝香半錢を末にし、(一一) 錢づつを(一二) 薄酒で調へて二回に連服する。【面皰】鷹屎白二分、胡粉一分を蜜で和して傳ける。(外臺)【滅痕】千金では、鷹屎白を人精で和して一日三回傳ける。○聖恵では、鷹屎二兩、殭蠶一兩半を末にし、蜜で和して傳ける。○總錄では、鷹屎白、白附子びやくぶし各一兩を末にし、醋で和して傳ける。日毎に三五回傳ければ痕がなくなる。【食哽】鷹糞を灰に燒き、方寸匕を水で服す。(臺外)

(一) 鵬

音は調、テウウにある。

(綱目)

和名をじろわし
學名 *Haliastur albicollis*, (Tinne.)
科名 わし科

釋名

鷲

音は就(シユ)である。(山海經) 鷲(說文) 音は團(ダン)である。時

珍曰く、禽經に『鷲は以て膺ようし、鵬こうは以て猾し、隼しゅんは以て尹いんし、鵬は以て周し、鷲は以て就し、鷲じゆんは以て搏す』とあるは、いづれもその搏撃する様子の特長をいつたものだ。梵書にはこれを揭羅闍けらじやといつてある。

鷹ノ狩ヲサレコト。
井ハ筆ノ誤、意義未
詳。周ハ周施、メケ
ルコト。鷲ハ鷲、ケ
ルコト。搏ハ搏、ウ
ツコトナリ。

(三) 西南夷トハ今ノ
雲南省以南ノ蠻地ヲ
指ス。

集解

時珍曰く、鵂は鷹に似て大きく、尾が長く、翅が短く、土黄色だ。兎
猛で力強く、空中を旋回して下の物を視るに、如何なる細かなものでも見落さない。



鵂

皂鵂は即ち鷲であつて、北地に産する色の皂いものだ。青鵂は遼東に産する最も俊なるもので、海東青と稱する。羌鸞は(三)西南夷に産し、頭は黄、目は赤で五色みな備はるものだ。鵂の類は能く鴻、鵂、獐、鹿、犬、豕を搏つものだが、また虎鷹といふ翼の廣さ一丈餘のものがあつて、能く虎を搏つ。鷹、鵂は鳥を取るものではあるが燕子を畏れる。故に物は大小では判斷されない。この鳥の翮は箭羽の材料になる。劉郁の西域記には『皂鵂は一回に三箇の卵を産むもので、その内の一箇には犬に化するものがある。それは毛が短い灰色で犬と異りはないが、ただ尾と背とに數本の羽毛のある動物で、その母鳥に隨

つて走り、その追ひかけたものは必ず捕獲するものだ。これを鷹背狗ようはいいといふ」とある。

骨 氣味 缺 主治 【折傷で骨の斷れたるには、灰に焼いて二錢づつを

酒で服す。患部が上體にある場合には食後、下體にある場合には食前に服す。骨は舊の通りに接がる（時珍） 記載は接骨方にある。

發明 時珍曰く、鷹、鶚げう、鶚の骨はいづれもよく骨を接ぐ。蓋し鶚鳥こてうの力は

骨に在るものだからであつて、骨を以て骨を治するはその類に従ふのだ。

屎 主治 【諸鳥獸の骨硬には、灰に焼いて方寸匕を酒で服す（時珍） 記載は

外臺秘要にある。

二 鶚 (綱目)

和名 みさぎ
學名 *Turdus indicus* (Linnaeus)
科名 みどり科

本村(重)曰ク、
分南廣ク、歐洲、亞
細亞、亞弗利加、北
米等ニ産ス。魚鷹イサカ、
鶚イサカ、ノ名最も知
ラレ、鶚イサカ(チヤチキ
イ)鶚イサカノ名アリ。
世界ニ一種知ラル。

釋名 魚鷹イサカ 禽經 鶚イサカ 詩疏 鶚イサカ 周南 王雉 音は疽ソである。沸

波 淮南子 下窻鳥 時珍曰く、鶚イサカはその状態が愕おころくべきものだから鶚といひ、物

食餌ハ殆ンド魚類ニ
限ラル。

を視ること雌メ健けんだから雌といひ、能く穴に入つて食物を取るから下窟鳥といひ、水上を翱翔かうじやうし、扇あふつて魚を出すから沸波といつたのだ。禽經には『王雌は魚鷹である。尾上の白きものを白鷹はくけつと名ける』とある。

集解

時珍曰く、鶚は鵂の類であつて、鷹に似てゐるが土黄色で、目が深く



〔鶚〕 魚
——鷹——

して險しく峙そはだつてゐる。雄と雌と相携へて物を驚おどへるが、雄のものと雌のものと各別のものを獲る。交尾には雙ななんで翔かけるが、交尾が畢おはれば處を異にしてゐる。能く水上を翱翔して魚を捕つて食ふので、江表地方では食魚鷹と呼ばふ。やはり蛇をも啖くふものだ。詩に『關關たる雉鳩、河の洲に在り』とはこの關たる雌鳩、河の洲に在り』とはこの鳥である。肉は腥惡で食へない。陸機はこれを驚とし、揚雄はこれを白鷹とし、黃氏はこれを杜鵑さけんとしたが、いづれも誤だ。禽經に『鳩は三子を生み、一は鶚鳩とな

る』とあるは尸鳩しきうのことだ。杜預が王雒を尸鳩としたのは、或はこのためだらう。

骨 主治 【接骨】(時珍)

附方 新一。 【接骨】下竈鳥、即ち鸚の骨を取つて焼いて性を存し、古銅錢

一箇を紅く煨き醋ひたに淬ひたすこと七回し、末にして等分を用ゐ、一錢を酒で服す。過多に服してはならぬ。患部が下に在るときは空心に、上に在るときは食後に服す。極めて效がある。先づ夾縛してから服すべきものである。(唐蘭道人方)

三 膏 主治 【蛇咬】には、焼いて性を存して研末し、一半を酒で服し、一半を

塗る【時珍】

(一) 木村(重)曰ク、
鸚鳩平ニシテ鈍ク動
曲ス。

(一) 鴟 (別錄下品) 和名と び
學名 *Milvus migrans lineatus*, (Gray).

科名 鷹 科

(一) 木村(重)曰ク、
鷹(ユアン)鸛鷹(ヤ
チユン)ノ稱アリ。
鸛(ヤチ)ハちうひ
(*Circus aeruginosus*, Linn.) 隼ハ青
茶兒(チンチャル)蛇
兒(トール)ト呼バル
カニハヤチ(キー
Leo subleco Ibutur-

釋名 雀鷹(詩疏) 鷹(詩經) 鸛 音は淫(イン)である。 隼 本は驛と書いて

た。音は筭(ジュン)である。 鸛 時珍曰く、鴟、鷹の二字の篆文は象形である。一に
は、鴟とはその聲であつて、鷹とは物を攫さふこと射る如しとの意味、隼とは物を撃

トナリ。

(二) 齊ハ山東省ノ中部以西。

つことの隼すんの意味、鵠ことは遙な處を目撃するの意味だといふ。詩疏には『隼には數種あつて、通稱して鵠といふ。雀鷹は春布穀に變化する。爾雅にはこれを茅鷃はうしといひ、(三) 齊地方では撃征といひ、或は題眉といふ』とあり、爾雅には『鵠、負雀なり』とあり、梵書にはこれを阿黎耶ありやといつてある。

〔集 解〕

弘景曰く、鵠は俗に老鵠と呼ぶものだ。又、鵬てう、鶚おといふがあり、いづれも相似て大なるものだ。

時珍曰く、鵠は鷹に似て稍や小さく、その尾は舵のやうだ。極めて善く高く翔あがり、専ら鷄、雀を捉へる。鵠の類には數種あつて、禽經を按ずるに『善く搏つかつものを鵠といひ、(三) 竊玄なるを鵠といひ、(四) 猯なるを鵠こうといひ、鵠なるを鵠せんといひ、奪するを鵠だつといふ』とあり、又『鵠は三子を生み、その一が鵠となる。鵠は鵠よりも小さくして最も猛く捷すばやく、能く鳩、鵠わづを撃つ。また鵠かいし子、一名龍脱と名ける。鵠は色青く、風に向つて翅を展べ、迅く搖ゆつて鳥、雀を搏つかつて捕る。鳴けば大風が起る。一名晨風といふ。鵠は鵠よりも小さく、その脰ごうを上下し、やはり鳥雀を取ること(五) 攘じやうてつ撥するやうなものだ。一名鵠子といふ』とある。又、月令には『二月に鷹が變

(一) 竊玄ハ淺黒色ナリ。

(四) 猯ハ舉動ノ形容瞭ハ遠視、展ハ翅ヲ展ブル形容、奪ハ奪掠ノ形容。

(五) 攘撥ハ掠メルコトナリ。



〔鵲〕
——鷹 雀——

撃たず、隼は胎^はんだものを撃たず、鵲は鳩を握ると自から暖めてやつて曉方になる
と釋^ゆすといふ。これはいづれも殺中に仁あるものだ。

鵲頭

修治

弘景曰く、雌と雄と何れでも宜敷いが、雄の方が勝れてゐる筈
である。これを用ゐるには徹し炙いて用うべきもので、壺^さのついたものは用ゐられ
ぬ。古方の頭、面を治する方に鵲頭酒といふがある。

氣味

【鹹し、平にして毒なし】

時珍曰く、按ずるに、段成式は「唐の肅宗

皇帝の皇后張氏は朝權を專にした人だが、帝に酒を進める都度^{たぐひ}鵲頭をその中に入れ
た。これは人をして長く酔ひ、健忘ならしめるものだといふことだ」とある。これ

化して鳩となり、七月に鳩が變化して

鷹となる』とあり、莊子には『鵲が鵲

となり、鵲が布穀となり、布穀が復た

鵲となる』とある。いづれもこの屬^{たぐひ}を

指したものだ。隼、鵲は鷲ではあるが義

あるものだ。故に鷹は卵を抱いたるを

で見ると鴟頭もやはり微毒がある。

主治 【頭風目眩、顛倒癰疾】（別錄）

附方 舊二。 【癰癰瘰癧】 飛鴟頭三箇、鉛丹一斤を末にし、蜜で梧子大の丸にし、一日三回、三丸づつを酒で服す。（千金方）

【旋風眩冒】 鴟頭丸——鴟頭一箇を

黄に炒り、眞菌茹、白朮各一兩、川椒半兩を炒つて汁を去り、末にして蜜で和して

梧子大の丸にし、二十丸づつを酒で服す。（聖惠）

肉 【氣味】 缺 **主治** 【これを食へば癰癰を治す】（孟詵） 【これを食へば鷄

肉、鷄、鶇あひで起つた積を消す】（時珍）

骨 **主治** 【鼻衄の止まぬには、老鴟の翅關の大骨を取つて微し炙き、研末し

て吹く】（時珍） 記載は聖濟總錄にある。

（一）鴟 鴟（拾遺） 和名 わしみみずく

學名 *Bubo tonquinus*, *Civett.*
科名 梟鴟科

（二）木村（重）曰ク、
歐洲大部、亞細亞中、
北部ニ分布ス。日本
ニテハ九州ニ居ルモ
稀ナリ。鴟鴞（チーシ
ユウ）角鴟（チユーチ

釋名 角鴟（説文） 怪鴟（爾雅） 霍 音は丸（クワン）である。老兔（爾雅） 鈞

一) 怪鷗(クアイチ)
 一) 貓頭鷹(ミヤチトウエン)
 一) 鉤鷗(コウコ)ト呼バル。みみずく他ニ數種ヲ産ス。

鵂 音は格(カク)である。鵂鵂 音は忌欺(キキ)である。轂轆鷹 蜀地方で呼ぶ名)

呼嘯鷹 楚地方で呼ぶ名) 夜食鷹 吳地方で呼ぶ名) 時珍曰く、その形狀は鷗に似

て毛角がある。故に鷗といひ、角といひ、翟といふのであつて、翟の字は鳥の頭、

目に角の形のある象形だ。老兎とは頭、目の形容、鷗、怪はいづれも不祥なものの

意味だ。鉤鷗、轂轆、呼嘯はいづれもその聲がさう聞えるからだ。蜀地方ではまた

鉤格を訛つて鬼各哥といふ。

集解

藏器曰く、鉤鷗は爾雅の鵂鵂であつて、江東では鉤鷗と呼ぶ。その形

狀が鷗に似た怪鳥で、夜飛び晝伏す。城邑に入れば城邑が滅びて空になり、家宅に

入れば家宅が滅びて空になるが、一定の場所に栖んで移動せねば害がない。その

聲の笑ふやうに聞えるものは速に逐ひ去らねばならぬものだ。北方の地に訓狐と

いふがあつて、二物は似てゐるが、各

その類があるので、訓狐は、聲はその名



〔鵂 鷗〕

を呼ぶやう、雨の目は猫兒のやう、大いさは鵯くまほどのものであつて、笑ふやうな聲を出すときは人が死ぬものだ。又、鵯きうりうといふがある。これもやはりその類で、微小にして黄色だ。夜能く人家に入つて人の爪甲を拾ひ、それで人の吉凶を知るものである。ある人がこの鳥を獲つてさう嚔囊そなうの中を調べて見ると、やはりまだ爪甲があつたといふ。故に爪を取つたとき戸内に埋めるはこのためだ。

時珍曰く、この物には二種ある。鵯きうりうといふは、大いさは鵯、鷹ほど、黄黒斑色で頭、目は猫のやう、毛角と兩耳とがあり、晝伏して夜出る。鳴くときは雌雄相喚び、その聲は老人の如く、初めは呼ぶやうで後には笑ふやうになる。この鳥の行く處には不祥が多い。莊子に「鵯は夜蚤を拾ひ、毫末を察するが、晝出ては山や丘も見えない」とあり、何承天の纂文には「鵯は白日人を見ず、夜能く蚤虱を拾ふ」とある。俗に蚤を訛つて人の爪としたのであつて、謬妄だ。一種の鵯は、大いさは鵯ほど、毛色は鵯のやう、頭、目はやはり猫のやうで、鳴くと肛門からも應へる聲を出し、その聲が連つて「休留休留」といふやうに聞える。故に鵯と名けたのだ。江東ではこれを車載板と呼び、楚地方では快打鳥と呼び、蜀地方では春哥兒

と呼ぶ。いづれもこれが鳴けば死人があるといふ。實際に就いて見るにやはりその事實がある。説文にはこれを鴛——音は爵(シヤク)といつてある。小さいものの意味だ。藏器の所謂訓狐は鴛のことだ。所謂鵲鴛は鴛鴦の小さいものことだ。いづれも誤である。周禮に、蒼鵲氏(たうせうし)は天鳥(てんてう)の巢を覆すことを掌るとあつて、四角の板にて十日の號、十二月の號、十二辰の號、十二歳の號、二十八宿の號を書いてその巢に懸けるとその鳥が去るものだといふ。續博物志には『鵲鴛、鵲(くわん) 鴛(じやく)は其抱(くわつ)は以てするものだ』とある。此は卵を孵(か)へす時(や)霖(ふ)ましく鳴く事だ。

肉 氣味 缺 主治 瘡疾には、一羽を毛、腸を去つて油で燂(に)て食ふ

(時珍) 記載は陰憲副方にある。

附方 新一 『風虛眩運』大頭鷹を閉め殺し、毛を去つて煮て食ひ、骨を燒い

て性を存して酒で服す。(便民食療)

肝 主治 『法術家の用ゐる材料になる』(時珍)

(二) 鵙 (拾遺)

和名 このはづく、一名かきづく
學名 *Otus sminia japonicus*, Temm. et Schlger.
科名 づく科

(一) 木村(重)曰ク、耳小ナリ、個體ニヨリ色彩ノ變化アリ。北中支那、日本ニ産ス。鵙(レヤチ)梟(シ)アチチ(一)土梟(トウシヤチ)山梟(サンシヤチ)ノ呼稱アリ。

釋名

梟鵙

梟の音は嬌(ケウ)である。

土梟(爾雅)

山鵙(晉灼)

鷦鷯(十六

國史)

鵙(漢書)

訓狐(拾遺)

流離(詩經)

鵙魂

時珍曰く、鵙、梟、訓狐とい

ふはその聲である。鵙といふはその色が服の色のやうだからである。地方人が訓狐を訛つて幸胡といふがこの鳥であつて、鵙と鳩とは二種別物である。周公がこの二鳥を合せて詠んだので、後世一般に鵙鵙といふ一種の鳥として了つたのだが、それは誤だ。鵙の字は韻書には見當らないが、匈奴の切(キョウ)と發音するのであらう。鵙魂、流離といふは縁起の悪い鳥といふ意味だ。吳球の方には逐魂としてある。梟とは、この鳥は成長すると母を食ふものだから、古代には夏至にこの鳥を磔にしたといふ。それでその字を鳥の首を木の上に置いて書いたものだ。

集解

藏器曰く、鵙とは梟のこと、一名鵙といふ。吳地方では鵙魂と呼ぶ。

惡聲の鳥だ。賈誼は『鵙は鵙に似てゐる』といったが、その實は一種の鳥だ。この

鳥が家宅に入れば人が居なくなる兆である。この鳥は日中には物が見えず、夜になると飛行し、常に人家に入つて鼠を捕つて食ふ。周禮の哲族氏は天鳥の巢を覆すことを掌るとある註に『惡鳴の鳥、鴞鵂、鬼車の屬』とある。



〔鴞〕
—— 鴞 ——

時珍曰く、鴞鵂、鴞鵂、梟はいづれも惡鳥である。説明を試みた人人は往往にして混亂した註解を下し、賈誼は鴞は鴞に似てゐるといひ、藏器は鴞と訓狐とは二物だとし、許慎、張華は鴞、鴞、鴞鵂を一物とし、王逸は鴞、即ち訓狐だといひ、陳正敏は梟は伯勞だと

いひ、宗懷は土梟は鴞鵂だといひ、それぞれ一説を主張してゐるが、今總括してその根據を考へ、地方人に就いて調べて見ると、鴞、梟、鴞、訓狐が一種、鴞鵂が一種のものだ。藏器が説明してゐる訓狐の形狀は鴞鵂そのもので、鴞といふは今俗

に幸胡と呼んでゐるそのものだ。處處の山林に時としてゐる。幼いうちは可愛いものだが成長すると醜惡しうがくになり、形體は母雞ほどで斑文があり、頭は鶉鴒しうりやうのやう、目は猫の目のやうになり、その聲はそれ自身の名を呼ぶやうに聞え、好んで桑椹さうじんを食ふ。古代には多くこれを食べたものだ。故に禮に『鴉かう胖はんを食はず』とあるので、それは脇側の薄弱な部分を指したのだ、莊子には『彈を見て鴉炙を求む』とあり、前涼錄には『張天錫は「北方の美なるものは桑椹、甘香、鷄鴉、革褰かくせんだ」といつた』とある。いづれもこの物を指したのだ。按ずるに、巴蜀異物志に『鶻くは小鷄ほどのもので、體に文色がある。それで土俗にかく名けたのだ。遠くは飛行し得ず、その栖む地域から出ない』とある。盛弘之の荊州記には『三ふ巫縣けんには雌雞ほどの鳥で鶻と名けるものがある。楚地方では鶻といふ』とある。陸機の詩疏には『鶻は大いさ鳩ほどで綠色だ。人家に入れば凶事がある。賈誼の賦にある鶻そのものだ。その肉は甚だ美味で、羹、臠るにもなり炙いても食へる』とある。劉恂の嶺表錄には『北方では梟が鳴くと一般に怪しむが、南方地方では晝夜飛んで鳴いてゐる。烏鵲などと異つたことがない。桂林地方では各戸に網で捕つて置いて鼠を捕らせるが、狸より

(二) 巫縣ハ今ノ四川
省巫山縣ノ地ナリ。

もよく働く』とある。これ等の諸説を綜合して見ると、鴉、鵲、訓狐の一物なることが明瞭だ。又按ずるに、郭義恭の廣志には『鴉は楚鳩が生むもので、はぐくみ育て得ないものだ。騾、駝、驢のやうである』とあるが、しかし梟は成長すれば母を食ふといふのだから、はぐくんで育てることになる。それとも食はれるそのものは鳩なのかも知れぬ。淮南子には『鵲互を投ずると梟が鳴き止む。性が相勝つのだ』とある。

肉 氣味

【甘し、溫にして毒なし】

主治

【鼠瘻には炙いて食ふ】〔藏器〕

【風癰、噎食病】〔時珍〕

附方

新二。

【風癰】風癰には、寶鑑第九卷に就いて見ると、神應丹、惺神散

と名けるがある。（醫方大成下冊） 【噎食】鵲鳥のまだ毛の生えぬもの一對を取り、黃泥

で固濟して煨いて性を存して末にし、一匙づつを溫酒で服す。（壽域神方）

頭 主治

【痘瘡の黒陷には、臘月のもの一二箇を用ゐ、灰に焼いて酒で服す。

それで起きるものだ】〔時珍〕 記載は雲岐子保命集にある。

目 主治

【吞めば夜間鬼物を見るやうになる】〔藏器〕

鳩

音は沈(チン)な去聲に發音する。

(別錄下品)

和名 ちん(古稱)
學名 宋 詳
科名 きじ科

(一) 木村(重)曰ク、
雄科ノモノナルベシ。學名未詳。支那ニ雄科ノ鳥多シ。

校正

外類より此に移し入る。

釋名

鳩日 運日(ウンジツ)と同じ。(別錄) 同力鳥(陶弘景)

集解

別錄に曰く、鳩は南海に生ずる。

弘景曰く、鳩と鳩日とは二種の鳥だ。鳩鳥は形狀が孔雀(くじやう)のやう、五色雜斑で高く大きく、頸は黒く、喙は赤い。廣の深山中に産する。鳩日は形狀が黒俗鷄(くじやう)のやうで、同力といふやうに聞える聲を出す。故に江東では同力鳥と呼ぶのである。いづれも蛇を啖ふ。人が誤つてその肉を食へば立ろに死ぬ。いづれも蛇毒を療するものだ。昔は鳩毛(きんまう)で毒酒を作つたので、それで鳩酒と名けたのであるが、近頃では一向作らない。又、海中に赤色で龍のやうな形狀のものがある。これは海蜃と名けるもので、やはり大毒があり、鳩羽よりも甚しい。

恭曰く、鳩鳥は(三)商州以南に産し、(三)江、嶺地方に大いにゐるので、一般に直ぐに

(二) 商州ハ石部丹砂ノ註ヲ見ヨ。
(三) 江嶺ハ江西、廣東地方。

（鳥）禹歩トハ歩ムニ
雨足相過ギザル貌ナ
イフ。竊ミ歩行クナ
リ。

あの鳥かと肯うなづかれる。その肉は腥なまく、有毒だから啖くふわけに行かぬ。羽で酒の上に畫けば人を殺すなどいふは、やはり無根の妄説だ。郭璞は「鳩は大いさ鷓てうほど、頸長く、喙赤く、蛇を食ふ」といひ、説文、廣雅、淮南子には、いづれも鳩を鷓うんじう目としてある。交、廣地方でもやはり、鷓日、



〔鳩〕

即ち鳩、一名同力鳥だといふ。孔雀のやうなものなどは更に無い。陶氏は何か人のために誑たぶらされたのだ。

時珍曰く、按ずるに、爾雅翼に「鳩は鷹に似て大きい。形状は鷓のやうで紫黑色、喙は赤く、目は黒く、頸は長さ七八寸あり、雄を運目と名け、雌を陰諧いんかいと名ける。

運目が鳴けば晴れ、陰諧が鳴けば雨が降る。蛇、及び橡實を食物とするもので、木や石に蛇がゐるのを知ると、（鳥）禹歩して禁さしなひをやる。すると須臾にして木は倒れ、石は崩れて蛇が出る。蛇はこの鳥の口に入ると直ちに爛れて了ふ。その糞、尿が石に著くと石はみな黄爛する。あらゆる蟲はこの鳥が水を飲んだ處で吸へばみな死ぬ。た

〔五〕蕪州ハ草部陽草類
艾ノ註ヲ見ヨ
〔六〕黃梅山ハ湖北省黃梅縣ノ西北ニ在リ。

だ犀角を服めばその毒を解すものだ』とある。又、楊廉夫の鐵屋集には『鵪は蕪州の黃梅山中に産する。形狀は訓狐に類し、聲は腰鼓を撃つやうなもので、大木の頂上に集くふ。巢の下は數十歩の間みな草が生えぬ』とある。

毛 氣味

【大毒あり、五臟に入れば人を爛殺する】〔別錄〕

喙 主治

【これを帯びれば蝮蛇の毒を殺す】〔別錄〕 時珍曰く、蛇の咬傷を受

けたときは、刮つて末にして塗ればその場で癒える。

〔二〕姑獲鳥（拾遺）

和名 うぶめどり（古稱）
學名 未詳
科名 未詳

〔一〕木村（重）曰ク、或ハ梟科ノ鳥ノ傳説カ。

釋名

乳母鳥（玄中記） 夜行遊女（同） 天帝少女（同） 無辜鳥（同） 隱飛（玄中記）

鬼鳥（拾遺） 讒譖（杜預の左傳註） 鈎星（歲時記） 時珍曰く、昔は一般に、

この鳥は産婦が化けたもので、陰慙して妖をなすといふので右の諸名がある。

集解

藏器曰く、姑獲は能く人の魂魄を取る。玄中記に『姑獲鳥は鬼神の類

であつて、毛を衣ては飛鳥となり、毛を脱いで女となる。これは産婦が死んで

(二) 荊州ハ石部石炭ノ楚ノ註參照。

(一) 越ハ今ノ廣東、廣西地方。

からこの鳥に化けたものだといふことだ。故に胸前に兩乳があり、喜んで人の子を取り、それを養つて己れの子とする。凡そ小兒のある家では夜間衣類を外に露してはならぬ。この鳥が夜中飛んで来て血を點けて誌にすると、その兒が驚癇、及び疳疾を病むものだ』とある。(三) 荊州に多くゐる。また鬼鳥ともいふ。周禮に、庭氏は救日の弓、救月の矢を以て天鳥を射るとあるはこの鳥だ。

時珍曰く、この鳥は雌のみで雄がない。七八月に夜飛んで人を害する。就中毒あるものだ。

治鳥（綱目）

和名未詳
學名未詳
科名未詳

集解

時珍曰く、按ずるに、干寶の搜神記に『越地の深山に治鳥といふがゐる。大いさは鳩ほどで色青く、樹を穿つて巢を作る。その巢は大いさ五六升入れる器ほどで、口徑が數寸あり、土堊で飾つて赤白相間り、射候のやうな状態だ。樵夫はこの巢のある樹を見ると避けて伐らない。それを伐ると能く虎を役つて人を害

し、人の家屋を焼拂ふ。白晝に見ると鳥の形で、夜その鳴聲を聞いても鳥の聲だが、時として或は長さ三尺ばかりの人間の形となり、湖たにに入つて蟹を取り、それを人家に入つて火で炙いて食ふ。山間に住む人民はこれを越祀こつちの祖といふ』とある。又、段成式の西陽雜俎には『俗説に、昔、ある人が洪水に遇ひ、都樹の皮を食つて餓死し、それが化けてこの物になつた。それで樹の根にゐるものを猪都ちとといひ、樹の中にあるものを人都といひ、樹の尾にゐるものを鳥都といふ。鳥都は左脇下に濶ひろさ二寸一分の鏡印がある。南方の地ではその窠を食ふ。味は木芝のやうだ』とある。竊に謂ふに、獸には山都、山獠さんさう、木客があり、鳥にも治鳥、山蕭、木客鳥がある。これはいづれも戾氣を天然に持つて生ずるもので、それぞれ異なる形となつて現はれたものだ。共に左に附録する。

附 録

○**木客鳥** 時珍曰く、按ずるに、異物志に『木客鳥は、大いさは鵲じやくほどのもので、幾千幾百羽が羣をなし、飛び集るには節度があつて、俗に、黄白鳥と呼ぶものだ。翼があり、綬があり、その中でただ一羽だけ高く飛ぶものが君長、前にゐて正赤のものが五伯、正黒のものが鈴下きんか、細色さいしきに赤の雞きるものが功曹、左脇に白

(二) 木村(重)曰ク、雀族ノ一種ナルベキモ、詳シクハ後致ナ俟ッ。

(三) 廬陵郡ハ三國吳ニ置ク、今ノ江西省吉安縣ノ西高昌ニ故城アリ。

(四) 木村(重)曰ク、雁鴨科、鵝科ノ鳥ノ靜止狀態ヲ謂フモノカ。

(五) 豫次之山、畢氏ノ考證ニ據レバ、今ノ陝西省咸寧縣ノ南ニ在ラントイフ。

帶のあるものが主簿で、それぞれ官職に随つて正服があるのだといふ。(三) 廬陵郡の東にこの鳥がゐる』とある。

〔目〕 **獨足鳥** 一名山蕭鳥。廣州志に「獨足鳥は閩、廣にゐる。大いさは鵠ほどで、

その色は蒼く、その聲は自らを呼ぶ』とあり、臨海志に「足が一本、身に文があり、口赤く、晝伏し、夜飛ぶ。時によると晝出ることがあるが、すると衆くの鳥がそれを譟る。ただ蟲豸を食ふだけで稻、梁をば食はない。聲は人が嘯くやうで、雨が降りさうなとき頻りに鳴く。孔子の所謂、一足の鳥は商羊なりといつたそのものだ』とある。山海經には『(五) 豫次の山、鳥あり。狀は梟の如く、人面にして一足。名けて豪蜚——音は肥(ヒ)——といふ。冬には蟄す。これを服すれば雷を畏れず』とある。孫愔の唐韻には「鷺は土精なり。鷹に似て一足。色黃なり。これを毀れば人を殺す』とある。

寗表

〔主治〕

〔履履に作つて用ゐれば脚氣を治す〕(時珍) 記載は雜俎にある。

鬼車鳥（拾遺）

和名未詳
學名未詳
科名未詳

釋名

鬼鳥（拾遺）

九頭鳥（同上）

蒼鷺（白澤圖）

奇鷺

時珍曰く、

鬼車は

妖鳥であつて、周易に鬼を一車に載すとある意味を取つて名としたものだ。鷺に似てゐるが異ふ。故に奇鷺といつたのだ。

集解

藏器曰く、鬼車は晦暝なる暗中に飛んで鳴き、能く人家に入つて人の

魂氣を取る。言ひ傳へには、この鳥は昔は首が十箇あつたのを、犬にその一箇を嚙

まれたので九箇だけ残り、その取られた一箇からは常に血を滴してゐるが、その血

が人家に著くと凶事があるといふ。〔一〕荆楚地方では、夜間この鳥が鳴いて飛ぶのを

聞くと、ただ燈火を消し、門に狗の耳を振つて括り付けて厭にする。この鳥は狗を

畏れるといふわけだ。白澤圖にある蒼鷺には九箇の首があり、また孔子が子夏と奇

鷺の九首を見たといふはいづれもこの物だ。荆楚歲時記にこれを姑獲としたのは誤

で、その二鳥は似たものだから鬼鳥と同名で呼ばれたのだ。

〔一〕荆楚ハ石部石炭ノ楚ノ註參照。

(二) 秦ハ金部鐵ノ註
ヲ見ヨ。

(三) 嶺外ハ石部齒石
類硫黃ノ註ヲ見ヨ。

時珍曰く、鬼車は形狀は鶻鵒きうりくのやうで、大なるものは翼の廣さ一丈ばかりあり、
晝は盲し、夜は瞭あきらに見えるもので、火光を見ると墜落する。按ずるに、劉恂の嶺表
錄に『鬼車は秦中に産するが嶺外に尤も多い。春、夏の頃に少し薄暗がりにな
ると飛んで鳴き、その鳴きながら飛び過ぎる聲は力車の鳴るやうに聞える。よく人
家に入つて人の魂氣こゝろを消磨させることを好む。その血の滴つた家には必ず凶事があ
る』とある。便民圖には『冬期に鬼車が夜飛んで鳴く。その聲が北から南へ行くを
ば出巢といひ、雨が降る。南から北へ行くをば歸巢といひ、雨が晴れる』とある。周
密の齊東野語には『宋の李壽翁が長沙の地方長官をしたとき、曾てこの鳥を捕獲し
たことがある。形狀は野鳬やふに類して色赤く、身は圓く箕きのやうで、十箇の頸が環わ
なつて簇むらがり、頭が九箇あつて一の頸にだけ頭がなくして鮮血が滴り、一の頸毎に
兩翼があつて、飛ぶ有様は霍霍かくかくとして竝び進むものだつた』とある。又、周漢公主
が病の時、この鳥が砧石ねんせきの處まで飛んで來た。すると同時に公主が薨去したといふ。
怪氣の鍾あつる結果かやうに妖異なものとなつて現はれるといふことは心得て置くべき
ことである。

諸鳥有毒（拾遺）

【凡そ鳥は

自死して目を閉ぢたもの、

自死して足の伸びぬもの、

白鳥にして首の玄きもの、

玄鳥にして首の白きもの、

三足のもの、

四距のもの、

六指のもの、

四翼のもの、

異しい形、異しい色あやのもの、

いづれも食つてはならぬ。食へば人を殺すものだ】

昭和六年二月十一日印刷
昭和六年二月十五日發行

頭註國譯本草綱目(第十一冊)
非賣品

監修兼
翻譯者

白井光太郎

鈴木眞海

發行者

東京市日本橋區通三丁目八番地

和田利彦

印刷者

東京市日本橋區通三丁目八番地

木村諭吉


東京市日本橋區通三丁目八番地

刊行所


春陽堂

電話日本橋五一・六四一・三七八八
振替口座東京一六一七





EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 3308



東
春
陽
堂
京
出
版